



# John Adams Library,



IN THE CUSTODY OF THE  
BOSTON PUBLIC LIBRARY.



SHELF N<sup>o</sup>:

★ ★ *Adams*

*134.20*











ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ.

---

HIPPOCRATIS

APHORISMI.

*OUVRAGES de M. LORRY , qui se  
trouvent chez le même Libraire.*

- Tractatus de morbis cutaneis , in-4°. 14 liv.  
De melancholiâ & morbis melancholicis ,  
2 vol. in-8°. 10 liv.  
Essai sur les alimens , pour servir de com-  
mentaires aux livres diététiques d'Hippo-  
crate , nouvelle édition , 2 vol. in-12. 6 l.  
Essai sur la conformité de la médecine an-  
cienne & moderne dans le traitement des  
maladies aiguës , traduit de l'anglois de  
Barker , in-12. 3 liv.  
Sanctorii de medicina statica aphorismi , com-  
mentaria notasque addidit A. C. Lorry ,  
in-12. 3 liv.  
Mead opera ex interpretatione A. C. Lorry ,  
2 vol. in-8°. 14 liv.  
Wintringham notationes & observationes in  
R. Mead monita & præcepta medica ,  
in-8°. 5 liv.

*On trouve chez le même un assortiment de  
Livres d'Histoire naturelle , de Médecine ,  
Anatomie , Chirurgie , Chymie , Pharmacie ,  
&c. &c.*

ἸΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ.

---

HIPPOCRATIS

APHORISMI,

Hippocratis et Celsi locis parallelis  
illustrati, studio et curâ JANSSONII  
ab ALMELOVEEN, D. M.

*Quibus accessit LUDOV. VERHOOFD  
Index locupletissimus.*

Loca parallela ex BOERHAVII Commentariis, notulas  
addidit, Editionem curavit

ANNA CAR. LORRY, D. M.



PARISIIS,

Apud THEOPHILUM BARROIS juniorem,  
ad ripam Augustinianorum.

---

---

M. DCC. LXXIV.

27 Adams

134.20

---

---

## P R Æ F A T I O.

---

VANAM fortè videbimur operam impendisse, qui Hippocratis Coi Aphorismos, recusos toties, memoriâ et mentibus Medicorum hærentes, novo labore in publicum prodire voluerimus. Verùm utilitati publicæ, non privatæ gloriæ, consultum est. Cùm enim deesset ex Parisiensi typographiâ libellus utilis, indignum judicabamus ab Exteris mutuari ex Hippocraticis operibus unum quodvis; cùm ea dudum sibi propria fecerit, in exponendo et evolvendo Me-



dicinæ Principe, Medicorum Parisiensium indefessa sedulitas. Paratos prætereà ad Philiatorum vota, et parvo comprehensos volumine, exoptabat habere Aphorismos, artis promovendæ cupidissimus Bibliopola D. Didot. Hinc cùm me circa institutum consuleret, velletque nitidissimæ editioni pretium conciliare; nulla mihi alia visa est, aut ad libelli formam præstantior, aut ad Auctoris sensum accuratior, quàm quæ, tradente Theodoro Janssonio ab Almeloveen, olim prodiit Editio. Plurima fuêre quæ rem persuaderent. Versio accurata, loci ex Hippocratis libris conformes, suo quique loco redditi, undè elucescat

P R Æ F A T I O. vii

quantùm sibi ipsi constiterit Hippocrates ; Index denique locupletissimus , et qui ad breves concisasque sententias reperiundas aptissimus est. Hinc illam aliis antepondere , vixque mutatam typis nostris credere decretum est.

Primus igitur noster labor in id incubuit , ut loca à Jansonio citata exactè ad Hippocratis et Celsi qui sæpiùs Hippocratem latinè exscripsit , opera conferrentur , emendarentur plura , ut illâ saltem diligentia , antecedentes editiones, hæc nostra posset superare.

Vincenda fuêre longa hæc fastidia ; verùm ulteriùs progressi , operæ pretium facturos credidimus ,

viiij    P R Æ F A T I O.

si loca ex Boerhaavio consona non tæderet excitare. Scilicet Vir eximius dum observationi theoriam jungere studet, novum Hippocratis operibus splendorem afflavit. Inde factum est ut, tum in ejus operibus, tum in luculentis, æqualis dicam, an discipuli ejus Cl. van-Swieten Commentariis, omnes ferè obscuriores Aphorismi reperiantur illustrati. Hos indicare et ad editionem Parisiensem referre æquum erat.

Obscuriora pauca supererant, quæ quoniam Novitiorum animum tardare potuissent, detraxissent forsitan Medicinæ Hippocraticæ fiduciam, et discendi aviditatem operoso studii fastidio vicissent. Hæc

brevibus notis ad Recentiorum sensum explananda existimavi ; alia verò attingere nefas putaverim , quòd illa cum veritate et experientiâ consonare , hæc verò utrique repugnare facilè videantur , vel illis qui Medicinam primis labris degustaverint. Præterea temerarium mihi fuisset , commentaria affectare , jam toties in hunc libellum edita , cùm à renovatæ Theoriæ Medicæ temporibus , plures et ætate et doctrinâ insignes , Aphorismos Hippocratis commentariis fuerint prosecuti , quorum capitî multâ cum laude hærentem coronam detrahere institutum non erat ; imò contrà quibus justam rependere laudem , ut jucundum , sic

promptum esse debet, inter quos excellunt Philippus Hecquet, ex Lyceo nostro, apud Batavos Gorterus, apud Germanos Riegerus, nuperrimèque brevius, sed ornatè, distinctè, compositè, ex Academiâ Patavinâ Andreas Pasta.

Verùm omnibus facilè palmam præripiat indefessus circa Aphorismos et criticè et medicè perpendendos Cl. Lefebvre de Villebrune labor; quàm multa nova in utilitatem Medicinæ protulerit vir cui sincerâ eruditione parem vix inveneris, sentiet facilè quicumque veterum monumentorum sphalmata, variationes, addita et omis-  
sa voluerit attentius inspicere. Textum ejus impensè laudamus; nec

tamen ei semper consentire licuit in edendo libello qui mentibus omnium hæret, et quasi usu sacer evasit.

Dum verò novam Aphorismorum Hippocratis editionem molimur, non illud nobis consilium est Philiatris illos, quasi extractam ex universo Hippocrate medullam, aut quasi erutos ex contracto Auctore thesauros exhibere, quibus accuratè perpensis, cætera vilescant. Ausus est sæculo proximè exacto Hippocratem sic contrahere Burnetus; imò, et idém, quanquam modestè magis, Sponius Lugdunensis tentavit; sed macilentum, exsuccum, jam omni exutum Philosophiâ quæ fecerat

xij      P R Æ F A T I O.

ἰσόθεον, uterque reddidit. Merentur quæ diurnâ æque ac nocturnâ Medicorum manu versentur, pleraque eorum operum quæ Hippocratis nomine circumferuntur, quanquam sæpè alieni vestigia laboris, adulteræque manûs miscelam, sagacioribus odorari facilè fuerit. Quo quidem piaculo non immunes sunt Aphorismi, auctoribus Galeno et Mercuriali: quippe plura iis à Medicis ante Galenum scribentibus addita fuisse, imò ab Hippocratis doctrinâ aliena fuisse ipsis inserta, iis consentientibus, fatendum est; quanquam eos esse veram Magni Hippocratis, et genuinam sobolem ab omnibus concedatur.



P R Æ F A T I O. xiiij

Utinam verò ex illâ quæ summi Viri operibus propria est simplicitate, ad calcandum iter ab illo tritum accedantur animi! constetque tandem quænam sit Philosophia Medica quæ ab evidentibus inchoata principiis, rudis primùm apparet, et titubans, mox ad immensos progreditur fructus, sine ullo hypotheseon fuce, sine ullo verborum fastu, qualis inter manus Coæ Scholæ atque Hippocratis effloruit, cùm nondum intumuerant superbiâ scholæ, et docendi libido, discendi aviditatem non extinxerat.

Errores certè suos passus est Hippocrates, nec ii sumus qui cum Suidâ arbitremur ipsum numquam

xiv P R Æ F A T I O.

falli potuisse. Plurimos Recentiorum sagax sedulitas reclusit naturæ fontes, Auctori nostro incognitos, unde ingentia in Medicinam fluxêre commoda. Dies diem docet. Sed ea quæ, velut opinionum commenta, temporum spatio non contabuêre, pro naturæ judiciis accipienda sunt. Quanquam verò aliqua ex veteri Medicinâ recentibus inventis, aliqua experientiæ minùs forsàn responsare fateamur, non minus tamen, aut injusta, aut temeraria videatur Aloysii Sinapii olim Medici Poloni in Hippocratis Aphorismos censura. Hic dum nodum in scirpo quærit cavillator pessimus, singulos carpit, in id unum intentus ut antidota verbo-

sis ornata strophis , medendi methodo , sine quâ Medicina rationalis nulla est , substituat : demens , qui dum salutiferæ Artis præcepta convellere audet , fidem sibi derogat , quasi postremi tantummodò ævi Scriptoribus Medicinam natura reservaverit ; quam contrâ ex ipsâ humanitatis infirmitate sobolescentem , grandævi Medicinæ Patres adaugendam , perficiendam , sed nullatenus inveniendam Nepotibus transmisere. Quicumque enim solo veritatis amore ducti , huic scientiæ animum applicuere mirum est quantum inter se consentiant , quantâ concordîâ Auctori nostrò debitas rependerint laudes. Quo quidem rerum aspectu , novum decus il-

lucescit Hippocrati, arti verò nostræ firmitas atque robur conciliatur, contra procacium jocos et insultantium jurgia. Quæcumque enim sera detexit Recentiorum theoria, apprimè consonare visa sunt Vetustiorum Auctorum observationibus; ut forsitan in nullâ aliâ Arte concordia major, uniformitas æqualior reperiantur. Sic quæ de aere, locis, et aquis, deprehensa observanti Hippocrati fuerant, à Toricellii inventis demonstrantur. Sic quæ à circulo sanguinis invento, de nutritione corporis comperta sunt, optimè cum Theoriâ ejus de victu in acutis quadrant. Sic multa è Præsagiis ejus, recentioris theoriæ jubare af-

P R Æ F A T I O. xvij  
flata , splendidiùs enituêre : undè  
constet quantum in illustrandâ , et  
amplificandâ Medicinâ , Vir sum-  
mus contulerit. Nec vereor , ne  
me malefidus livor ejus amore  
insanientem calumnietur , si ipsi  
hos Lucretianos versus apposue-  
rim :

Tu pater es rerum inventor , tu patria  
nobis  
Suppeditas præcepta , tuisque ex inclyte  
chartis ,  
Floriferis ut apes in saltibus omnia libant,  
Omnia nos itidem depascimur aurea dic-  
ta ;  
Aurea , perpetuâ semper dignissima vitâ.

Ne tamen leviori fulta auctori-  
tate , nostra hæc dona contempta  
relinquantur , præmoneatur Lec-

xviiij P R Æ F A T I O.

tor, Viros celeberrimos opem implorantibus nobis non defuisse. Tum verò accepti beneficii immemor forem, si non hîc recordarer, horarum quas emendando, perficiendo, nostro labori impendere non recusavêre Cl. Collegæ D. DORIGNY, tùm etiam DD. COQUEREAU et HALLÉ; quorum alter amicitiaë cupidinem artis promovendæ, alter litterarum græcarum studio auctoris cultum et amorem jungere amat. Hi sæpè vigiliis suis hæsitantem et labantem, consiliis firmavêre laboribusque adjuvêre: illustria certè pignora, quibus libellus noster ita gloriatur, ut si quid insit boni, illis; si quid mediocris, mihi soli arbitrer imputandum.

P R Æ F A T I O. xix

Desunt tamen huic nostræ Editioni , quæ simul venales prostabant , selectæ è Celso Sententiæ , quia scilicet indignum credidi elegantissimum Auctorem sic contractum exhibere , favereque illorum desidiæ qui plus verbis se quàm rebus delectant. Norunt herclè rerum Medicarum gnari , quanti sit pretii Celsus , quantùm mereatur , qui non semel , sed bis , et ter legatur integer. Hunc adeant tirones , hunc commendent professores.

Nec jucundum minùs existima-  
vi concordia Hippocratis loca ab  
Almeloveen citata ad cujusque sec-  
tionis calcem , priùs expensa , imò et  
aucta ablegare ; quod ut Typogra-



XX P R Æ F A T I O.

phiæ facilius, sic etiam legentibus minùs moræ injicit. Aliàs alii meliùs. Nobis satis sit publicæ utilitati consuluisse, fastidiosis et operosis laboribus.

F I N I S.

HIPPO-

HIPPOCRATIS

APHORISMI,

GRÆCÈ ET LATINÈ.



# ΪΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ Α΄ΦΟΡΙΣΜΟΪ΄.

## ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

α΄. Ο βίβρα βραχὺς, <sup>1</sup> ἢ ᾗ τέχνη μακρὴ, <sup>2</sup> ὃ ᾗ καρὸς ὄξυς, <sup>3</sup> ἢ ᾗ πείρα Ϝφαλερὴ, ἢ ᾗ κρείσις χαλεπή. <sup>4</sup> δεῖ ᾗ ἔ μόνον ἑαυτὸν παρέχειν τὰ δέοντα ποιέοντα, ἀλλὰ καὶ τὸ νοσέοντα, καὶ τὸς <sup>a</sup> παρεόντας, καὶ τὰ ἔξωθεν.

β΄. <sup>1</sup> Ἐν τῆσι ταραχῆσι τὸ κοιλίης, καὶ τοῖσιν ἐμέτοισι, <sup>2</sup> τοῖσιν αὐτομά-



# HIPPOCRATIS APHORISMI.

---

---

## SECTIO PRIMA.

1. **V**ITA brevis, <sup>1</sup> ars longa, <sup>2</sup> occasio præceps, <sup>3</sup> experimentum periculosum, <sup>4</sup> iudicium difficile. <sup>4</sup> Oportet autem non modò seipsum exhibere quæ oportet facientem, sed etiam ægrum, et <sup>a</sup> præsentem, et externam.

2. <sup>1</sup> In perturbationibus alvi, et vomitibus <sup>2</sup> spontè ortis, <sup>3</sup> si quidem, qualia

4 H I P P. A P H O R.

oportet purgari , purgentur , confert ,  
 et facile ferunt : sin minùs , contrà. 4  
 Sic et vasorum evacuatio , si quidem ,  
 qualem fieri decet , fiat , confert , et  
 facile ferunt : sin minùs , contrà. 5 Res-  
 picere igitur oportet et regionem , et  
 tempestatem , et morbos , <sup>a</sup> in quibus  
 convenit , aut non.

3. In gymnasticæ disciplinæ deditis  
<sup>1</sup> <sup>a</sup> boni habitus ad summum pro-  
 gressi , periculosi , si in extremo ste-  
 terint : <sup>2</sup> non enim possunt in eodem  
 statu manere , neque quiescere. Cùm  
 verò non quiescant , neque ultrà possint  
 in melius proficere , reliquum est ut in  
 deterius ruant. Horum igitur causâ ,  
 bonum habitum solvere confert haud  
 cunctanter , quò rursùs nutritionis  
 principium sumat corpus. Neque con-  
 fidentiae ad extremum ducendæ : <sup>3</sup>  
 periculosum enim : sed qualis natura

τως γινομένησιν, <sup>3</sup> ἢν μὲν, οἷα δεῖ καθάρεσθαι, καθαίρωνται, συμφέρει τε, καὶ δύσφορος φέρσιν· ἢν ᾗ μὴ, τὸναντίον. <sup>4</sup> ἔτω ᾗ καὶ ἡ κενεαγγελία, ἢν μὲν, οἷω δεῖ γίγνεσθαι, γίγνηται, συμφέρει τε, καὶ δύσφορος φέρσιν· ἢν ᾗ μὴ, τὸναντίον. <sup>5</sup> ἐπιβλέπειν ἔν δεῖ καὶ χάριω, καὶ ὄρω, καὶ ἡλικίω, καὶ νέσσει, <sup>a</sup> ἐν ἧσι δεῖ, ἢ ἔ.

γ'. Ἐν τοῖσι γυμνασικοῖσιν <sup>1</sup> αἰ ἐπὶ ἄκρον δὲξίαν, σφαλεροῖ, ἢν ἐν τῷ ἔχατῳ ἔωσιν. <sup>2</sup> ἔ γὰρ δύναται μῦθιν ἐν τῷ αὐτέῳ, ἐδὲ ἀτρεμέειν· ἐπεὶ ᾗ σὺν ἀτρεμέεισιν, ἐδὲ τι δύναται ἐπὶ τὸ βέλτιον ἐπιδιδόναι, λείπειται ἔν ἐπὶ τὸ χεῖρον. τῆλεων ἔν εἵνεκα τὴν δὲξίην λύειν συμφέρει μὴ βραδέως, ἵνα πάλιν δρῶχὴν ἀναθρέψιτο λάθῃ τὸ σῶμα· μηδὲ τὰς συμπτώσεις ἐς τὸ ἔχαλον ἄγειν· <sup>3</sup> σφαλερὸν γάρ. ἀλλ' ὁκοίη ἂν ἡ φύσις ἢ ἔ μέλλοντιτο ὑπομῦθιν, ἐς τῆλο ἄγειν.

6 ΗΙΡΡ. ΑΡΗΟΡ.

<sup>4</sup> ὡσαύτως ἢ καὶ αἱ κενώσεις αἱ ἐς τὸ ἔχαλον ἄβυσσος, σφαλερά· καὶ πάλιν αἱ ἀναψύξεις αἱ ἐν τῷ ἔχατῳ ἔβυσσος, σφαλερώ.

δ'. <sup>1</sup> Αἱ λεωτῆαὶ καὶ ἀκριβοῦς διάβηται, ἔν τῷσι μακροῖσιν αἰεὶ πάθει, <sup>2</sup> καὶ ἐν τοῖσιν ὀξέσιν, ἔμὴ ἐπιδέχεται, σφαλεραί· <sup>3</sup> καὶ πάλιν αἱ ἐς τὸ ἔχαλον λεωτέτηται ἀφίγμῳ διάβηται, χαλεπαί. καὶ <sup>4</sup> γὰρ αἱ πληρώσεις αἱ ἐς τὸ ἔχαλον ἀφίγμῳ, χαλεπαί.

ε'. <sup>1</sup> Ἐν τῆσι λεωτῆσι Δραίτησιν ἀμαρτάνουσιν οἱ νοσήοντες· <sup>2</sup> διὸ μᾶλλον βλάπτουσι. πᾶν γὰρ τὸ ἀμάρτημα, ὃ ἂν γίνηται, μέγα γίνεται μᾶλλον (ἐν τῆσι λεωτῆσι) ἢ ἐν τῆσιν ὀλίγον ἀδρότέρησι Δραίτησι. Διὸ τῆτο καὶ τοῖσιν ὑγιαίνουσι σφαλερὰ αἱ πάνυ λεωτῆαὶ καὶ καθεσηκυῖα καὶ ἀκριβοῦς διάβηται, ὅτι



S E C T I O I. 7

fuerit ejus qui perferet, eò usque du-  
cendæ. <sup>4</sup> Sic & evacuationes ad ex-  
tremum ducentes, periculosæ. Et  
rursùs reféciones, cùm extremæ fue-  
rint, periculosæ.

4. <sup>1</sup> Tenuis et severiori normæ ad-  
strictus victus, et in longis morbis sem-  
per, <sup>2</sup> <sup>a</sup> et in acutis, ubi non conve-  
nit, periculosus. <sup>3</sup> Et rursùs ad extre-  
mum tenuitatis progressus victus, dif-  
ficultis. <sup>4</sup> Nam et repletiones ad extre-  
mum progressæ, difficiles sunt.

5. <sup>1</sup> In tenui victu delinquant  
ægri: <sup>2</sup> ob id magis læduntur. Omne  
enim delictum, quod admittitur,  
multò majus fit (in tenui) quàm in  
paulò pleniore victu. Propterea etiam  
sanis periculosus est valde tenuis,  
ponderatus et exquisitus victus; quia

8 H I P P. A P H O R.

delicta graviùs ferunt. Ob hoc igitur tenuis et exquisitus victus periculosus magis, quàm paulò plenior.

6. <sup>a</sup> Ad extremos morbos, extrema remedia exquisitè optima.

7. <sup>1</sup> Ubi igitur peracutus est morbus, <sup>2</sup> statim extremos habet labores, et <sup>a</sup> extremè tenuissimo victu uti necesse est. Ubi verò non, sed plenius cibare licet, tantùm à *tenui* recedendum, quantùm morbus remissior extremis fuerit.

8. <sup>1</sup> Cùm morbus in vigore fuerit, tunc vel tenuissimo victu uti necesse est.

9. Considerare oportet etiam <sup>a</sup> ægrotantem, num ad morbi vigorem

τὰ ἀμαρτανόμματα χαλεπώτερον φέρουσι.  
 Διὰ τὸ ἔν αὐ λεπταὶ καὶ ἀκριβοῦς διαί-  
 ται σφαιραὶ ἐς τὰ πλείστα τῶν μικρὸν  
 ἀδροτέρων.

ς. <sup>α</sup> Ἐς δὲ τὰ ἔχαια νεσθήματα, αὐ  
 ἔχαια θεραπεῖαι ἐς ἀκριβοῦς κρά-  
 τισαί.

ζ. <sup>1</sup> Ὅκα μὲν ἔν κάτοξυ τὸ νόσημα,  
<sup>2</sup> αὐτίκα τὸς ἐχάτως πόνος ἔχει, καὶ  
 τῆ ἐχάτως λεπτοτάτη <sup>α</sup> Διαιτή ἀναγ-  
 καῖον χρέεσθαι. ὅκα ἢ μὴ, ἀλλ' ἐνδὲ-  
 χεται ἀδροτέρως Διαιτῶν, τοσῶτον ὑπο-  
 καταβαίνειν, ὁκόσον ἂν ἢ νεσθῶ μαλ-  
 θακώτερον τῶν ἐχάτων ἦ.

η. <sup>1</sup> Ὅκοταν ἢ ἀκμάζει τὸ νόσημα,  
 τότε καὶ τῆ λεπτοτάτη Διαιτή ἀναγ-  
 καῖον χρέεσθαι.

θ. Συντεκμαίρεσθαι δὲ χρὴ <sup>α</sup> καὶ τ  
 νοσήοντα, εἰ ἐξαρκείσθαι τῆ Διαιτῆ πρὸς  
 Β

την ἀκμὴν τῆ νῆσος, <sup>1</sup> b ἐ πότερον  
ἐκείνος ἀπαυδήσῃ πρότερον, κὶ ὅτε  
ἐξαρκέσῃ τῆ Διαιτή, ἢ ἡ νῆσος πρό-  
τερον ἀπαυδήσῃ ἐ ἀμβλυνεῖται.

ί. <sup>a</sup> <sup>1</sup> Ὀκόσοισι μὲν ἔν αὐτίκα ἡ  
ἀκμὴ, αὐτίκα λεπτῶς Διαιτῶν ὀκό-  
σοισι δὲ ἐς ὕστερον ἡ ἀκμὴ, <sup>2</sup> ἐς ἐκείνο  
κὶ πρὸ ἐκείνου μικρὸν ἀφαιρέλιον. ἔμ-  
προθεν δὲ πτωχέρως Διαιτῶν, ὡς ἂν  
ἐξαρκέσῃ ὁ νοσέων.

ια. <sup>1</sup> Ἐν δὲ τοῖσι παρῶξυσμοῖσιν  
<sup>a</sup> ὑποσέλλεσθαι χρή· τὸ προσιθέμεν γὰρ,  
βλάβη. κὶ ὀκόσα κατὰ περιόδους παρῶ-  
ξύνειαι, ἐν τοῖσι παρῶξυσμοῖσιν ὑπο-  
σέλλεσθαι χρή.

ιβ. <sup>a</sup> <sup>1</sup> Τὰς δὲ παρῶξυσμὸς κὶ τὰς  
καλιασάσιαι δηλώσασιν αἰ νῆσοι, ἐ αἰ  
ᾧραι τῆ ἔτεος, ἐ αἰ τῆ περιόδων πρὸς  
ἀλλήλας ἐπιδόσιαι, ἢν τε καθ' ἡμέρην,

S E C T I O I. 11

victu sufficiet , <sup>1</sup> <sup>b</sup> et an priùs ille deficiet , et victu non sufficiet , an morbus priùs deficiet , et obtundetur.

10. <sup>a</sup> <sup>1</sup> Quibus igitur statim vigor morbi adest , statim tenuiter alendi. Quibus verò in posterum vigor , <sup>2</sup> his ad illud , et paulò ante illud *tempus* subtrahendum. Antea verò uberiùs alendum , ut sufficiat æger.

11. <sup>1</sup> In exacerbationibus *cibum* <sup>a</sup> subtrahere oportet. Exhibere enim , noxium est. Et quæcunque per circuitus exacerbantur , in exacerbationibus subtrahere oportet.

12. <sup>a</sup> <sup>1</sup> Exacerbationes autem et constitutiones indicabunt morbi , et anni tempora , et periodorum ad invicem *collata* incrementa , sive quo-

tidie, sive alternis diebus, sive longiore fiant tempore. Sed etiam iis quæ *mox* apparent *eadem* indicantur, velut<sup>2</sup> in pleuriticis sputum, si statim appareat veniente *morbo*, eum abbreviat; si verò postea appareat, producit. Et urinæ<sup>3</sup>, et alvi excrementa, et sudores, cùm apparent, vel iudicatu faciles, vel difficiles,<sup>4</sup> vel breves, vel longos morbos *fore* indicant.

13. Senes facillimè jejunium ferunt, secundò<sup>a</sup> ætate consistentes, minimè adolescentes, <sup>b</sup> omnium minimè pueri: ex his autem, qui inter ipsos sunt alacriores.

14. <sup>1</sup> Quæ crescunt, plurimum habent calidi innati: plurimo igitur egent<sup>a</sup> alimento: sin minùs, corpus consumitur. <sup>b</sup> Senibus autem paucus

ἢν τε παρ' ἡμέρῳ, ἢν τε κὶ Δ' πλείονος χρόνος γίνωται. ἀτὰρ ἐ τοῖσιν ἐπιφανομήροισιν, <sup>2</sup> οἷον ἐν πλοσυρτικοῖσι πύελον, ἢν αὐτίκα ἐπιφάνηται ἀρχομήδης, βραχύνει. ἢν δ' ὑστερον ἐπιφαίνηται, μηκύνει. <sup>3</sup> κὶ ἔρα, καὶ ὑποχωρήματα, κὶ ἰδρωῶτες, ἐ δύσκειλα, κὶ δύσκειλα, <sup>4</sup> κὶ βραχέα, ἐ μακροῦ τὰ νησάματα, ἐπιφανόμενα δηλοῖ.

ιγ'. Γέρουτες δύφορώτατα νησίῳ φέρουσι. δότιον, <sup>a</sup> οἱ καθεσηκότες. ἡκιστα, μειράκια. <sup>b</sup> πάντων δὲ μάλιστα, παρδία. τριτέων δὲ αὐτέων, ἄπειρ ἂν τύχη αὐτὰ ἐαυτῶν προθυμότερα ἐόντα.

ιδ'. <sup>1</sup> Τὰ ἀυξανόμενα πλείστον ἔχει τὸ ἔμφυτον θερμόν. πλείστης ἔν δέῃται <sup>a</sup> τροφῆς. εἰ δὲ μὴ, τὸ ζῶμα ἀναλίσκειται. <sup>b</sup> γέρουσι δὲ ὀλίγον τὸ θερμόν.

Διὰ τῆτο ἄρα ὀλίγων ὑπεκκαυμάτων  
δέονται· ὑπὸ πολλῶν γὰρ ἀποσθένυται·  
² Διὰ τῆτο καὶ οἱ πυρετοὶ τοῖσι γέρου-  
σιν ἔχ ὁμοίως ὕξεις· ³ ψυχρὸν γὰρ τὸ  
Σῶμα.

ιέ. ¹ ἂ Αἱ κοιλία χειμῶν⊕ καὶ  
ἤρος θερμότελαι φύσει, ἔ ὑπνοὶ μα-  
κρότελοι. ἐν ² ταύτησιν ἔν τῆσιν ἄρησι  
καὶ τὰ προσάρματα πλείω δοτέον. καὶ  
γὰρ τὸ ἔμφυτον θερμὸν πλείον ἔχεισι.  
τροφῆς ἔν πλείονος δέονται· σημεῖον,  
ᵇ αἱ ἡλικίαι ἔ οἱ ᶜ ἀθληταί.

ις. ἂ ¹ Αἱ ὑγραὶ δίαίται πᾶσι τοῖσι  
πυρεταίνουσι συμφέρουσι· ² μάλιστα δὲ  
παυδίοισι, καὶ τοῖσιν ἄλλοισι τοῖσιν ἔτως  
εἰθισμένοισι Διαιτᾶσθαι.

ιζ. ¹ Καὶ οἷσιν ἅπαξ, ἢ δὶς, καὶ  
πλείω, ἢ ἐλάσσω, καὶ κατὰ μέρος. ² ἂ δοτ



calor : propterea paucis fomitibus indigent, à multis enim extinguitur. Idcirco <sup>2</sup> etiam febres senibus non similiter acutæ. Frigidum <sup>3</sup> enim est corpus.

15. <sup>1 a</sup> Ventres hyeme et vere naturâ sunt calidissimi, et somni longissimi. <sup>2</sup> In his igitur temporibus etiam alimenta plura exhibenda. Innatum enim calorem majorem habent. Nutrimento igitur copiosiore indigent. Indicium sunt, <sup>b</sup> ætates et <sup>c</sup> athletæ.

16. <sup>a 1</sup> Victus humidus febricitantibus omnibus confert, <sup>2</sup> maximè verò pueris, et aliis tali victu uti consuetis.

17. <sup>1</sup> Et quibus semel aut bis, et plura vel pauciora, et per partes offerri conducat, videndum. <sup>2 a</sup> Conce-

dendum autem aliquid et consuetudini, et tempestati, et regioni, et ætati.

18. Æstate<sup>a</sup> et autumnno cibos difficillimè ferunt: <sup>1</sup> hyeme facillimè, deinde vere.

19. His qui per circuitus exacerbantur<sup>a</sup> nihil dare oportet, neque cogere, sed auferre de appositionibus ante iudicationes.

20. Quæ judicantur et iudicata sunt perfectè, neque movere oportet, neque <sup>1</sup> innovare, sive purgantibus, sive aliis irritamentis, <sup>2</sup> sed sinere.

21. Quæ ducere oportet, <sup>1</sup> quo maximè vergant, eò ducenda, <sup>2</sup> per loca convenientia.

22. <sup>1</sup> Concocta purgare et movere oportet, <sup>2</sup> non cruda, <sup>3</sup> neque in principiis, <sup>4</sup> nisi turgeant. Plurima verò non turgent.

τέον δέ τι κὶ τὰ ἔθει, κὶ τῆ ἄρη, κὶ τῆ χάρη, κὶ τῆ ἡλικίη.

ιγ'. Θέρεος, <sup>α</sup> κὶ φθινοπώρα, σιλία δυσφοράταλα φέρουσι <sup>1</sup> χειμῶνος, ῥήϊσα ἦρος δεύτερον.

ιδ'. Τοῖσιν ἐν τῆσι περιόδοισι παροξυνομήροισι <sup>α</sup> μηδὲν δίδοναι, μηδὲ ἀναγκάζειν, ἀλλ' ἀφαιρέειν τῶν προδεσίων, πρὸ τῶν κελσίων.

κ'. Τὰ κρινόμενα, καὶ τὰ κεκευμένα δρῆσι, μὴ κινέειν, <sup>1</sup> μηδὲ νεωτεροποιέειν, μήτε φαρμακείησι, μήτ' ἄλλοισιν ἐρεθισμοῖσιν, <sup>2</sup> ἀλλ' ἔειν.

κα'. <sup>α</sup> Ἄ δέϊ ἄγιν, <sup>1</sup> ὅκτι ἂν μάλιστὰ ῥέτωι, ταύτη ἄγιν, <sup>2</sup> ἀλλ' τῶν ξυμφερόντων χωρίων.

κβ'. <sup>1</sup> Πέποναι φαρμακύειν, καὶ κινέειν, <sup>2</sup> μὴ ὡμά, <sup>3</sup> μηδὲ ἐν δρχῆσιν, <sup>4</sup> ἢν μὴ ὀργᾶ. τὰ ῥ πλείστα σὺν ὀργᾶ.

κγ'. <sup>1</sup> Τὰ χαρέοντα μὴ τὰ πλήθει τεκμαίρεσθαι, ἀλλ' ὡς ἀν' χαρῆν, οἷα δεῖ, καὶ φέρει δύφορος. <sup>2</sup> α καὶ ὅκα δεῖ μέχει λειποθυμίας ἀγάν, <sup>3</sup> καὶ τῆτο ποίειν, ἢν ἔξαρκέση ὁ νοσέων.

κδ'. <sup>1</sup> Ἐν τοῖσιν ὀξέσι πάθεσιν ὀλιγάκις, <sup>2</sup> καὶ ἐν ἄρχῆσι, τῆσι φαρμακείησι χρέεσθαι, <sup>3</sup> καὶ τῆτο προεξδουκηνήσαντας ποίειν.

κε'. Ἦν, οἷα δεῖ καθαίρεσθαι, καθαράντα, ξυμφέρῃ τε καὶ δύφορος φέρει. τὰ δ' ἐναντία, δυσχερῶς.



23. <sup>1</sup> Quæ prodeunt non copiâ sunt æstimanda , sed si prodeant qualia oportet , et facilè ferat. <sup>2</sup> <sup>a</sup> Et ubi ad animi deliquium ducere oportet , hoc <sup>3</sup> etiam faciendum , si æger sufficiat.

24. <sup>1</sup> In acutis affectionibus rarò , et in <sup>2</sup> principiis , purgante utendum , atque hoc <sup>3</sup> diligenti priùs adhibitâ cautione faciendum.

25. Si , qualia purgari oportet , purgentur , confert et facilè ferunt : si verò contraria , difficulter.



---

N O T Æ  
 IN APHORISMOS  
 HIPPOCRATIS,  
 Qui difficiliores nec adeo obvii  
 sensûs sunt.

---

S E C T I O P R I M A.

APHOR. I. <sup>1</sup> L O C. in Hom. l. i. =  
<sup>2</sup> Loc. in Hom. liv. i. — II. Præd. xxix,  
 8. — I. Morb. iv, 1, 2. = <sup>3</sup> Humor. j,  
 6, 7. — Artic. ix, 7. = <sup>+</sup> I. Epidem. ij  
 93, 94. — VI. Epid. ij, 78, ad 82.  
 = <sup>a</sup> Cels. iij, 5, p. 127, l. 20. vj, 6,  
 §. 14, p. 358, l. 8. — *Vide* van-Swie-  
 ten, tom. ij, p. 53-54, edit. Paris.

APHOR. II. <sup>1</sup> I. Prædict. xx, 8. —  
 Verat. 9. = <sup>2</sup> I. Epid. ij, 47. = <sup>3</sup> Aphor.

vj, 15. — Aphor. j, 25. =<sup>+</sup> Humid.  
 Us. v, 11. — Vict. Acut. v, 24. xxj, 5.  
 =<sup>5</sup> Aphor. j, 17. — Humor. j, 14 ad  
 19. — II. Morb. Mul. iv, 1, 11. — Epist.  
 Democ. ad Hipp. 30 ad 34. — Orat.  
 Theff. filii, 130. — I. Diæt. ij, 12, 13 et  
 sequ. =<sup>a</sup> Cels. præf. j, pag. 18, l. 33.  
 iij, 4, pag. 119, l. 31. v, 26, §. 6,  
 pag. 284, l. 31. — *Vide* van-Swieten,  
 tom. ij, p. 82, 346, 434, 472, 671, tom.  
 iij, p. 100.

APHOR. III. <sup>1</sup> Epistol. Hipp. ad Damag.  
 ij, 209. =<sup>2</sup> IV. Morb. x, 15, 16. =  
<sup>3</sup> Aph. ij, 51. =<sup>4</sup> Aphor. ij, 22, 51.  
 — Vet. Medic. xvij, 1. — Vict.  
 Acut. xvij, 10. =<sup>a</sup> Cels. ij, 2, pag.  
 48, l. 5. — *Vide* van-Swieten, tom. j, p.  
 137, 420, tom. ij, pag. 385, 613.

<sup>3</sup> *Ευεζία* est *virium excessus*, Plethoram  
 per se inducens, nisi retundatur. Hoc  
 enim verbo non omninò optimam sani-  
 tatem intelligit Hippocrates. Sic etiam  
 sub nomine gymnastics, non exerci-  
 tium salubre est intelligendum, sed di-  
 ligens illa corporis cura, quâ, spretis

officiis civilibus , qui abutebantur , jure ab antiquis Philosophiæ præceptoribus explosi sunt , undè non *in exercitantibus* scribendum erat , sed *in gymnasticæ deditis*.

APHOR. IV. <sup>1</sup> Aph. j, 5. — Præcept. xj, 4. = <sup>2</sup> Vict. Acut. xx, 6, 7. = <sup>3</sup> Aph. j, 3. ij, 51. = <sup>4</sup> Aph. vj, 39. — Æginet. lib. j, c. 32. = <sup>a</sup> Cels. ij, 2, p. 114, l. 3, ij, 15, pag. 145, l. 21. — *Vide van-Swieten, t. ij, p. 98, 503. t. ij, p. 344.*

Tenue , exquisitè tenue, summè tenue , tria sunt victûs genera quæ distinxit Hippocrates, pro vehementiâ morbi ad vires dimicantis Naturæ comparatâ , in libro *de Victûs ratione in Morbis acutis*. Sic autem est intelligendus hic aphorismus. *Diata exquisitè tenuis in morbis longis semper , in acutis , ubi non convenit, periculosa est. Insuper omnis diata ad tenuitatis extremum deducta semper officit. Sed et repletio nimia non caret incommodis.*

APHOR. V. <sup>1</sup> Aph. j, 4. = <sup>2</sup> Vet. Medic. xv, 9 , ad 14. — Vict. Acut. xx,



IN SECTIONEM I. 23

6, 7, II. — *Vide* van-Swieten, tom. ij, p. 98, 503, tom. iij, p. 343.

Virium prostratio, acrium accumulatio, humorum putredo, tria sunt severæ nimis diætæ incommoda, quibus graviora nulla vel ab ipsâ ingurgitatione pertimescenda sunt. Ars enim vacuare potest, replere verò solius est naturæ. — *Vide* Boerhaav, Inst. Med. §. 756, 757.

APHOR. VI. <sup>a</sup> Cels. ij, II, pag. 84, l. 8. iv, 19, pag. 232, l. 15. — Loc. in Hom. xxxvj, 14. lv, 7 ad II. — Artic. j, 9. — *Vide* van-Swieten, tom. j, pag. 420. tom. ij, pag. 613, tom. iij, pag. 67, 569.

APHOR. VII. <sup>i</sup> Aph. iv, 10. = <sup>2</sup> I. Epid. iij, 29, 33. — II. Epid. j, 24. = <sup>a</sup> Cels. iij, 6, pag. 131, l. 33. — *Vide* van-Swieten, tom. ij, pag. 64, 100, 330, 411.

APHOR. VIII. <sup>i</sup> Viét. Acut. xvij, II. xx, I, ad 6. — Aph. ij, 29. — Gal. de Opt. Sect. ad Thrasy. cap. 39. —

*Vide* van-Swieten, tom. j, p. 23. tom. ij, p. 66, 100.

APHOR. IX. <sup>1</sup> Vict. Acut. xix, 5, ad 10. — Aph. j, 23. — Humor. iij, 87. = Cels. iij, 4, pag. 120, l. 7. ij, 10, pag. 78, l. 13. iij, 6, pag. 131, l. 21. v, 26, pag. 295, l. 21. = <sup>b</sup> Cels. iij, 4, pag. 119, l. 34. — Van-Swieten, tom. ij, pag. 98.

APHOR. X. <sup>1</sup> Vict. Acut. xix, 8, 9. = <sup>2</sup> Affect. xlij, 3. = <sup>a</sup> Cels. iij, 2, pag. 114, l. 1. — *Vide* van-Swieten, tom. ij, p. 100.

APHOR. XI. <sup>1</sup> Aph. j, 19. — de Naturâ Human. xviii, 31. — Humor. iij, 82. — Loc. in Hom. xxxix. 1. — Affect. xlij, 3. lij, 14. — Vict. Acut. x, 2. = <sup>a</sup> Cels. iij, 4, pag. 122, l. 21. iij, 5, pag. 126, l. 19. — Cœlius Aurelianus de Morb. Acut. l. ij, pag. 29. — *Vide* van-Swieten, tom. ij, p. 94, 503. —

*Vide* in omnes hosce Aphorismos de victu in acutis luculentissima Th. Glass, Medici Angli, Commentaria, Comm. v. iii

quo optimè, et ad exquisitam, tum Hippocratis doctrinam, tum Recentiorum theoriam, rem omnem Vir sagacissimus exposuit.

APHOR. XII. <sup>1</sup> II. Epid. j, 26 ad 30. = <sup>2</sup> Aph. v, 8, 15. — Prænot. xij, 1, 12; xiv, 11. — Coac. Pr. iij, 132, 143. — III. Morb. xxj, 33, 34. — Affect. viij, 19. — Vict. Acut. vij, 1. = <sup>3</sup> Aph. iv, 71. — Coac. Pr. v, 82. — I. Epid. iij, 10. = <sup>4</sup> Vict. Acut. vj, 6, 7. = <sup>a</sup> Cels. iij, 4, pag. 122, l. 17.

Singula et universa hæc signa præcipuum constituunt Prognoseôn Hippocraticarum argumentum, quæ in capita distribuere Duretus et, dilucidius adhuc, sed propriis observationibus non adeo dives Prosper Alpinus, lib. *de præsagiendâ vitâ et morte ægrotantium*. Lege hîc attentè quidquid de hoc aphorismo scripsit in notis, doctè ut solet, Cl. de Villebrune.

APHOR. XIII. <sup>a</sup> Cels. præf. j, pag. 19, l. 21, 23; j, 3, p. 32, l. 24. = <sup>b</sup> Cels. præf. lib. j, p. 19, l. 21. — *Vide van-Swieten*, t. j, pag. 69; tom. ij, p. 99.

Senes ad existentiam solam aluntur; ætate consistentes etiam ad robur; pueri verò ad existentiam, robur et incrementum. In rigido sene languens vitalis circuitus paucissima absumit.

APHOR. XIV. <sup>1</sup> Art. xxij, 2. — I. Diæt. xxviiij, 5, 6, 7. — Natur. Hum. xxiv, 7, 8. = <sup>2</sup> Aph. iij, 27. — I. Morb. xx, 15, 16; xxj, 16. = <sup>3</sup> I. Diæt. xviiij, 9, 10, 11; xxviiij, 20. — I. Morb. xx, 14, 24. — Morb. Sac. x, 10. = <sup>a</sup> Cels. j, 3, p. 32, l. 28. = <sup>b</sup> Æginet. j, 23. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 69; t. ij, p. 99, 733; t. iij, p. 70.

Languet in senibus vis circuitûs et impetus humorum. Secretiones crudæ sunt et glutinosæ. Hinc senes frigent et ad sensum et ad thermometrum.

APHOR. XV. <sup>1</sup> Humor. v, 4. — Aer. Aq. Loc. ij, 2. = <sup>2</sup> Aph. j, 18. — Salub. Diæt. j, 2, 26. — IV. Morb. xvij, 9. = <sup>a</sup> Cels. j, præf. pag. 19, l. 23. — Cels. j, 3, p. 33, l. 7. = <sup>b</sup> Cels. j, præf. p. 19, l. 21. — Ægin. j, 53. — Plin. xj, 53. = <sup>c</sup> Cels. j, præf. pag. 19, l. 25. — *Vide* van-Swieten, tom. ij, pag. 101.

Ventres hyeme ad thermometrum calidiores non sunt. Sensus verò docet ventriculum hyeme ad capescendos cibos plus alacritatis et appetitûs experiri. Leviores sentimur, licet gravitas ad stateram aucta sit; somno longiori et placidiori fruimur; æqualior fit succorum nutrientium applicatio; vires organorum auctæ alimenta validiora sibi postulant, non copiam eorum majorem. Juvenes et exercitati plus absumunt, plus ergò alendos se postulant.

APHOR. XVI. <sup>1</sup> Insomn. xv, 13, 15, 16, 17. — III. Morb. xxxj, 11. — Loc. in Hom. xxxix, 1. = <sup>2</sup> Salub. Diæt. ij, 5 ad 11. = <sup>2</sup> Cels. iij, 6, p. 130, l. 32. — *Vide* Boerhaav. Aphor. practici, 587. Van-Swiet. tom. ij, p. 92, 196.

In febre major solidorum tensio, celerior humorum agitatio; hinc liquidissimi expressio, reliqui incrassatio, sitis, caloris productio, victum humidum postulant.

APHOR. XVII. <sup>1</sup> Vet. Medic. xviiij, 4, 5, &c. — Vict. Acut. v, 19, 20; xix, 6. = <sup>2</sup> Aph. ij, 49, 50. — I Diæt. ij, 10 ad 21. — III. Diæt. j, 10, 13 ad 15. — Natur.

hum. xvij, 30 ad 34. — Humor. j, 14; viij, 23. — Sal. Diæt. ij, 10. =<sup>a</sup> Cels. j, 3, pag. 24, l. 25; iij, 4, pag. 119, l. 30; et iij, 5, pag. 126, l. 24, 29. — *Vide* van-Swieten, tom. ij, pag. 101.

APHOR. XVIII. <sup>1</sup> Aph. j, 15. — Humor. viij, 24. =<sup>a</sup> Cels. j, 3, p. 33, l. 23 et 29. — *Vide* van-Swieten, t. ij, pag. 101.

APHOR. XIX. Aph. j, 11. — Humor. iij, 82. =<sup>a</sup> Cels. iij, 4, pag. 122, l. 21; iij, 5, pag. 127, l. 5, 10; iij, 6, p. 133, l. 17.

APHOR. XX. <sup>1</sup> Humor. iij, 83. — Natur. Hum. xix, 8. — II Epid. j, 17. =<sup>2</sup> Aph. ij, 29. — *Vide* Authores de Crisibus passim. — Van-Swieten, tom. ij, p. 53, 81 et 369.

APHOR. XXI. <sup>1</sup> Humor. j, 2, 24; iij, 85. =<sup>2</sup> VII. Epid. xxxij, 4. — Aphor. vij, 61. — Loc. in Hom. xxxiiij; lv, 11, 12. — *Vide* van-Swieten, tom. ij, p. 131, 369, 711; tom. iij, p. 102.

IN SECTIONEM I. 29

APHOR. XXII. <sup>1</sup> Aph. iv, 13. — Humor. iij, 84. — Humor. j, 3. — V Epid. xxv, 12. — VII. Epid. xxxij, 1. = <sup>2</sup> Aph. vij, 68. = <sup>3</sup> Aph. j, 24; ij, 29. — Loc. in Hom. xxxviiij, 9, 10. — VII Epid. xxxij, 5. = <sup>4</sup> Aph. iv, 1, 10; v, 29. — I. Morbor. Mulier. lxiiij, 11.

Constituto semel erethismo, natura semper ad concoctionem hostilis materiae vergit, in illud intenditur tota. Concoctio peracta dicitur, ubi organis continentibus laxatis, irritante fluidorum indole mitificatâ, omnia ad excretionem secundum naturæ leges delabuntur, et proprio quasi motu feruntur. Tunc tantummodo purgandum; alioquin naturæ detrahes, non morbo, ut lib. *de Humoribus* exposuit Hippocrates. Exceptio tamen huic regulæ datur, si materia exundans, non cocta, sed motu rapta incondito et spontaneo feratur ad organa excretoria. Rarò id evenire pronuntiat Hippocrates, quod forsàn in primævis hominibus magis sobriis verum fuit, nunc sæpiùs id accidere aiunt ferè omnes. — *Vide* Sydenham, sect. j, cap. iv. Van-Swieten, t. ij, p. 131. Hollerium in hunc

30 NOTÆ IN APHOR.

Aphorismum; Ballonium, lib. ij. Epidem. Baglivium passim; et præcipuè Th. Glass, Comment. 7°. de alvi dejectione et vomitu.

APHOR. XXIII. <sup>1</sup> Humor. iij, 86, 87. — Aph. j, 25. = <sup>2</sup> Loc. in Hom. xxxix, 9. — Vict. Acut. lij, 8, 9. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 194.

Ingens sæpè sub minimâ mole latet malignitas. Sæpè atomus pestifera totam humorum molem contaminat. Pauca quidem per vomitorium sub februm initio tollebat Sydenhamus, sed fructu tanto, ut, si abstinuisset à medicamento, vires labefactaret diarrhœa. Quod autem spectat deliquium animi, non semper naturæ imbecillitatem arguit, si cætera secundùm ordinem benè se habeant; sed sæpè actuosæ naturæ impetum, sæpè plethoræ cacochymicæ vacuationem, fatiscente vasorum turgescientium tono nimio. *Vide* Sydenham, sect. j, c. 4.

APHOR. XXIV. <sup>1</sup> Humor. iij, 97. — Purgant. iv, 1; v, 4. = <sup>2</sup> Aph. iv, 10. — Aph. j, 22. — Vict. Acut. xlij,



I; xxxvj, 3 et seq. = <sup>3</sup> I. Morb. Mul. xxij, 9.

In acutis affectibus, vel incipiente morbo, vel absolutâ naturæ dimicatione, tantummodò locum obtinere possunt purgantia. Incipiens morbus solida nondum constrictis erethismo febrili; turgēt imò sæpè materies, ruens ad effluxum. Recedente sub finem morbi erethismo, supersunt hostiles reliquæ quibus liberandum est corpus. Per purgantia hîc non intelligenda sunt quæ alvum sine irritatione subluunt, ut cassia, tamarindi, nec ipsam, Sanctorio teste, perspirationem conturbant. Horum pleraque Veteribus erant aut incognita, aut usitata parùm, forsan ideo quòd fortiora primævorum hominum corpora iis non commoverentur.

APHOR. XXV. Aph. j, 2, 23; iv, 3.  
 — Humor. ij, 49. — VI. Epid. iv, 30.  
 — *Vide* van - Swieten, tom. j, p. 12;  
 tom. iv, p. 557.



## ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

α'. Ἐν<sup>1</sup> ᾧ νεσήμεαλι<sup>α</sup> ὑπν<sup>⊗</sup> πό-  
νον ποίεει, θανάσιμον· ἢν ᾧ ὑπν<sup>⊗</sup>  
ἀφελή, εἰ θανάσιμον.

β'. Ὅκκ παραφροσύνην ὑπν<sup>⊗</sup> α  
παύη, ἀγαθόν.

γ'. Ἰπν<sup>⊗</sup>, α ἀβρυπνίη, ἀμεφό-  
τερα εἰ μελίσια μᾶλλον χυόμδμα,  
κακόν.

δ'. α Οὐ πλησμονή, εἰ λιμός, εἰ δ'  
ἄλλο εἰδέν ἀγαθόν, β ο, τι ἂν μᾶλλον  
εἰ φύσι<sup>⊗</sup> ἦ.

ε'. Κόπτοι α αὐτόμαίλοι φράζσσι νέ-  
σας.

ς'. Ὅκόσοι πονέοντες τι εἰ σώματι<sup>⊗</sup>  
τὰ πολλὰ εἰ πόνων ὅκκ ἀθάνατοιαι,  
α τειλείσιν ἢ γνώμη νοσεί.

## S E C T I O S E C U N D A.

1. Q U O <sup>1</sup> in morbo <sup>a</sup> somnus laborem facit, lethale : si verò somnus juvet, non est lethale.

2. Ubi somnus delirium <sup>a</sup> sedat, bonum.

3. <sup>1</sup> Somnus, <sup>a</sup> vigilia, utraque modum excedentia, malum.

4. <sup>1</sup> <sup>a</sup> Non satietas, non fames, neque aliud quicquam bonum est, <sup>2</sup> quod naturæ modum excedat.

5. Spontanæ <sup>a</sup> lassitudines morbos denuntiant.

6. Quicumque aliquâ corporis parte dolentes dolorem ferè non sentiunt, <sup>a</sup> his mens ægrotat.

F

7. Quæ longo tempore extenuantur corpora, lentè reficere oportet: <sup>1</sup> quæ verò brevi, celeriter.

8. Si à morbo cibum quis capiens non roboretur, indicat corpus uberiori alimento uti. Si verò cibum non capienti hoc eveniat, <sup>2</sup> evacuatione opus habere nosse oportet.

9. Corpora, ubi quis purgare voluerit, facilè fluentia reddere oportet.

10. Impura corpora quò magis nutritiveris, eò magis lædes.

11. Facilius est repleri potu <sup>a</sup> quam cibo.

12. Quæ in morbis post crisin relinquantur, <sup>1 a</sup> recidivas facere solent.

13. Quibus crisis fit, his nox ante exacerbationem gravis est: <sup>a</sup> sub-

ζ'. Τὰ ἐν πολλῇ χρόνῳ λεπτονήρμα  
 σώματα νωθρῶς ἐπαναλρέφειν δεῖ·<sup>1</sup>  
 τὰ δὲ ἐν ὀλίγῳ, ὀλίγως.

η'. Ἦν ἐκ νέσσε τροφὴν λαμβάνων  
 τις μὴ ἰχύη, <sup>1</sup> ζημῶνδ' ὅτι πλείονε  
 τροφῇ τὸ σῶμα χρέεται· ἢν δὲ, τροφὴν  
 μὴ λαμβάνοντι, τῆτο γίνηται, <sup>2</sup> χρεὶ  
 εἰδέναι ὅτι κενώσιος δεῖται.

θ'. Τὰ σώματα χρεὶ, ὅκασ ἂν τις βέ-  
 ληται καθάρειν, <sup>a</sup> ἄργα ποίειν.

ι'. Τὰ μὴ καθαρά τῆσ' σωμάτων  
 ὀκοσον ἂν θρέψης, μᾶλλον βλάψεις.

ια'. Ῥᾶον πληρῆσθαι <sup>1</sup> ποτῆ, ἢ σι-  
 τίς.

ιβ'. Τὰ ἐγκαταλιμπανόμενα ὅν τῆσι  
 νέσοισι μετὰ κρείσιν, <sup>1</sup> <sup>a</sup> ὑποτροφὰς  
 ποίειν εἴωθεν.

ιγ'. <sup>1</sup> Ὀκόσοισιν ἢ κρείσις γίνεται,  
 τειλέοισιν ἢ νύξ δύσφορος ἢ πρὸς τῆ

παροξυσμῶ· <sup>α</sup> ἢ ᾗ ἐπιῦσα δ'φορωτέρη  
ὡς ἐπιτοπολύ.

ιδ'. <sup>1</sup> Ἐν τῆσι τ' κοιλίης ῥύσειν αἱ  
μελαβολαὶ τῆς Διαχωρημάτων ἀφελέει-  
σιν, <sup>α</sup> ἢ μὴ ἐς τὰ πονηρὰ μελαβάλλη.

ιε'. <sup>1</sup> Ὅκω φάρυγγί νοσέει, ἢ φύ-  
μαλα ἐν τῷ σώματι ἐκφύεται, σκέπ-  
τεσθαι χρὴ τὰς ἐκκρίσεις· ἢ γὰρ χο-  
λώδεις ἔωσι, τὸ σῶμα ξυνοσεί· ἢ ᾗ  
ὅμοιαι τοῖσιν ὑγιαίνουσι γίγνεται, ασ-  
φαλὲς τὸ σῶμα τρέφειν.

ισ'. <sup>α</sup> Ὅκω λιμὸς, ἔ δ'εἰ πονέειν.

ιζ'. <sup>α</sup> Ὅκω ἂν τροφή παρὰ φύσιν  
πλείων ἐσέλθη, τῷτο νῦσον ποιεί· δη-  
λοῖ ᾗ ἢ ἰήσις.

ιη'. Τῶν τρεφόντων ἀθρόως καὶ τα-  
χέως ταχῆται καὶ αἱ Διαχωρήσεις γί-  
γνεται.

sequens verò levior plerumque.

14. <sup>1</sup> In alvi profluviis mutationes excrementorum juvant, <sup>a</sup> nisi in prava mutantur.

15. <sup>1</sup> Ubi fauces ægrotant, aut tubercula in corpore exoriuntur, excretiones inspicere oportet: si enim biliosæ fuerint, corpus unà ægrotat: si verò similes sanis fiant, tutum est corpus nutrire.

16. <sup>a</sup> Ubi fames, non oportet laborare.

17. <sup>a</sup> Ubi cibus præter naturam copiosior ingressus fuerit, id morbum facit. Ostendit autem sanatio.

18. Eorum quæ confertim et celeriter nutriunt celeres etiam fiunt egestiones.

38 H I P P. A P H O R.

19. Acutorum morborum non omninò<sup>a</sup> tutæ sunt prædictiones, neque mortis, neque sanitatis.

20. Quibus,<sup>a</sup> dum sunt juvenes, alvi sunt humidæ, iis senescentibus siccantur. Quibus verò, dum sunt juvenes, alvi sunt siccæ, his senescentibus humectantur.

21.<sup>a</sup> Fainem vini potio solvit.

22.<sup>1 a</sup> A repletione quicumque fiunt morbi, evacuatione sanantur; et quicumque ab evacuatione, repletione:<sup>2</sup> et aliorum contrarietas sanat.

23. Acuti morbi in quatuordecim diebus judicantur.

24. Septimorum<sup>a</sup> quartus est index. Alterius septimanæ octavus est initium. Notandus verò undecimus: is enim quartus est alterius septimanæ.



ιθ'. Τῶν ὀξέων νησημάτων ἔ πάμπαν <sup>α</sup> ἀσφαλέες αἱ προδιαγορεύσεις, ἔτε β' θανάτου, ἔτε γ' ὑγείης.

κ. Ὀκόσοισι <sup>α</sup> νέοισιν ἔχσιν αἱ κοιλία ὑγραί εἰσι, τετάρτοις ἀποξηράσκουσι ξηραίνον). Ὀκόσοισι ἔ νέοισιν ἔχσιν αἱ κοιλίαί ξηραί εἰσι, τετάρτοις πρεσβυτέροις γινομύμοισιν ὑγραίνον).

κα'. <sup>α</sup> Λιμὸν θάρηξιν λύει.

κβ'. <sup>1</sup> <sup>α</sup> Ἀπὸ πλησμονῆς ὀκόσα ἂν νησημάτια γένη), κένωσις ἰη). Ἐ ὀκόσα ἀπὸ κενώσεως, πλησμονή <sup>2</sup> καὶ τῶν ἄλλων ἢ ὑπεναντίωσις.

κγ'. Τὰ ὀξέα τῶν νησημάτων κρίνε) ἐν τεσσαρεσκάδεκα ἡμέρησι.

κδ'. Τῶν ἐπτὰ ἢ <sup>α</sup> τειάρτη ἐπίδηλως. ἐτέρης ἐβδομάδως ἢ ὀγδὴ ἀρχή. θεωρητὴ ἢ ἡ ἐνδεκάτη· αὕτη γάρ ἔστι τειάρτη γ' ἐτέρης ἐβδομάδως. θεωρητὴ ἢ

πάλιν ἢ ἑπτακαιδεκάτη. αὕτη γάρ ἔστι  
τετάρτη μὲν ἀπὸ τῆς τεσσαρεσκαδεκά-  
της, ἑβδόμη δὲ ἀπὸ τῆς ἑνδεκάτης.

κε'. Οἱ θερμοὶ <sup>α</sup> τετραπλοῖοι τὰ  
πολλὰ γίνονται βραχέες· οἱ δὲ φθινοπω-  
ρινοὶ, μακροὶ, ἔστι μάλιστα οἱ πρὸς τὴν  
χειμῶνα συνάπτοντες.

κς'. <sup>1</sup> Πυρετὸν <sup>α</sup> ἐπὶ σπασμῶν βέλ-  
τιον γνῆσθαι, <sup>2</sup> ἢ σπασμὸν ἐπιπυρετῶν.

κζ'. <sup>1</sup> Τοῖσι <sup>α</sup> μὴ κτὲν λόγον κερφί-  
ζουσιν ἔδει πιστεύειν, ἐδὲ φοβεῖσθαι  
λίω τὰ μοχθηρὰ γινόμενα παραλόγως.  
τὰ γὰρ πολλὰ τῶν τοιαύτων ἔστιν ἀβέβαια,  
καὶ ἔπανυτοι διαμῦναι ἐδὲ χρονίζειν  
εἴωθε.

κη'. Τῶν πυρεσόντων μὴ παντάπα-  
σιν ἐπιπολάωσιν, <sup>1</sup> τὸ διαμῦναι καὶ μη-  
δὲν ἐνδιδόναι τὸ σῶμα, <sup>2</sup> ἢ καὶ συν-

Notandus rursùm decimus septimus: hic enim est quartus quidem à decimo-quarto, septimus verò ab undecimo.

25. Quartanæ æstivæ<sup>a</sup> plerumque fiunt breves: autumnales verò longæ,<sup>1</sup> et maximè quæ prope hyemem incidunt.

26. <sup>1</sup> Febrem convulsioni supervenire melius est, <sup>2</sup> quàm convulsionem feбри.

27. <sup>1</sup> His, <sup>a</sup> quæ non secundum rationem levant, credere non oportet, neque timere valdè quæ præter rationem fiunt prava. Multa enim horum sunt inconstantia, nec admodùm permanere, neque durare solent.

28. Febricitantium non omninò leviter <sup>1</sup> permanere, et nihil remittere corpus, <sup>2</sup> aut etiam magis quàm pro

42 H I P P. A P H O R.

ratione colliquefieri, <sup>a</sup> malum est. Illud enim morbi longitudinem indicat, <sup>b</sup> hoc verò infirmitatem.

29. <sup>1</sup> Incipientibus morbis, <sup>2</sup> si quid movendum videatur, move: <sup>3</sup> vigentibus verò, quiescere melius est.

30. Circa principia et fines omnia sunt debiliora: circa vigores verò, vehementiora.

31. A morbo bellè comedenti nihil proficere corpus, malum est.

32. Ut plurimùm omnes qui malè habent, circa principia quidem benè comedentes, et nihil proficientes, ad finem rursùs cibum non appetunt: <sup>1</sup> qui verò circa initia quidem cibum omninò non appetunt, postea autem benè appetunt, meliùs liberantur.

33. In omni morbo <sup>a</sup> mente valere,

τήκεαζ<sup>a</sup> μᾶλλον τῷ κτῆ λόγον, μοχθη-  
ρόν. τὸ μὲν γὰρ μῆκ<sup>b</sup> νέσσε σημαίνει,  
τὸ δὲ ἀδένειαν.

κθ'. <sup>1</sup> Ἀρχομένων τῶν νέσων, <sup>2</sup> ἢν τι  
δοκέη κινέειν, κίνει. <sup>3</sup> ἀκμαζουσῶν δὲ,  
ἡσυχίῳ ἔχειν βέλτιον ὄσι.

λ' Περὶ τὰς δρχὰς καὶ τὰ τέλη  
πάντα ἀδενέστερα. πρὸς δὲ τὰς ἀκμὰς  
ἰχυρότερα.

λα'. Τῶν δὲ ἀρρώστῃς εὐσιτέοντι μη-  
δ' ἐν ὀπιδιδόναι τὸ σῶμα, μοχθηρόν.

32. Ὡς τὰ πολλὰ πάντες οἱ φαύ-  
λως ἔχοντες, κατ' δρχὰς μὲν εὐσι-  
τέοντες, καὶ μηδ' ἐν ὀπιδιδόντες, πρὸς  
τῶν τέλει πάλιν ἀσιτέουσιν. <sup>1</sup> οἱ δὲ κατ'  
δρχὰς μὲν ἀσιτέοντες ἰχυρῶς, ὕστερον δὲ  
εὐσιτέοντες, βέλτιον ἀπαλλάσσουσιν.

λγ'. Ἐν πάσῃ νέσῃ<sup>a</sup> τὸ ἐρῶαζ

τὴν Διάνοιαν, καὶ εὖ ἔχειν πρὸς τὰς προσφορὰς, ἀγαθόν· τὸ δὲ ἐναντίον, κακόν.

λδ'. Ἐν τῆσι νέσοισιν ἥσων κινδυνεύουσιν, οἷσιν ἂν οἰκείη τὸ φύσις, καὶ τὸ ἡλικίης, ἔτι ἔξις, καὶ τὸ ἄρης ἢ νέσος ἢ μάλλον, ἢ οἷσιν ἂν μὴ οἰκείη κατὰ τι τῶν τῶν.

λε'. Ἐν πάσῃσι τῆσι νέσοισι, τὰ πρὸς τὸ ὀμφαλὸν<sup>α</sup> καὶ τὸ ἥτρον πᾶχος ἔχειν, βέλλιον ἔστι· τὸ δὲ σφόδρα λεπτὸν<sup>β</sup> καὶ ἐπιτετηκὸς, μοχθηρόν. Ἐπιφαλὲς δὲ τὸ τοιῦτον, καὶ πρὸς τὰς κάτω καθάρσιαις.

λε'. Οἱ ὑγιεινῶς ἔχοντες τὰ σώματα<sup>α</sup> ἐν τῆσι φαρμακείῃσι καθαρόμυθοι ἐκλύον<sup>β</sup> ταχέως, καὶ οἱ πονηρῆ τροφῆς χρεώμυθοι.

et benè se habere ad ea quæ offeruntur , bonum est : contrarium verò malum.

34. In morbis minùs periclitantur ii quorum naturæ, et ætati, et habitui, et tempori magis similis fuerit morbus, quàm ii quibus horum nulli fuerit similis.

35. In omnibus morbis, <sup>1</sup> quæ partes ad <sup>a</sup> umbilicum et inum ventrem sunt, crassitudinem habere, melius est: valdè autem tenues et <sup>b</sup> eliquatas ipsas habere, malum. Periculosum verò illud est, etiam ad infernas purgationes.

36. Qui sana habent corpora, <sup>a</sup> pharmacis purgati citò exsolvuntur, ut et qui pravo utuntur cibo.

37. Qui benè valent corpore, <sup>1</sup> purgatu sunt difficiles.

38. Paulò deterior et potus et cibus, jucundior autem, eligendus potiùs, quàm meliores quidem, sed ingratiore.

39. <sup>1</sup> Senes ut plurimùm quidem <sup>a</sup> juvenibus minùs ægrotant: <sup>2</sup> quicunque verò ipsis <sup>b</sup> morbi fiunt diuturni, plerumque commoriuntur.

40. Raucedines, et gravedines, *in* valdè senibus non coquuntur.

41. Qui sæpè et vehementer, absque manifestâ causâ, animo linquntur, ex improvise moriuntur.

42. Solvere <sup>a</sup> apoplexiam, vehementem quidem, impossibile: debilem verò, non facile.

43. Ex <sup>a</sup> iis qui strangulantur et resolvuntur, nondum autem sunt mor-



λζ'. Οἱ εὖ τὰ σώματα ἔχοντες ἰ  
 Φαρμακεύεσθ' ἐργάδεις.

λη'. Τὸ μικρῶν χεῖρον κὶ πόμα, ἔ  
 σιτίον, ἡδίων ῥ, τῶν βελιόνων μὲν,  
 ἀηδεσέρων ῥ, μᾶλλον αἰρετέον.

λθ'. ἰ Οἱ πρεσβύτῃ <sup>α</sup> τῶν νέων τὰ  
 μὲν πολλὰ νοσέσιν ἦσαν. <sup>2</sup> ὅσα δὲ ἂν  
 αὐτέοισι χρόνια <sup>β</sup> νοσήματα γένητῃ, τὰ  
 πολλὰ ξυναποθνήσκει.

μ'. Βράγχαι ἔ κόρυζαι τοῖσι σφό-  
 δρα πρεσβύτησιν ἔ πεπαίνοντῃ.

μα'. Οἱ ἐκλυόμενοι πολλάκις ἔ ἰχυ-  
 ρῶς, ἂνδρ' φανερῆς προφάσιθ', ἔξα-  
 πίνης τελούτῳσι.

μβ'. Λύειν <sup>α</sup> λῦπληξίλῳ, ἰχυρὴν  
 μὲν, ἀδύνατον. ἀσθενέα ῥ, ἔ ρήϊδιον.

μγ'. <sup>α</sup> Τῶν ἀπαγχονίων <sup>α</sup>, ἔ καλα-  
 λυομένων, μηδέπω ῥ τεθνηκότων, οὕκ

ἀναφέρουσιν <sup>1</sup> οἷσιν ἂν ἀφρὸς ἢ πρὸς τὸ  
σώμα.

μδ'. Οἱ παχέες <sup>a</sup> σφόδρα κτ' φύσιν  
ταχυθάναστοι γίγνοντ' μᾶλλον τῶν ἰχνῶν.

με'. Τῶν ἑπιληπτικῶν τοῖσι νέοισιν  
ἀπαλλαγὴν αἰ μείλασολαί, <sup>1</sup> μάλιστα  
τ' ἡλικίης, <sup>2</sup> καὶ τῶν χαρίων, εἰ τῶν  
βίων, ποιέουσι.

μετ'. Δύο πόνων ἅμα γινομένων, μὴ  
κτ' τ' αὐτὸν τόπον, ὁ σφοδρότερος  
<sup>1</sup> ἀμαυροῖ τ' ἕτερον.

μζ'. Περὶ τὰς θύσεις τ' πύς οἱ  
πόνου, καὶ οἱ πυρετοὶ ξυμδύνουσι μᾶλ-  
λον, ἢ θυομύς.

μη'. Ἐν πάσῃ <sup>a</sup> κινήσει τ' σώματι,  
ὁπόταν ἀρχῆ) πονέειν, τὸ ἀναπαύειν  
εὐθὺς ἀκόπον.

μθ'. Οἱ εἰθισμένοι τὰς συνήθεις πό-

tui, non se recolligunt, <sup>1</sup> quibus spuma circa os fuerit.

44. Qui naturâ <sup>a</sup> sunt valdè crassi, magis subito moriuntur, quàm graciles.

45. Epilepticis pueris, mutationes, <sup>1</sup> maximè ætatis, <sup>2</sup> et regionum, et vitæ, liberationem faciunt.

46. Duobus doloribus simul obortis, non in eodem loco, vehementior <sup>1</sup> obscurat alterum.

47. Circa puris generationes, dolores et febres magis accidunt, quàm ipso facto.

48. In omni <sup>a</sup> corporis motu, quando dolere cœperit, interquiescere, statim lassitudinem curat.

49. Consueti solitos labores ferre,

50 H I P P. A P H O R.

etiamsi fuerint debiles, <sup>a</sup> aut senes, insuetis, robustis licet et juvenibus, faciliùs ferunt.

50. A multo tempore <sup>a</sup> consueta, etiamsi fuerint deteriora, <sup>b</sup> insuetis minùs turbare solent: <sup>1</sup> oportet igitur etiam ad insolita se vertere.

51. Multùm, et derepentè <sup>1</sup>, vacuare, <sup>2 a</sup> aut replere, aut <sup>3</sup> calefacere, <sup>b</sup> aut <sup>4</sup> frigefacere, aut alio quocunque modo corpus <sup>5</sup> movere, <sup>c</sup> periculosum est. <sup>6</sup> Enimverò omne multum (i. e. *nimum*) naturæ est inimicum. <sup>7</sup> Quod verò <sup>d</sup> paulatim fit, tutum est: tum aliàs, et si quis <sup>8</sup> ex altero ad alterum transeat.

52. Omnia ex ratione <sup>a</sup> facienti, et non secundum rationem evenientibus, non transeundum ad aliud, <sup>b</sup> manente eo, quod visum est ab initio.

Σ Ε Κ Τ Ι Ο Ι Ι . 51

νβς φέρειν , καὶ ὡςιν ἀσθενέες , <sup>α</sup> ἢ γέροντες , τῶν ἀσυνήθων , ἰχυρῶν τε καὶ νέων , ῥᾶον φέρουσι .

ν . Τὰ ἐκ πολλῶν <sup>α</sup> χρόνων συνήθεια , καὶ ἢ χεῖρω , τῶν ἀσυνήθων <sup>β</sup> ἥσασον ἐνοχλεῖν εἶωθε . <sup>1</sup> δεῖ ἔν τῷ εἰς τὰ <sup>ε</sup> ἀσυνήθεια μετὰβάλλειν .

να . Τὸ καὶ πολὺ , καὶ ἔξαπίνης , <sup>1</sup> κενῶν , <sup>α</sup> ἢ πληρῶν , <sup>3</sup> ἢ <sup>β</sup> θερμαίνειν , <sup>4</sup> ἢ ψύχειν , ἢ ἄλλως ὀκωσῶν <sup>4</sup> τὸ σῶμα <sup>ε</sup> κινεῖν , σφαλερόν . <sup>6</sup> καὶ γὰρ πᾶν τὸ πολὺ τῇ φύσει πολέμιον . τὸ <sup>7</sup> κατ' ὀλίγον <sup>δ</sup> , ἀσφαλές . καὶ ἄλλως , ἢν καὶ τις <sup>δ</sup> ἔξ ἑτέρου ἐφ' ἕτερον μεταβαίνει .

νε . Πάντα καὶ λόγον <sup>α</sup> ποιέοντι , καὶ μὴ γινομένων τῶν καὶ λόγον , μὴ μεταβαίνειν ἐφ' ἕτερον , <sup>β</sup> μόνον τῷ εἰς δόξαν τῷ ἔξ ἀρχῆς .

νγ'. Ὀκόσοι τὰς κοιλίας ἵ ὑβράς  
 ἔχουσι, νέοι μὲν ὄντες, βέλτιον ἀπαλ-  
 λάσσουσι τῶν τὰς ξηρὰς ἐχόντων. ἐς ἣ τὸ  
 γῆρας, χεῖρον ἀπαλλάσσουσι· ξηρά-  
 νον γὰρ, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, τοῖσιν ἀπο-  
 γηράσκουσι.

νδ'. Μεγέθει ἣ ἂ σῶμα ἔστω ἐννεάσαι  
 μὲν, ἐλευθέριον καὶ σὺν ἀειδές· ἐγῆ-  
 ράσαι ἣ, δύσρητον καὶ χεῖρον τῶν  
 ἐλασσόνων.



53. Quicumque alvos habent humidās, dum quidem juvenes sunt, melius liberantur his, qui siccās habent. Ad senectutem verò, pejus liberantur: siccantur enim ut plurimum alvi senescentibus.

54. Procerò corpore <sup>a</sup> juventutem quidem degere, liberale est, nec deforme: insenescere verò, incommodum, et parvis deterius.



---

# N O T Æ

I N

## SECTIONEM SECUNDAM.

---

APHOR. I. <sup>1</sup> I. Epid. iij, 8. — II. Epid. iij, 12. — Aph. iv, 67. — I. Prædict. xv, 5, 17. — VI. Epid. viij, 5. = <sup>a</sup> Celf. ij, 6, pag. 55, l. 32. — *Vide van-Swieten, tom ij, pag. 398.*

Lassitudines à somno, artubus quasi fractis, sæpè eis accidunt qui insueta et immodica exercitia experti sunt. Norunt id equites novitii. Secùs, hætere in ultimis vasis excrementitios humores significant, perspirationemque cohiberi. Id etiam convalescentibus à morbo post cibos justo pleniores accidit.

APHOR. II. Epid iij, 11, 12. = <sup>a</sup> Celf. iij, 18, pag. 152, l. 4.



IN SECTIONEM II. 55

APHOR. III. Aph. vij, 71. =<sup>1</sup> Humor. iij, 78. — Coac. ij, 35. — VI. Epid. vj, 6. =<sup>2</sup> Cels. ij, 4, pag. 51, l. 4. & l. 7. — *Vide* van-Swieten, tom. ij, p. 42.

APHOR. IV. <sup>1</sup> VI. Epid. viij, 16. — II. Morb. xvj, 13. — Aph. ij, 22. — <sup>2</sup> Aph ij, 51. = Vet. Medic. xv, 10, 15. =<sup>3</sup> Cels. j, 2, p. 23, l. 26.; 3, p. 24, l. 32.

APHOR. V. Aph. iv, 31. — <sup>3</sup> Gal. de opt. Sect. ad Thrasy. cap. 31. — *Vide* van-Swieten, tom. j, pag. 695 et 710; tom. ij, p. 63, 391; t. iij, p. 553, 601.

Quotiescumque stant integræ functiones, nec vis solidorum labefactatur, nec pondus humorum augecit, alacres sumus et leves. Minuantur solidorum vis et tonus, augeatur humorum moles, utrimque pondus accedit: hinc verum et ad stateram; illinc relativum et ad sensum. Jam non sufficit novo ponderi corpus; fatiscunt crura, brachia, cervix; sanitas labascit. *Vide* aureum Sanctorii Opus, præcipuè Sect. j et v.

APHOR. VI. <sup>a</sup> Cels. ij, 2, pag. 48, l. 24; ij, 7, pag. 62, l. 27. — *Vide* van-Swieten; tom. j, pag. 5; tom. ij, p. 194; tom. iv, p. 455.

APHOR. VII. Aliment. xj, 6, 7. =  
<sup>1</sup> Aph. ij, 11, 18. — *Vide* van-Swieten, tom. iij, p. 655.

Diuturniores morbi naturæ robur extinguunt, breves prosternunt tantùm.

APHOR. VIII. <sup>1</sup> Aph. ij, 31; iv, 41, 45. vij, 64. — Coac. j, 179. = <sup>2</sup> Aph. ij, 22.

Non refert quidas sumas, sed quid concoquas. Copiosior cibus vires opprimit, non reficit. Hinc tot Hippocratica præcepta de comparatione inter vires et cibos instituendâ. Si, rectâ mensurâ adhibitâ, cibus non reficit, signum est quòd quâ semel imbutum est corpus, labes morbosa alimenti corrumpit materiem; vacuetur ergo. *Vide* Versionem Cl. de Villebrune.

APHOR. IX. Aph. iv, 13; vij, 70.

== <sup>a</sup> Cels. iij, 18, p. 155, l. 1. — *Vide* van - Swieten, tom. ij, p. 131; tom. iv, p. 395 et 655.

Totius methodi medendi in acutis fundamentum est sententia illa, cùm in illo consistat purgationis rectè institutæ mysterium, ut mobilissima vacuentur. Mobiliora autem sunt quæ fluidiora.

APHOR. X. Aph. vij, 65, 67. — Vet. Med. xij, 11, 12; xix, 6 ad 17, — Præcept. xj, 4. — II. Morb. xvj, 13; xxj, 16 ad 20.

Falsa foret conclusio quæ indè totalem in morbis abstinentiam deduceret. Contrarium mille locis edocuit Hippocrates; præsertim cùm plus noxæ videt in nimis tenui quàm in pleniore diætâ. Sed Aphorismus noster indicat ad necessitatem talia corpora nutrienda esse, non ultrà.

APHOR. XI. Vet. Medic. xij, 3, 9. — Aliment. xj, 5. — Aph. ij, 7, 18.

==<sup>a</sup> Cels. j, 2, pag. 23, l. 29. —  
*Vide* van-Swieten, tom. ij, p. 92.

Alimentum liquidum vulgò, nec sine exceptione tamen, materiam tenuiorem præbet, solvendam facilè, adeòque et plus implentem, et vacuationi promptiori aptam.

APHOR. XII. <sup>1</sup> Humor. vij, 16, 17.  
 — II. Epid. j, 81; iij, 72. — IV.  
 Epid. xvij, 20. — VI. Epid. ij, 32;  
 iij, 62. — II. Morb. xvj, 12, 13;  
 xx, 20; xxxvij, 19. — Aph. iv,  
 36. ==<sup>a</sup> Cels. ij, 14, pag. 89, l. 16.  
 — *Vide* van-Swieten, tom. ij, p. 52.

Vel ejusdem morbi recidivam facit materies illa, vel alium morbum. Sic furunculos atque abscessus variolæ, sic asthmata peripneumonix relinquunt; sic hepatitis in hæmorrhoidas vertitur.

APHOR. XIII. <sup>1</sup> VI. Epid. ij, 42. —  
 I. Epid. iij. — III. Epid. iij, 66. ==<sup>a</sup>  
 Cels. iij, 5, pag. 124, l. 32. — *Vide*  
 Boerhaav. Inst. Med. 931, et seq.

*Vide* van-Swieten, tom. ij, pag. 79.

APHOR. XIV. <sup>1</sup> Il. Epid. ij, 3. —  
Aph. j, 2. = <sup>2</sup> Aph. iv, 21. — *Vide*  
van-Swieten, t. ij, p. 356.

APHOR. XV. <sup>1</sup> Aph. iij, 26. — *Vide*  
Sanctorium, sect. j, passim. *Vide* van-  
Swieten, tom. ij. p. 606.

Morborum qui parti alicui incumbunt origo triplex. Vel enim illam, illæso cæteroquin corpore, invadunt; vel totius corporis læsi symptomata, unam præcipuè partem occupant; aut demum, dum desæviunt in unam, cæteras, quasi metastasi factâ, liberant. Cuique horum casuum sua sunt signa. Sed universalem affectionem designat excrementorum omnium perversio.

APHOR. XVI. <sup>2</sup> Cels. j, 2, pag. 24, l. 17.

APHOR. XVII. Aph. ij, 22. — Vet. Med. viij, 16; xij, 10; xij, 11, 24;

xix, 6, 31. — I. Diæt. iij, 15. — III. Diæt. xv, 1, 6. — Loc. in Hom. Lij, 8, 9. — Sanit. tuend. ad Demet. 6. — Affect. xxviiij, 1, 2. — Morb. Sacr. xviiij, 30. — Epist. Abderit. ad Hip. 40. — *Vide* van-Swieten, t. ij, pag. 32. — *Vide* versionem et textum Cl. de Villebrune.

APHOR. XVIII. Aph. ij, 7, 11. — Aliment. xj, 4, 5. — VI. Epid. v, 37, 53. — 18 et 19. *Vide* Sanctor. sect. iij, 60.

APHOR. XIX. Decent. Ornat. x, 7, 8. =<sup>a</sup> Cels. ij, 6, p. 57, l. 33. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 53, 432.

APHOR. XX. Aph. ij, 53. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 336.

Si, ob acutiorem fibrarum intestinalium sensum, alvus sit juveni laxior, senescenti tardabitur. Si juniore ob siccitatem tardior fuerit, senescenti laxabitur.

APHOR. XXI. <sup>a</sup> Cels. j, 3, p. 26, l. 29.

IN SECTIONEM II. 61

APHOR. XXII. <sup>1</sup> Natur. Human. xvij, 11, 12, 13. — San. tuend. ad Dem. 7. — VI. Epid. viij, 16. — Aph. ij, 8. — Flat. ij, 9, ad 16; iij, 2, 3. = <sup>2</sup> Aph. ij, 8. — Vet. Medic. xxxiij, 18. — Loc. in Hom. lj, 6; liij, 2; liv, 6. — I. Epid. ij, 95. — Morb. Sacr. xviiij, 30, 32, 33, 35. = <sup>a</sup> Cels. j, 3, p. 28, l. 5. — *Vide van-Swieten*; t. j, pag. 345; t. ij, pag. 256.

APHOR. XXIII. Aph. ij, 19. — Judicat. iv, 12. — Coac. j, 190, 211. — *Vide van-Swieten*, t. ij, p. 84.

Lege hîc attentè meditandam Meletiï expositionem, quam nobis in hunc aphorismum noscendam tradidit Cl. de Villebrune, toties nobis laudandus.

APHOR. XXIV. Aph. iv, 36, 71. — Septimest. viij, 6. — Judicat. ij, 7, ad 12. — Prænot. xx, 5, ad 10. = <sup>a</sup> Cels. iij, 4, pag. 121, l. 1, ad 9. — *Vide van-Swieten*, t. ij, p. 421, 425, 427, 430.

Doctrinam hanc fusè et doctè defendit in observatis suis inter recentiores Cl. de Haën Rat. Med. tom. j; impugnavit doctè et modestè Cl. Le Roy,

62 NOTÆ IN APHOR.

Monspeliensis Professor, libro de Prognosi. Plura certè in Edicto Hippocratico vera sunt. Sed observatis illius plura addere fas erat, plura detrahere quæ dies meliùs docuit. *Vide* autores prædictos Duretum, Hollerium in Hipp. Aphor. Glass, Freind, Desmars, Aubry et alios.

APHOR. XXV. <sup>1</sup> Nat. Human. xxix, 5, 6, 7. — I. Epid. iij, 17. — Coac. j, 236. = <sup>2</sup> Cels. ij, 8, p. 76, l. 9; iij, 16, p. 147, l. 7. — *Vide* Sydenham, Sect. j, cap. 5. Ballonium, Epidem. lib. ij. Van-Swieten, tom. ij, pag. 461.

APHOR. XXVI. — <sup>1</sup> I. Morb. vj, 13, 14. — Aph. iv, 57; v, 5, 70. — Coac. j, 231; iij, 80. — San. tuend. ad Dem. 10. = <sup>2</sup> Aph. vij, 13. — Coac. ij, 207; iij, 82. — Judicat. xij, 11. = <sup>3</sup> Cels. ij, 8, p. 70, l. 2 et 5. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 321.

APHOR. XXVII. <sup>1</sup> I. Prædict. vj, 16; vij, 7. — II. Prædict. xxix, 6. — Coac. j, 73; iij, 100, 109, 110. — II. Epid. iij, 132. = <sup>2</sup> Cels. ij, 7, pag. 60. l. 12.



IN SECTIONEM II. 63

et ij, 14, pag. 89, l. 16. — *Vide* Galen. de dieb. critic. Van-Swieten, tom. ij, pag. 85, 156; tom. iij, pag. 68.

APHOR. XXVIII. <sup>1</sup> Humor. iij, 17. = <sup>2</sup> Aph. v, 55. — Humor. iij, 52. = <sup>a</sup> Cels. ij, 2, p. 48, l. 8; et ij, 4, p. 51, l. 21. — <sup>b</sup> Cels. ij, 5, pag. 53, l. 24; et ij, 7, p. 58, l. 19.

Quâ proportione morbi materiem subigit febris, eâdem et vim corpori infert. Si igitur minùs quàm par est tenuetur illud, retinetur intus expellenda labes; novas, datâ occasione, molitura insidias. Si verò magis quàm pro ratione colliquescat; corporis fabricam, non morbum, a febre destrui, sana corrumpi, cuncta putredine intus grassante diffluere signum est.

APHOR. XXIX. <sup>1</sup> Aph. ij, 30. = <sup>2</sup> Aph. j, 22, 24. — II. Morb. Mul. xxiv, 16, 17, 18. = <sup>3</sup> Loc. in Hom. xxxviii, 9, 10, 11. — Purgant. iv, 1. — I. Epid. iij, 29. — II. Morb. xij, 34, 35. — III. xxiv, 57, 58, 59. — *Vide* Van-Swieten, t. ij, p. 66.

APHOR. XXX. Aph. ij, 29. — *Vide* van Swieten, t. ij, p. 65.

APHOR. XXXI. Aph. ij, 8. — Coac. j, 179. — *Vide* van-Swieten, t. I, p. 3.

APHOR. XXXII. Coac. j, 179. =  
<sup>1</sup> Aphor. vij, 6.

In priori casu vires ex præpostero cibo sumpsit morbus, illumque corrumpit. In altero, restituta fuit legitimæ diætæ ministerio sanitas; cujus indicium est alimentorum appetitus.

APHOR. XXXIII. De Medic. iij, 9. — Coac. j, 72. =<sup>a</sup> Cels. ij, 3, p. 49, l. 32.

APHOR. XXXIV. Aph. viij, I, 8. — Humor. vj, I ad 5. — Dieb. Judicat, j, II ad 15. — VI. Epid. viij, 43 ad 46. — Affection. vij, 3. — *Vide* van-Swiet. t. iij, p. 11, 70.

In corpore prædisposito, causa minùs vehemens majora creat symptomata, sed quæ tollantur faciliùs. Causa levis infanti convulsionem accersit promptè

IN SECTIONEM II. 65

sanandam : gravissima est causa, quæ senem in motus convulsivos rapit. Per hyemem eâdem exardeat vehementiâ febris ardens ac furente Syrio ; nonne ultimum furoris gradum obtinuit causa, quæ, contradicentibus omnibus, emicare facit symptomata maxima ?

APHOR. XXXV. <sup>1</sup> Prænot. x, 2. — Aph. ij, 28. — I. Morb. Mul. lxxvij, 9. = <sup>a</sup> Cels. ij, 3, p. 49, l. 21. = <sup>b</sup> Cel. ij, 4, p. 51, l. 16.

APHOR. XXXVI. Aph. ij, 37 ; iv, 16. — Verat. us. j, 2. — Epist. Dem. ad Hip. 16. = <sup>a</sup> Cels. ij, 13, p. 87, l. 24.

APHOR. XXXVII. Aph. ij, 36 ; iv, 16. — Verat. us. j, 5, 12. = <sup>1</sup> Aph. iv, 5.

APHOR. XXXVIII. De Art. xij, 10. — VI. Epid. iv, 26. — IV. Morb. xij, 7. — Affection. xlij, 1, 2. — Vict. Acut. xv, 1, 2 ; xvij, 2, 4. — Vide van-Swieten, t. ij, p. 93 ; t. iij, p. 655.

APHOR. XXXIX. <sup>1</sup> l. Morb. xx, 13, 15. = <sup>2</sup> Aph. v, 7. = <sup>a</sup> Cel. ij, 1, p. 43, l. 14. = <sup>b</sup> Cels. ij, 8, p. 73, l. 8. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 651.

Resistit fortiùs incumben-  
tibus morborum acutorum  
causis senilis rigiditas;  
sed si cedere semel coacta  
fuerit, deficit flexilitas,  
deficit tonus qui vires res-  
tituat.

APHOR. XL. *Vide* van-Swieten, t. i, pag. 89.

APHOR. XLI. Coac. j, 83.

Inhæret scilicet cordi causa morbi  
immedicabilis.

APHOR. XLII. <sup>a</sup> Cels. ij, 8, p. 76, l. 3. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 3; t. iij, p. 276, 283, 284.

APHOR. XLIII. <sup>1</sup> Morb. Sac. viij, 18. = <sup>a</sup> Cels. ij, 8, p. 76, l. 17. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 645; t. iij, p. 273. — *Vide* interpretationem Cl. de Villebrune in notis ad hanc sectionem.

APHOR. XLIV. <sup>a</sup> Cels. ij, 1, p. 47.

IN SECTIONEM II. 67

l. 24. — *Vide* van-Swieten , t. ij , pag. 284 , t. iij , p. 257.

APHOR. XLV. Aph. v , 7. — II. Prædict. xvj , 1 , 2 , 3. — Morb. Sac. xij , 6. =<sup>1</sup> Aph. iij , 28. =<sup>2</sup> VI. Epid. v , 36. — *Vide* van-Swieten , t. iij , p. 435 , 436.

APHOR. XLVI. <sup>1</sup> Humor. xj , 16 , 17. — Aliment. j , 11. — *Vide* van-Swieten , t. ij , p. 226.

APHOR. XLVII. Vet. Medic. xxxij , 8 , ad 12. — Prænot. xvij , 8. — De Ulcerib. ij , 8 , ad 11. — *Vide* van-Swieten , t. j , p. 208 , 606 , 640 , 645 ; t. ij , p. 42 , 106.

Legatur hîc curiosè quid Damascius de Archæo Helmontiano protulit , apud Cl. de Villebrune.

APHOR. XLVIII. Aph. II , 22. — Præcept. xij , 4. — Natur. Human. xvij , 14 , 15. — Flatib. ij , 14. =<sup>a</sup> Cels. j , 3 , p. 25 , l. 11 , et p. 26 , l. 33. — *Vide* van-Swieten , t. ij , p. 109.

APHOR. XLIX. II. Diæt. xlv, 2, 3, 4. =<sup>a</sup> Cel. j, 3, p. 25, l. 7.

APHOR. L. II. Diæt. xlv, 4. — Humor. iij, 115. — Humid. us. iij, 8, — Vict. Acut. xvij, 2, ad 6; xxxij, 5, 6. — Aph. j, 17. =<sup>1</sup> Aph. ij, 22, 51. =<sup>2</sup> Cels. j, p. 3, 27, l. 1. =<sup>b</sup> Cels. j, 3, p. 25, l. 9. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 285; tom. ij, p. 102, 127; tom. iij, p. 639.

APHOR. LI. Vict. Acut. xvij, 12, xxij, 15. =<sup>1</sup> Aph. j, 2; vj, 27, 39. =<sup>2</sup> Aphor. j, 3, 4; ij, 4, 17; vj, 39. =<sup>3</sup> Aph. iij, 1; v, 16. =<sup>4</sup> Aph. iij, 1; v, 17, 18, 20, 22, 23, 24. =<sup>5</sup> Aph. ij, 14. =<sup>6</sup> Aph. ij, 4. — Veter. Medic. xvij. — I. Præcept. xij, 4. — I. Morb. Mulier. xxxij, 4; xcviij, 15. =<sup>7</sup> II. Diæt. xlv, 5. — Natur. Human. xix, 7, 8. — Humor. viij, 17, 18. — Humid. us. iij, 5. — VI. Epid. ij, 47. — Affect. xlij, 3. — Vict. Acut. v, 22; x, 8. =<sup>8</sup> Aph. ij, 50, 52. =<sup>a</sup> Cels. ij, 16, p. 92, l. 19. =<sup>b</sup> Cels. j, 9, p. 40, l. 7. =<sup>c</sup> Cels. j, 3, p. 24, l. 28. =<sup>d</sup> Cels. j, 3, p. 25, l. 6. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 54; t. ij, p. 127.

IN SECTIONEM II 69

APHOR. LII. Loc. in Hom. xx, II, 12. =<sup>a</sup> Cels. iij, I, p. 112, l. 25. — Coel. Aurel. tard. passion. iv, 3, p. 454. =<sup>b</sup> Cels. iij, 9, p. 138, l. 9. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 138.

APHOR. LIII. Aph. ij, 20. =<sup>a</sup> Cels. j, 3, p. 33, l. 3. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 336.

APHOR. LIV. Præcep. xj. 10. =<sup>a</sup> Cels. ij, I, p. 43, l. 17.



## ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ.

α'. ΑΙ<sup>1</sup> μεταβολαί<sup>α</sup> τῶν ὠρέων μά-  
 λιστα τίχθισι νεσθήματα<sup>2</sup> κὺ ἐν τῆσιν  
 ὤρησιν αἰ μεγάλα μεταλλαγαί ἢ ψύ-  
 ξις, ἢ θάλψις, ἐ τ' ἄλλα κτ' λόγον  
 ἔτας.

β'. Τῶν φυσίων αἰ μὲν πρὸς<sup>α</sup> θε-  
 ρος, αἰ δὲ πρὸς χειμῶνα, εὖ ἢ κακῶς  
 πεφύκασι.

γ'. Τῶν νέσων<sup>α</sup> ἄλλα πρὸς ἄλλας  
 δὲ<sup>1</sup> ἢ κακῶς πεφύκασι· καὶ ἡλικίαι  
 τινὲς πρὸς ὄρας, κὺ κώρας, κὺ ἀφαι-  
 τας.

δ'. Ἐν τῆσιν ὤρησιν, ὅταν τ' αὐ-  
 τῆς ἡμέρης ὅτε μὲν θάλψις, ὅτε δὲ  
 ψύξις γίγνηται, φθινοπωρινὰ<sup>α</sup> τὰ νε-  
 σθήματα προσδέχεται<sup>δ</sup> χρή.



---



---

SECTIO TERTIA.

I. <sup>1</sup> <sup>a</sup> **M**UTATIONES *anni* temporum maximè pariunt morbos: <sup>2</sup> et in ipsis temporibus magnæ mutationes tum frigoris, tum caloris, et cætera pro ratiõne eodem modo.

2. Naturarum aliæ quidem <sup>a</sup> ad æstatem, aliæ verò ad hyemem, benè aut malè sunt constitutæ.

3. Morborum <sup>a</sup> alii ad alios benè <sup>1</sup> aut malè se habent: et ætates quædam ad tempora, et regiones, et victus.

4. In temporibus, quando eâdem die, modò calor, modò frigus fit, autumnales <sup>a</sup> morbos expectare oportet.

5. Austri<sup>a</sup> auditum gravantes, caliginosi, caput gravantes, segnes, dissolventes. Quum hic dominatum tenuerit, talia in morbis patiuntur. Si verò aquilonium fuerit *anni tempus*, tusses, <sup>a</sup> fauces *asperæ*, <sup>b</sup> alvi duræ, urinæ difficultates, horrores, dolores costarum, pectorum. Quum hic dominatus fuerit, talia in morbis oportet expectare.

6. Quando æstas veri similis est, sudores<sup>a</sup> in febribus multos expectare oportet.

7. In<sup>1</sup> siccitatibus<sup>a</sup> febres acutæ fiunt.<sup>2</sup> Et, si quidem annus majore parte talis fuerit, qualem fecit constitutionem,<sup>3</sup> ut plurimum tales etiam morbos expectare oportet.

8. In constantibus<sup>a</sup> temporibus,

ε'. Νότοι<sup>a</sup> βαρυήκοοι, ἀχλυώδεις, καρηδαρικοί, νώτροι, Διφυλικοί. ὁκόταν ἔτως δυνατεύη, τοιαῦτα ἐν τῆσιν ἀρρώσισι πάχυσιν. ἢν ᾗ βόρειον ἤ, βῆχες, <sup>b</sup> φάρυγγες, κοιλίᾳ σκληραὶ, δυσπείᾳ, φεικώδεις, ὀδύναμ πλυσρέων, σιθέων. ὁκόταν ἔτως δυνασθή, τοιαῦτα ἐν τῆσιν ἀρρώσισι προσδέχεσθ<sup>ς</sup> χρή.

ς'. Ὁκόταν θέρθ<sup>ς</sup> γένη<sup>ς</sup> ἤελ ὁμοιον, ιδρωτας<sup>a</sup> ἐν τοῖσι πυρελοῖσι πολλὰς προσδέχεσθ<sup>ς</sup> χρή.

ζι' <sup>1</sup> Ἐν τοῖσιν <sup>a</sup> ἀνχμοῖσι πυρελοῖσι ὀξέες γίνον<sup>ς</sup>. <sup>2</sup> καὶ ἢν μὴ ἔπι πλέον ἢ τὸ ἔτθ<sup>ς</sup> τοιστέον ἔον, οἴλω τὴν καλάσασιν ἐποίησεν, <sup>3</sup> ὡς ἔπιτοπολὺ καὶ νισίμαλα τοιαῦτα δεῖ προσδέχεσθ<sup>ς</sup>.

η'. Ἐν τοῖσι <sup>a</sup> καθεσεῶσι καμροῖσιν;

ἢν ἀραιῶς τὰ ἀραιὰ ἀποδίδωσιν ,  
 δύσαθέες , καὶ δὲκρινέες , αἱ νῆσοι  
 γίνοντ'· ἐν ᾗ τοῖσιν <sup>b</sup> ἀκαλασάτοισιν ,  
 ἀκατάστατοι , & δύσκριτοι.

θ'. <sup>1</sup> Ἐν <sup>a</sup> φθινοπώρῳ ὀξύτατ' αἱ  
 νῆσοι , καὶ θαναλωδέστατ' τὸ ἐπίπαιον·  
<sup>2</sup> <sup>b</sup> ἢ ᾗ ᾗ ὑγιεινότατον , καὶ ἥκιστα θανα-  
 τῶδες.

ί. Τὸ φθινόπωρον <sup>a</sup> τοῖς φθίνουσι  
 κακόν.

ια. Περί ᾗ τῶν αἰρέων , ἢν μὲν ὁ χει-  
 μῶν <sup>a</sup> αὐχμηρὸς καὶ βόρειος γένητ' , τὸ  
 ᾗ ἔαρ ἔπομβρον & νότιον , <sup>1</sup> ἀνάγκη τ'  
 θέρειος πυρετὸς ὀξείας , & ὀφθαλμίας ,  
<sup>2</sup> καὶ δυσεντερίας γίνεσθαι , μάλιστα ᾗ  
 τῆσι γυναῖξιν , & ἀνδρῶν τοῖσιν ὑγροῖσι  
 τὰς φύσιας.

ιβ. Ἦν ᾗ νότιος ὁ χειμῶν , <sup>a</sup> καὶ  
 ἔπομβρος , & εὐδὲς γένητ' , <sup>1</sup> τὸ

si tempestivè tempestiva reddantur; constantes, et judicatu faciles fiunt morbi: in inconstantibus<sup>b</sup> autem, inconstantibus, et difficiles judicatu.

9. In <sup>1</sup> <sup>a</sup> autumno morbi acutissimi, et perniciosissimi omninò: <sup>2</sup> <sup>b</sup> ver autem saluberrimum, et minimè exitiale.

10. Autumnus <sup>a</sup> tabidis malus.

11. Quod ad *anni* tempora, si quidem hyems <sup>a</sup> sicca et aquilonia fuerit, ver autem pluviosum et australe, <sup>1</sup> æstate necesse est febres acutas oriri, et ophthalmias, <sup>2</sup> et dysenterias, maximè autem mulieribus, et viris naturâ humidis.

12. Si verò hyems australis, <sup>a</sup> et pluviosa, et tranquilla sit, <sup>1</sup> ver au-

tem siccum et aquilonium, mulieres, quidem, quibus partus in ver *incidit*, ex omni occasione abortiunt: quæ verò pepererint, infirmos et morbosos pariunt pueros, ita ut, vel statim *illi* pereant, vel tenues et morborum vivant. Cæteris verò mortalibus dysentericæ, et ophthalmicæ siccæ oriuntur; senioribus autem catarrhi breviter perimentes.

13. Si verò æstas sicca <sup>a</sup> et aquilonia fiat, autumnus autem pluviosus <sup>b</sup> et australis, capitis dolores ad hyemem fiunt, et tusses, et raucedines, et gravedines: quibusdam verò etiam tabes.

14. Si verò <sup>a</sup> aquilonius et sine pluviiis *autumnus* fuerit, iis quidem qui naturâ sunt humidi, et mulieribus, commodus *erit*: reliquis verò erunt

ἢ ἄρ ἀνδροειδὲς ἔστω βόρειον, ἀλλὰ μὴ γυναικείας, ἢσιν οἱ τόκοι πρὸς τὸ ἦρ, ἐκ πάσης προφάσις ἐκλιτρωσκασιν· ἀλλὰ εἰ ἂν τέκωσιν, ἀκράτεια καὶ νοσώδεια τὰ παρὰ τὰ τέκωσιν, ὥστε ἢ παραυλίκαι ἀποπληκτικαί, ἢ λεπτὰ ἔστω νοσώδεια ζῆν ἐόντια. τοῖσι ἢ ἄλλοισι βροχοῖσι δυσεντερία, ἔστω ὀφθαλμιαί ξηραὶ γίνωνται· τοῖσι ἢ πρεσβυτέροισι κατὰ ἄρροι συντόμως ἀποπληκτικαί.

ιγ'. Ἦν ἢ τὸ θερμὸν ἀνδροειδὲς καὶ βόρειον γέννηται, τὸ ἢ φθινόπωρον ἔστω κρύον καὶ νότιον, κεφαλαλγία ἐς τὴν χειμῶνα γίνωνται, ἔστω βήχες, καὶ βράγχαι, ἔστω κόρυζαι· ἐπίοισι ἢ ἔστω φθίσεις.

ιδ'. Ἦν ἢ βόρειον ἢ ἔστω ἀνδροειδὲς, τοῖσι μὴ ὑγροῖσιν ἔστω τὰς φύσεις, ἔστω τῆσι γυναιξί, ξύμφορον· τοῖσι ἢ λοιποῖσιν ὀφθαλμιαί ἔστω ξηραὶ, καὶ

πυρελοί ὀξέες, & κόρυζα ( χρόνια )  
 ἐνίοισι ἢ & μελαγχολία.

ιέ. Τῶν ἢ καλασασιῶν ἔ' ἐνιαυτῶ, τὸ μὲν ὅλον οἱ αὐχομοὶ τῶν ἐπομβριῶν εἰσιν <sup>α</sup> ὑγιεινότεροι, καὶ ἥσων θανατώδεις.

ις. Νεσήματα ἢ ἐν μὲν τῆσιν <sup>α</sup> ἐπομβρήσιν ὡς τὰ πολλὰ γίνε'), πυρελοί τε μακροὶ, καὶ κοιλίης ῥύσιες, καὶ σηπεδόνες, <sup>1</sup> & ὀπίλητοι, & δπόωληκοι, καὶ κυνάγχαι. ἐν ἢ τοῖσιν <sup>β</sup> αὐχομοῖσι, φθινώδεις, ὀφθαλμία, δρθρίτιδες, τραχηλία, & δυσεντερία.

ιζ'. Αἱ ἢ καθ' ἡμέρῳ καλασασιες, αἱ μὲν βόρειοι, τὰ τε σώματα <sup>α</sup> ξυ- νισῶσι, & εὔτονα, & εὐκίνητα, <sup>β</sup> καὶ εὐχροα, & εὐηκοώτερα ποιέουσι, καὶ τὰς κοιλίας ξηραίνουσι, καὶ τὰ ὄμματα δάκνουσι. & ὡς τ' ἄλλα ἀλγημένα



ophthalmiæ siccae, et febres acutæ, et gravedines (diuturnæ); nonnullis verò etiam melancholiæ.

15. Ex anni verò constitutionibus, in universum quidem siccitates pluviosis <sup>a</sup> sunt salubriores, et minùs lethales.

16. Morbi autem in pluviosis <sup>a</sup> quidem plerumque fiunt, et febres longæ, et alvi fluxiones, et putredines, <sup>1</sup> et epileptici, et apoplectici, et anginæ. In siccitatibus <sup>b</sup> verò tabidi, ophthalmiæ, arthritides, urinæ stillicidia, et dysenteria.

17. Quotidianæ autem constitutiones, aquiloniæ quidem <sup>a</sup> corpora compingunt, et robusta, <sup>b</sup> et facilè mobilia, et benè colorata, et meliùs audientia faciunt, alvos etiam siccant, et oculos mordent; et dolorem circa tho-

racem, si quis præexistat, majorem faciunt. <sup>c</sup> Austrinæ verò corpora dissolvunt, et humectant, et auditus graves, et capitis gravitates faciunt, et vertigines in oculis, <sup>1</sup> et corporibus motum difficilem, et alvos humectant.

18. Secundùm tempora autem, vere quidem, et primâ æstate, pueri, <sup>a</sup> et his ætate proximi, optimè degunt, et maximè sani sunt. <sup>1</sup> Æstate verò, et parte quadam autumnii, senes. Reliquo sed autumnio, et hyeme, qui mediè sunt ætatæ.

19. Morbi autem quilibet fiunt quidem <sup>a</sup> in quibuslibet *anni* temporibus <sup>1</sup> nonnulli verò in quibusdam ipsorum potius et fiunt, et exacerbantur.

20. Vere <sup>a</sup>, quidem insanix, et

ἢν τι προῦπάρχη, μᾶλλον πονέουσιν. αἱ  
 ἢ νότιοι ὁ Διὰλύσει τὰ σώματα καὶ  
 ὑγραίνουσι, ὁ βαρυηχοΐας τε ὁ καρηθε-  
 ρίας ποιέουσι, ὁ ἰλίγγους ἐν τοῖσιν ὁφ-  
 θαλμοῖσι, καὶ ἢ τοῖσι σώμασι δυσκινη-  
 σίην καὶ τὰς κοιλίας ὑγραίνουσι.

ιγ. Κατὰ ἢ τὰς ἄρας, ὁ μὲν ἦρῳ,  
 ὁ ἄκρα ὁ θέρου, οἱ παῖδες, ὁ καὶ  
 οἱ τελέων ἐχόμενοι τῆσιν ἡλικίησιν,  
 ἄριστά τε Διὰγασσι, ὁ ὑγιαίνουσι μά-  
 λιστα. ἢ ὁ θέρου, ὁ ὁ φθινοπώρα  
 μέχρι μὲν τινῶν, οἱ γέροντες. τὸ ἢ λοι-  
 πὸν ὁ φθινοπώρα, καὶ ὁ χειμῶν, οἱ  
 μέσοι τῆσιν ἡλικίησιν.

ιδ. Νεσθήματα ἢ πάντα μὲν ἐν ὁ πά-  
 σησι τῆσιν ἄρησι γίνεῃ, ὁ μᾶλλον δι-  
 ἔνια κατ' ἐνίας αὐτέων ὁ γίνεῃ, καὶ  
 παροξύνεῃ.

κ. Τῶ μὲν γδ ὁ ἦρῳ τὰ μανικὰ,

κὴ τὰ μελαγχολικά, <sup>1</sup> κὴ τὰ ἐπιληπ-  
 τικά, <sup>2</sup> καὶ αἵμαλα ῥύσιες, ἔκυ-  
 νάγχα, ἔκόρυζα, ἔβρέγχοι, καὶ  
 βῆχες, καὶ λέπραι, κὴ λειχήνες, καὶ  
 ἀλφοὶ, ἔ<sup>β</sup> ἔξανθήσιες ἐλκώδεες πλεῖ-  
 σαι, κὴ φύμαλα, <sup>3</sup> ἔ<sup>δ</sup> ἔθροιλικά.

κά. Τῷ ἔ<sup>δ</sup> ἔρε<sup>θ</sup>, ἔνιά τε τριέων,  
 καὶ πυρετοὶ ξυνεχέες, <sup>1</sup> καὶ καῦσοι,  
 κὴ τριταῖοι πλεῖστοι, κὴ τετραταῖοι, καὶ  
 ἔ<sup>α</sup> ἔμελοι, κὴ ἀγέρροια, καὶ ὀφθαλμία,  
 καὶ ὄτων πόνοι, κὴ στομάτων ἐλκώσιες, ἔ  
 σηπεδόνες αἰδοίων, ἔ ἔδρωα.

κδ'. Τῷ ἔ<sup>δ</sup> φθινοπώρα, ἔ<sup>ε</sup> ἔθει-  
 νῶν τὰ πολλὰ, <sup>1</sup> καὶ πυρετοὶ τετραρ-  
 ταῖοι, κὴ ἔ<sup>α</sup> πλάνητες, <sup>2</sup> ἔ<sup>σ</sup> ἔσπαλῆνες, κὴ  
 ἔδρωπες, <sup>3</sup> ἔ<sup>φ</sup> φθίσιες, κὴ σφαγγυρία,  
 ἔ<sup>λ</sup> λειεντερία, ἔ<sup>δ</sup> δυσεντερία, κὴ ἔ<sup>ι</sup> ἔχιιάδες,  
 καὶ κυνάγχα, κὴ ἔ<sup>α</sup> ἔσθμαλα, ἔ<sup>ε</sup> εἰλεοὶ,

S E C T I O III. 83

melancholiæ, et <sup>1</sup> epilepsiæ, <sup>2</sup> et sanguinis fluxiones, et anginæ, et gravedines, et raucedines, et tusses, et lepræ, et impetigines, et vitiligines, et <sup>b</sup> pustulæ ulcerosæ plurimæ, et tubercula, <sup>3</sup> et articulorum dolores.

21. Æstate verò, et horum nonnulla, et febres continuæ, <sup>1</sup> et ardentes, et tertianæ plurimæ, et quartanæ, et <sup>a</sup> vomitus, et alvi fluxus, et ophthalmiæ, et aurium dolores, et oris exulcerationes, et pudendorum putredines, et sudamina.

22. Autumno autem, et ex æstivis multa, <sup>1</sup> et febres quartanæ, <sup>a</sup> et erraticæ, <sup>2</sup> et lienes, et hydropes, <sup>3</sup> et tabes, et urinæ stillicidia, et lienteriæ, et dysenteriæ, et coxæ dolores, et anginæ, et asthmata, et volvuli,

et epilepsiæ , et insaniæ , et melancholiæ.

23. <sup>1</sup> Hyeme <sup>2</sup> verò , pleuritides , peripneumoniæ , lethargi , gravedines , raucedines , tusses , <sup>2</sup> dolores pectorum , et laterum , et lumborum , et capitis dolores , vertigines , <sup>3</sup> apoplexiæ.

24. In ætatibus autem talia eveniunt. Parvis quidem <sup>2</sup> et recens natis pueris aphthæ , vomitus , tusses , vigiliæ , pavores , umbilici inflammationes , aurium humiditates.

25. Ad dentitionem verò <sup>2</sup> accidentibus gingivarum pruritus , febres , <sup>1</sup> convulsiones , alvi profluvia ; et maximè ubi caninos dentes producant , et iis qui inter pueros sunt crassissimi , <sup>2</sup> et qui alvos duras habent.

26. Iis autem qui ætate sunt majore

κὲ ἑπιληψία, ἔ τὰ μανικὰ, κὲ τὰ με-  
λαγχολικά.

κγ'. <sup>1</sup> Τῷ ἔ <sup>α</sup> χειμῶν  $\Theta$ , πλῦρίτι-  
δες, ᾠειπνύμονία, λήθαργοι, κό-  
ρυζα, βράγχαι, βῆχες, <sup>2</sup> πόνοι ση-  
θέων, ἔ πλῦρέων, καὶ ὀσφύ  $\Theta$ , καὶ  
κεφαλαλγία, ἴλιγγοι, <sup>3</sup> ἀποπληξία.

κδ'. Ἐν ἣ τῆσιν ἡλικίῃσι τοιάδε ζυμ-  
βαίνει. τοῖσι μὲν μικροῖσι <sup>α</sup> κὲ νεογνοῖσι  
παυδίοισιν, ἄφθα, ἔμελοι, βῆχες,  
ἀγρυπνία, φόβοι, ὀμφαλῶ φλεγμο-  
ναί, ἄτων ὑγρότητες.

κε'. Πρὸς ἣ τὸ <sup>α</sup> ὀδοντοφυεῖν προσάγ-  
σιν, ἔλων ὀδαξισμοὶ, πυρετοὶ, <sup>1</sup> σπασ-  
μοὶ, ἀφάρροια. ἔ μάλιστα ὅταν ἀνά-  
γωσι τὰς κυνόδοντας, ἔ τοῖσι παχυ-  
τάτοισι τῶν παιδίων, <sup>2</sup> ἔ τοῖσι σκληρὰς  
τὰς κοιλίας ἔχουσι.

κε'. Πρεσβυτέροισι ἣ γλυομήμοισι,  
P

παρίσθια, <sup>α</sup> σπονδύλας & κτ' τὸ ἰνίον  
 εἶσω ὄσιες, ἄσθματα, <sup>1</sup> λιθιάσιες,  
<sup>2</sup> ἔλμινθες ερρογύλα, ἀσκαρίδες,  
 ἀκροχορδόνες, <sup>3</sup> σαλυεασμοὶ, (τραυ-  
 γεία,) χοιράδες, καὶ τὰλλα φύ-  
 μαλα, μάλιστα ἢ τὰ προειρημμένα.

κζ'. Τοῖσι ἢ ἔτι <sup>α</sup> πρεσβυτέρησι,  
 καὶ πρὸς τὴν ἡδὼ προσάγασσι, τρέψαν-  
 τε τὰ πολλὰ, καὶ πυρέλοὶ χρόνιοι μᾶλ-  
 λον, κτ' ἐκ ῥινῶν αἵματι & ῥύσιες.

κη'. Τὰ ἢ πλεῖστα τοῖσι παιδίοισι  
 πάθεα κρίνε'), τὰ μὲν ἐν <sup>α</sup> τεσσα-  
 ράκοντα ἡμέρησι· τὰ ἢ ἐν ἑπτὰ μηνί·  
 τὰ ἢ ἐν ἑπτὰ ἔτεσι· τὰ ἢ πρὸς τὴν  
 ἡδὼ προσάγασιν. <sup>1</sup> ὅσα εἰ' ἂν λα-  
 μείνη τοῖσι παιδίοισι, καὶ μὴ ἀπολυθῆ-  
 ῶσι τὸ <sup>β</sup> ἡδάσκειν, ἢ τῆσι θύλεσι  
 ῶσι τὰς <sup>γ</sup> καλαμηνίων ῥήζιας, χρονί-  
 ζειν εἴαθε.



iores, <sup>a</sup> tonsillæ *inflammatae*, verticuli in occipitio introrsum extrusiones, asthmata, <sup>1</sup> calculorum generationes, <sup>2</sup> lumbrici rotundi, ascarides, verrucæ pensiles, <sup>3</sup> satyriasmī, (stranguriæ,) strumæ, et cætera tubercula, maximè verò suprà dicta.


27. Ætate verò adhuc <sup>a</sup> provectionibus, horum quidem multa, et febres diuturnæ magis, et ex naribus sanguinis fluxiones.

28. Plurimæ quidem affectiones in pueris judicantur, aliæ <sup>a</sup> in quadraginta diebus, aliæ in septem mensibus, aliæ in septem annis: aliæ *ipsis* ad pubertatem accedentibus. <sup>1</sup> Quæ verò in pueris permanserint, neque solutæ fuerint circa <sup>b</sup> pubertatem, aut in fœminis circa menstruorum eruptiones, diu perseverare solent.

29. Juvenibus autem , sanguinis sputiones , <sup>1</sup> a tabes , febres acutæ , <sup>2</sup> epilepsiæ , et cæteri morbi , maximè verò suprà nominati.

30. Ultra hanc ætatem verò <sup>a</sup> *progressis* , asthmata , <sup>1</sup> pleuritides , peripneumonix , lethargi , phrenitides , febres ardentes , <sup>2</sup> alvi profluvia diuturna , cholerae , dysenterix , lenterix , hæmorrhoides.


31. Senibus autem <sup>a</sup> , spirandi difficultates , catarrhi tussiculosi , <sup>1</sup> stranguriæ , dysuriæ , <sup>2</sup> articulorum dolores , nephritides , vertigines , apoplexiæ , mali *corporis* habitus , pruritus totius corporis , vigiliæ , alvi , et oculorum , et narium humiditates , visûs hebetudines , glaucedines , auditûs gravitates.



κθ'. Τοῖσι ἢ νεηνίσκοισιν, αίμαλῶ  
 πτύσεις, <sup>1</sup> <sup>α</sup> φθίσεις, πυρελοὶ ὀξείες,  
<sup>2</sup> ἑπιληψία, ἔ τὰλλα νεσήμαλα, μά-  
 λιστα ἢ τὰ προειρημμένα.

λ. Τοῖσι ἢ ὑπὲρ τὴν ἡλικίην <sup>α</sup> ταύ-  
 ῖνω, ἄσθμαλα, <sup>1</sup> πλυσίτιδες, πει-  
 πνδμονία, λήθαργοι, φρενίτιδες,  
 καῦσοι, <sup>2</sup> ἀρροία χρόνια, χολέρα,  
 δυσεντερία, λειεντερία, αίμορροΐδες.

λά. Τοῖσι ἢ <sup>α</sup> πρεσβύτησι, δύσ-  
 πνοια, κατάρροι βηχώδες, <sup>1</sup> τραγχε-  
 ρία, δυσχερία, <sup>2</sup> ἄρθρων πόνοι, νε-  
 φρίτιδες, ἰλιγγοι, ἀποπληξία, κα-  
 χεξία, ξυσμοὶ τῆ σώμαλῶ ὄλα,  
 ἀγρυπνία, κοιλίης, καὶ ὀφθαλμῶν,  
 καὶ ῥινῶν ὑγρότητες, ἀμολυωπία, γλαυ-  
 κώσεις, βαρυκοΐα.



## N O T Æ

I N

## SECTIONEM TERTIAM.

APHOR. I. <sup>1</sup> Octimestr. iij, 29. —  
 Humor. vj, 5; viij, 15, 16. — Aër.  
 Aq. Loc. j, 19. — Vict. Acut. xvij, 9.  
 — Morb. Sac. xij, 7. = <sup>2</sup> Aph. ij, 51.  
 — II. Diæt. vj, 7. — Humor. vij, 7. =  
<sup>a</sup> Cels. j, 3, p. 33, l. 32. — II. 1, p.  
 42, l. 21. *Vide* Ballonium I. Sydenham,  
 Sect. j, cap. ij. Huxham, de aere &c. t. j;  
 Prolegomen. Ramazzin. et alios passim.

Nec licet hic prætermittere quæ de  
 Tempestatum apud antiquos divisione  
 congressit Riegerus in hunc Aphorismum.

APHOR. II. Vet. Medicin. xxxvij,  
 14. — I. Diæt. xxv, 12. — III. Diæt.  
 j, 6. — Aër. Aq. Loc. xxxiv, 9; lvj,

IN SECTIONEM III. 91

7, 8. — Morb. Sac. xviii, 24. =<sup>a</sup> Cels. j, 9, p. 39, l. 18. — *Vide* van-Swieten, t. v, pag. 140.

APHOR. III. Humor. viij, II, &c. =  
<sup>1</sup> Aph. viij, 6; Aph. ij, 34. =<sup>a</sup> Cels. ij, I, p. 43, l. 12.

Versionem Foesii non accepimus, licet eam jam dudum Galenus indicaverit, assenserintque Galeno Mercurialis, Heurnius, Hollerius. Textui enim ab omnibus accepto consona non est. Potest verò propositio de morborum cum intemperie corporis jam positâ consensu intelligi.

APHOR. IV. Humor. vj, 5, 6; vij, 7. =<sup>a</sup> Cels. j, 3, p. 33, l. 32; et ij, I, p. 42, l. 21.

APHOR. V. Humor. viij, I. — Morb. Sac. xv, 3, 8, 19, ad 22. =<sup>a</sup> Cels. ij, I, p. 44, l. 27. =<sup>b</sup> Cels. ij, I, p. 44, l. 22.

Auster tepore humido plumbeus vasa laxat, et vires exsolvit; perspirat

tionem, imminutâ vasorum actione, tum et auctâ humiditate retinet intûs: hinc qui ab aggesto et putrefacto humore pendunt morbi. Stringit solida Aquilo, humores compingit; hinc qui à stricto inflammatorio deducuntur morbi: hi verò in eam partem decumbunt quam ventus in eam directus constrixerit, ut docuit vir, si quis alius, in Medicinâ inventor Sanct. Sanctorius; nec adeo tamen certa ventorum actio, cùm, Austro flante, gelu dirum anno 1709 observaverint. Nec prætermittendum est observasse, à quâ regione Venti in nos impetum faciant? An à mari tepidiore? An à montibus nivosis? An subito defervescant? An diù perflent? — *Vide Hippocratem de aëre locis et aquis, et Huxham in prolegomenis, t. j, & Hist. de l'Académie des Sciences, an. 1710.*

APHOR. VI. Humor, vij, II. <sup>a</sup> Cels.  
I, p. 45, l. 28.

Hyeme aggeritur, ob minorem perspirationis efficaciam, humor pituitosus. Æstate diffuari debuerat. Si verò frigidior

dior illa, et similis veri fuerit, exundabit humor ille; nisi stimulo febris exci- tus sibi moliatur per sudores exitum.

APHOR. VII. <sup>1</sup> Humor. viij, 6. —  
 II. Epid. j, 10. = <sup>2</sup> Humor. ix, 8. =  
<sup>3</sup> Aph. iij, 19. = Cels. ij, 1, p. 45, l. 5.  
 — *Vide van-Swieten, t. ij, pag. 453.*

APHOR. VIII. Humor. vij, 3, 15. —  
 II. Epid. j, 20, 21. = <sup>a</sup> Cels. ij, 1, p.  
 42, l. 19. = <sup>b</sup> Cels. ij, 1, p. 43, l. 5.  
 — *Vide van-Swieten, t. v, p. 140.*

APHOR. IX. <sup>1</sup> II. Prædict. xij, 4. —  
 II. Epid. j, 15. = <sup>2</sup> II. Epid. j, 23. = <sup>a</sup>  
 Cels. I, 3, p. 33, l. 23; et ij, 1, p. 42, l.  
 19 et 29. = <sup>b</sup> Cels. ij, 1, p. 42, l. 17. —  
*Vide van-Swiet. t. ij, p. 460, 461, 730.*

Effœtum, diluente vehiculo orbum,  
 exustum sanguinem, fessa laxataque vasa  
 aggreditur inæqualis Autumni temperies.  
 Natura debilis, periodus incerta ad per-  
 niciem concurrunt. Vere, sanguis aquo-  
 sior, vasa flexilia, nervi è sopore redi-  
 vivi, natura fortior, periodus constan-

tior, ad salutem, datâ operâ, consentiunt.

APHOR. X. Aph. iij, 22. — II. Prædict. xij, 3. — VI. Epid. vij, 77. =  
<sup>a</sup> Cels. ij, 8, p. 72, l. 3.

Suaderent Ver ipsis infensissimum accuratæ J. Huxham Observaciones de Aëre et Morbis Epidemicis.

APHOR. XI. Aër. Aq. Loc. xxv, 7. =  
<sup>1</sup> II. Epid. j, 10. =<sup>2</sup> Aër. Aq. Loc. xxv, 13. =<sup>a</sup> Cels. ij, 1, p. 45, l. 12.

Præsenti Aphorismo, ut et sequentibus, expenduntur effectus, qui varias tempestatum vices sequuntur, quoties ab instituto naturæ aberrat temporis constitutio, nec τὰ ὁρατὰ ὁρατῶς apparent. Mechanica frigoris, caloris, ariditatis, humiditatis actio experimentalī Hippocratis expositioni responsat exactè. Laxatio fibrarum, perspirationis retentio, motûs imminutio, sequelæ sunt frigoris humidi. Siccitas contrà et densitas humorum, fibrarum tensio, perspiratio enormis, calidam et siccam tem-



pestatem comitantur ; madidis advolans alis Notus æstum simul et humiditatem infert, undè fibris laxitas, humoribus metuenda putredo. Boreas contrà omnia gelu constringit, fibras compingit et humores. Ex hisce primariis secundariis effectus variarum aëris constitutionum, quoties nec debito ordine variant, nec certo tempore sibi succedunt, facile deducuntur ; modò, dùm mechanicæ actioni harum Atmospheræ qualitatum attendimus, sensilitatis etiam ratio habeatur, quæ, cùm fibrarum mobilitatem regat, in subitis temporum mutationibus præstat plurima. Sed hæc omnia nemo pleniùs aut doctiùs exposuit Joanne Huxham, de Aëre et Morbis Epidemicis vol. j, Prolegom. Addemus tamen quod jam et Sydenham, et Freind, et alii notarunt ; observatoribus Medicis, dum constitutiones morbosas prædominantes exponunt, curæ id impendêre, ut non tantùm unius tempestatis vices afferant, sed plures sese mutuò excipientes conferant et expendant.

APHOR. XII. Aër. Aq. Loc, xxvj, 4.

5, 6. =<sup>1</sup> Nat. Human. xiiij, 7. =<sup>2</sup> Cels. ij, 1, p. 45, l. 17. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 567.

APHOR. XIII. Aër. Aq. Loc. xxviii, 4, 5. =<sup>2</sup> Cels. ij, 1, p. 45, l. 31. — *Vide* hic luculentas Cl. de Villebrune annotationes.

APHOR. XIV. Aër. Aq. Loc. xxix, 1, 2. =<sup>2</sup> Cels. ij, 1, p. 46, l. 1.

APHOR. XV. Aër. Aq. Loc. iiij, 3. =<sup>2</sup> Cels. ij, pag. 42, l. 29. — *Vide* Huxham de aëre &c. t. ij, præf. p. vij.

APHOR. XVI. <sup>1</sup> Morb. Sac. xv, 1, 2. =<sup>2</sup> Cels. ij, 1, p. 45, l. 7. =<sup>b</sup> Cels. ij, 1, p. 45, l. 5. — *Vide* van-Swieten, t. iiij, pag. 362.

Duplex morborum ab imbribus origo, solidorum inertia, aquosior humorum compages. Hinc coctionis atque criseos tarditas, humidi perspirabilis redundantia; unde stases, putredines in variis partibus. A siccitate contrà, densum inflammatorium, vasorum strictura, humorum acrimonia.

IN SECTIONEM III. 97

APHOR. XVII. <sup>1</sup> Aph. v, 16. =  
<sup>a</sup> Cels. ij, 1; p. 44, l. 25. = <sup>b</sup> Cels.  
 j, 9, pag. 39, l. 27. = <sup>c</sup> Cels. ij, 1,  
 pag. 44, l. 27. — *Vide* van-Swieten,  
 t. ij, pag. 37.

APHOR. XVIII. <sup>1</sup> Morb. Sac. xij,  
 1. = <sup>a</sup> Cels. ij, 1, pag. 46, l. 9.

APHOR. XIX. Prænot. xxvij, 4. =  
<sup>1</sup> Aph. iij, 17. = <sup>a</sup> Cels. ij, Præf.  
 pag. 42, l. 3.

APHOR. XX. <sup>1</sup> Morb. Sac. xij, 5,  
 6, 7. = <sup>2</sup> Nat. Human. xij, 11. =  
<sup>3</sup> Aph. vj, 55. = <sup>a</sup> Cels. ij, 1, pag.  
 43, l. 20. = <sup>b</sup> Cels. v, 28, §. 15,  
 pag. 336, l. 7. — *Vide* van-Swieten,  
 tom. ij, p. 595, 730.

APHOR. XXI. Affection. xij, 1, ad  
 5. = <sup>1</sup> Vict. Acut. xxxiv, 2. = <sup>a</sup> Cels.  
 ij, 1, pag. 43, l. 33. — *Vide* van-Swie-  
 ten, tom. j, pag. 107; tom. ij, pag. 38,  
 410.

APHOR. XXII. <sup>1</sup> Nat. Human. xxix,  
 R

2. = <sup>2</sup> Int. Affect. xxxij, 2. = <sup>3</sup> Aph. iij, 10. = <sup>a</sup> Cels. ij, pag. 44, l. 5. —  
*Vide* van-Swieten, t. v, p. 607,

APHOR. XXIII. <sup>1</sup> Affect. vij, 3, 4.  
 = <sup>2</sup> Aph. vj, 5. = <sup>3</sup> Glandul. ix, 4,  
 ad 8. = <sup>a</sup> Cels. ij, 1, pag. 44, l. 19.  
*Vide* van-Swieten, t. ij, p. 535, 730;  
 t. iij, p. 2.

APHOR. XXIV. <sup>a</sup> Cels. ij, 1, pag.  
 46, l. 16. — Æginet. j, 10. — *Vide*  
 van-Swieten, t. j, p. 68, t. iij, p. 197,  
 216, t. iv, p. 580, 585.

Ætatum morbi à necessariâ illarum  
 constitutione facilè deducuntur. Mollior  
 est et aquosior infantum temperies, ge-  
 nus nervosum mobilissimum, lymphâ  
 mucosa, ad acidum fermentativum ver-  
 gens, exundat. Progressu ætatis vis-  
 ceribus robur, fibris tonus accedit;  
 evolvuntur glandulæ, functionibus pa-  
 res fiunt: hinc et patiuntur plurimum.  
 Incremento corporis sumpto, validâ jam  
 coctione, vasis adhuc flexilibus, exube-  
 rat cruor, et quaquaversus nititur ad

IN SECTIONEM III. 99

exitum; donec vasa, per vitæ exercitium validiora facta, fortiùs distendenti resistant, et per varia emunctoria superfluum ablegent. At brevi ipsa vitæ actio senium inducit. Rigent vasa, languescit sanguinis circuitus. Hinc et coctio debilior, et inertis pituitæ accumulatio, quæ senibus importuna et immedicabilia mala producit. Sed hæc accuratiùs nemo evolvit J. Russel Anglo: *Æconom. Naturæ*, in *Glandul.* parte II.

APHOR. XXV. <sup>1</sup> Aër. Aq. Loc. iv, 5. — *Morb. Sac.* xj, 1. = <sup>2</sup> *Aph.* ij, 53. = <sup>2</sup> *Cels.* ij, 1, pag. 46, l. 20. — *Æginet.* j, 8. — *Vide van-Swieten*, t. j, pag. 69; t. iij, pag. 418; t. iv, pag. 663.

APHOR. XXVI. <sup>1</sup> *Nat. Human.* xxiv, 5. — *Coac.* iij, 398. — *IV. Morb.* xxviiij, 1, 2. = <sup>2</sup> *IV. Morb.* xxvij, 9. = <sup>3</sup> *VII. Epid.* lj, 16. = <sup>2</sup> *Cels.* ij, 1, pag. 46, l. 26. — *Vide van-Swieten*; t. j, pag. 69; t. ij, pag. 571, 640, 641, t. iv, pag. 613.

Verticuli Extrusiones. An à Rachi-  
R ij

tide? *Vide* Russel, *Œconom. Naturæ*,  
in Gland. pag. 73.

APHOR. XXVII. <sup>a</sup> Cels. ij, p. 46,  
l. 31. — *Vide* van-Swieten, tom. j,  
p. 69; t. iv, p. 13, 14.

APHOR. XXVIII. <sup>1</sup> Aph. ij, 45. —  
II. Prædict. xvj, 1, 3. = <sup>a</sup> Cels. ij,  
1, p. 46, l. 34. = <sup>b</sup> Cels. ij, p. 47,  
l. 4. — Plin. xxviii, c. iv, pag. 689,  
l. 9. — *Vide* van-Swieten, t. j, pag.  
69.

APHOR. XXIX. <sup>1</sup> Aph. v, 9; viij,  
7. — Coac. iij, 260. = <sup>2</sup> Morb. Sac.  
xiiij, 1. = <sup>a</sup> Cel. ij, 1, pag. 47, l. 9.  
— *Vide* van-Swieten, t. j, pag. 69;  
t. ij, pag. 385, 531; t. iv, pag. 14.

APHOR. XXX. <sup>1</sup> Coac. iij, 395. =  
<sup>2</sup> Aër. Aq. Loc. iv, 7. — VII. Epid.  
xl, 19. = <sup>a</sup> Cels. ij, 1, pag. 47, 11.  
— *Vide* van-Swieten, t. j, p. 69, t.  
ij, p. 385, 531.

APHOR. XXXI. <sup>1</sup> Affect. xxix, 10.

IN SECTIONEM III. 101

==<sup>2</sup> Coac. iij, 395. ==<sup>a</sup> Cels. ij, 1, pag. 47, l. 15. — *Vide* van-Swieten, t. j, pag. 69, t. ij, pag. 733, t. iij, pag. 70, 264.



## Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Ν .

α. **Τ**Α'Σ κύσας φαρμακδύειν, <sup>1</sup> ἢν ὀργᾶ, τετραμήνια, καὶ ἄχει ἐπιὰ μηνῶν· ἥσον δὲ ταύτας. <sup>2</sup> τὰ δὲ νήπια, <sup>a</sup> ἐ πρεσβύτερα, ἐυλαδύειασ κρί.

β'. Ἐν τῆσι φαρμακείησι τοιαῦτα ἀγειν ἐν Ἐ σώματι, <sup>1</sup> ὀκοῖα καὶ αὐτόματα ἰόντα χρήσιμα· τὰ δ' ἐναντίως ἰόντα, παύειν.

γ'. Ἦν μὲν, οἷα δεῖ καθάρειασ, καθάρων), ξυμφέρει τε ἐ ἐυφόρας φέρει· τὰ ἰ ἐναντία, δυχερῶς.

δ'. Φαρμακεύειν, <sup>1</sup> φέρεται μὲν, <sup>a</sup> μᾶλλον τὰς ἀνω· <sup>2</sup> χειμῶν) ἰ, τὰς κάτω.



## S E C T I O Q U A R T A.

1. **P**RÆGNANTES purgandæ, <sup>1</sup> si materia turgeat, quadrimestres, et usque ad septimum mensem : hæ verò miñus. <sup>2</sup> Juniores autem, <sup>3</sup> et seniores *fætus*, cautè vitare oportet.

2. In purgationibus talia è corpore sunt ducenda, <sup>1</sup> qualia etiam spontè prodeuntia utilia sunt : contrario autem modo prodeuntia, sistenda.

3. Si quidem, qualia purgari oportet, purgentur, confert, et facilè ferunt : contraria verò, difficulter.

4. Purgandum, <sup>1</sup> æstate quidem, <sup>2</sup> magis superiores *ventres* : <sup>3</sup> hyeme verò, inferiores.

5. Sub cane, et ante canem, <sup>1</sup> difficiles sunt purgationes.

6. Graciles, <sup>a</sup> et facilè vomentes, sursùm purgandi, vitantes hyemem.

7. Difficulter autem vomentes, et mediocriter carnosì, deorsùm, vitantes æstatem.

8. Tabidi verò, vitantes (purgationes) sursùm.

9. Melancholicos autem, uberiùs deorsùm *purgabis*. Eâdem ratione, contraria adhibens.

10. Purgandum in valdè acutis, <sup>1</sup> si turgeat *materia*, <sup>2</sup> eâdem die: morari enim in talibus malum est.

11. Quibus tormina, <sup>a</sup> et circa umbilicum dolores, et lumborum dolor, qui neque purgante, neque aliter solvitur, <sup>1</sup> in hydropem siccum firmatur.

SECTIO IV. 105

ε. Ὑπὸ κύνα, εἰς πρὸ κυνός, ἰ ἐργά-  
δες αἱ φαρμακεῖαι.

ς. Τὰς ἰχνύς, αἰ εἰσημέας, ἄνω  
φαρμακεύειν, ὑποσελλομύς χειμῶνα.

ζ. Τὰς ἰ δυσημέας, καὶ μέσως  
εὐσάρκας, κάτω, ὑποσελλομύς θε-  
ρος.

η. Τὰς ἰ φθινάδεας, ὑποσελλομύς  
τὰς ἄνω (φαρμακεῖας.)

θ. Τὰς ἰ μελαγχολικὰς, ἀδροί-  
ως τὰς κάτω. τῷ αὐτῷ λογισμῷ τὰ-  
ναντία προσθεῖς.

ι. Φαρμακεύειν ἐν τοῖσι λίβυ ὀξέσιν,  
ἢ ὄργα, ἢ ἀθημερόν· χρονίζειν γὰρ  
ἐν τοῖσι τοῖς τοῖσι, κακόν.

ια. Ὀκόσοισι σφόφοι, αἰ εἰς τὸ  
ὀμφαλὸν πόνοι, εἰς ὀσφύθι ἀλγῆμα,  
μὴ λυόμῃον, μήτε ὑπὸ φαρμακεῖας,  
μήτ' ἄλλως, ἢ ἐς ὑδρωπὰ ξηρὸν ἰδρῦς).

106 Η Ι Ρ Ρ. Α Ρ Η Ο Ρ.

15'. Ὀκόσοισι κοιλίᾳ λειεντερεῶ-  
δες, χειμῶν⊕ Φαρμακεύειν ἄνω,  
κακόν.

1γ'. Πρὸς τὴς ἐλλέθορως, τοῖσι μὴ  
ρηιδίως ἄνω καθαρομύοισι, πρὸ τ'  
πόσι⊕ προὔγραίνειν τὰ <sup>α</sup> σώματα,  
πλείονι τροφῇ, ἔ ἀναπαύσει.

1δ'. Ἐπὴν πῆ τις ἐλλέθορον, πρὸς  
μὴ τὰς κινήσιας τῶν σωμάτων μᾶλ-  
λον ἄγειν· πρὸς δὲ τὴς ὑπνωος, καὶ  
μὴ κινήσιας, ἦσον. δηλοῖ δὲ ἔ ἡ  
ναυιλίη, ὅτι <sup>1</sup> κίνησις τὰ σώματα  
ταράσσει.

1ε'. Ἐπὴν βέλη μᾶλλον ἄγειν τ' ἐλλέ-  
θορον, κίνει τὸ σῶμα· ἐπὴν ἔ παῦ-  
σαι, <sup>1</sup> ὑπνον ποίει ἔ μὴ κίνει.

1ς'. Ἐλλέθορ⊕ ἔπικίνδυν⊕ τοῖσι  
τὰς <sup>α</sup> σάρκας ὑγείας ἔχουσι· <sup>1</sup> πωσ-  
μὸν γδ' ἐμποιέει.

12. Quibus alvi sunt lientericæ , eos hyeme sursum purgare<sup>!</sup>, malum.

13. Ad elleboros , qui non facilè sursum purgantur , *iis* ante potionem corpora <sup>a</sup> præhumectanda , copiosiore alimento , et quiete.

14. Ubi biberit quis elleborum , ad motiones quidem corporum magis ducito : ad somnos verò , et quietem , minùs. Declarat autem etiam navigatio , quòd <sup>1</sup> motus turbat corpora.

15. Quando vis magis ducere elleborum , moveto corpus : quando verò cessare , <sup>1</sup> somnum facito , et non moveto.

16. Elleborus periculosus est sanas <sup>a</sup> carnes habentibus : <sup>1</sup> convulsionem enim inducit.

17. Non febricitanti appetitûs dejectus, et oris ventriculi morsus, <sup>1</sup> et tenebricosa vertigo, et os <sup>2</sup> amarescens, sursùm purgante opus esse, indicat.

18. Supra septum transversum dolores, qui purgatione egent, sursùm purgante opus esse indicant; qui verò infra, deorsùm.

19. Qui in purgantium potionibus non sitiunt, dum purgantur, non cessant priusquam sitiverint.

20. Non febricitantibus si fiat tormen, et genuum gravitas, et lumborum dolor, deorsùm purgante opus esse indicat.

21. <sup>1</sup> Dejectiones <sup>2</sup> nigræ, <sup>3</sup> qualis sanguis niger, <sup>3</sup> spontè prodeuntes, et cum febre, et sine febre, pessimæ; <sup>4</sup> et, quanto colores dejectio-

ιζ'. Ἀπυρέτω ἰόντι δ'ποσιλίη , & καρδιωγμός , <sup>1</sup> & σκολόδιον , καὶ φόμα <sup>2</sup> ἐκπικρέμνον , ἄνω φαρμακείης δεῖσθαι σημαίνει.

ιθ'. Τὰ ὑπὲρ τῆς φρενῶν ὀδυνήματα , ἐκόσα καθάρσιον δέον ) , ἄνω φαρμακείης δεῖσθαι , σημαίνει ὀκόσα ἢ κάλιω , κάλιω .

ιβ'. Ὀκόσοι ἐν τῆσι φαρμακοποσίησι μὴ διεψῶσι καθαρόμενοι , & παύον ) , πρὶν ἢ διεψήσωσιν .

ικ'. Ἀπυρέτοισιο ἔχσιν ἢν γένηται ερόφον , & γυνάτων βάρον , καὶ ὀσφύον ἄλγημα , κάτω φαρμακείης δεῖσθαι σημαίνει .

ικβ'. <sup>1</sup> Ὑποχωρήματα <sup>2</sup> μέλανα , <sup>3</sup> ὀκοῖον αἷμα μέλαν , <sup>4</sup> ἀπὸ ἀντομάτης ἰόντα , καὶ ξὺν πυρετῶ , & ἀνδύ πυρετῶ , κάκιζα . <sup>4</sup> καὶ , ὀκόσω ἂν τὰ

χρώματα ὑποχωρημάτων πλείω πονη-  
ρότερα ἤ, μᾶλλον κάκιον· ζὺν Φαρ-  
μάκω ζ, ἀμεινον· ἰ κὴ ὁκόσω ἂν χρώ-  
ματα πλείω, ἔ πονηρά.

κβ'. Νεσημάτων ὁκόσων δρχομδίων,  
ἢν χολή <sup>α</sup> μέλανα, ἢ ἄνω, ἢ κάτω  
ἐπέλθη, θανάσιμον.

κγ'. Ὀκόσοισιν ἐκ νεσημάτων <sup>α</sup>  
ὀξέων, ἢ ἐκ πολυχρονίων, ἢ ἐκ τρα-  
μάτων, ἢ ἄλλως πῶς λεπτυνομδίοις,  
χολή μέλανα, ἢ ὁκοῖον αἷμα μέλαν  
ἐπέλθη, τῆ ὑσεράμῃ δπθνήσκουσι.

κδ'. Δυσεντερία, ἢν ἀπὸ χολῆς με-  
λάνης ἀρξῆ), θανάσιμον.

κέ. Αἷμα ἄνω μὲν, ὁκοῖον ἂν ἤ,  
κακόν· κάτω ζ, ἀγαθόν, μέλαν ὑπο-  
χωρέον.

κε'. Ἦν ὑπὸ δυσεντερίας ἐχομδίων  
οῖον <sup>ι</sup> σάρκες ὑποχωρήσωσι, θανά-  
σιμον.



S E C T I O I V. 111

num plures fuerint peiores, eò deterius : cum purgante verò , melius ;<sup>5</sup> et quantò colores plures , non mali sunt.

22. Morbis quibusvis incipientibus , si bilis atra, vel sursùm , vel deorsùm prodierit , lethale.

23. Quibuscunque ex morbis acutis , aut ex diuturnis , aut ex vulneribus , aut aliter quocunque modo extenuatis , bilis atra, <sup>1</sup> vel qualiscunque sanguis niger prodierit , postridiè moriuntur.

24. Dysenteria , si ab atra bile inceperit , lethale.

25. Sanguis sursùm quidem , qualiscunque sit , malum : deorsùm verò , bonum , niger subtùs secedens.

26. Si à dysenteria detento velut <sup>1</sup> carunculæ secesserint , lethale est.

T ij .

27. Quibus per febres sanguinis copia undecunque eruperit, his in refectionibus alvi humectantur.

28. Quibus<sup>a</sup> biliosæ sunt egestionēs, surditate superveniente, cessant: et, quibus surditas est, biliosis supervenientibus, cessat.

29. Quibus per febres sextâ die rigores fiunt, <sup>a</sup> difficulter judicantur.

30. Quibus exacerbationes fiunt, quâcumque horâ dimiserit febris, postridie eâdem horâ si corripuerit, difficulter judicantur.

31. <sup>1</sup> Lassatis per febres <sup>a</sup> ad articulos, et circa maxillas maximè, abscessus fiunt.

32. Quibus ex morbo resurgenti-

SECTIO IV. 113

κζ'. Οκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρελοῖσιν αἰμορραγίᾳ πλήθει ὀκοθενῶν, ἐν τῆσιν ἀναλήψεσι, τετέοισιν αἰ κοιλίᾳ καθυγραίνον).

κή'. Οκόσοισι <sup>α</sup> χολώδεα τὰ διαχωρήματα, κωφώσι <sup>β</sup> ἐπιγινομῆς, παύει). κη' ὀκόσοισι κώφωσις, χολωδέων ἐπιγινομῶν, παύει).

κθ'. Οκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρελοῖσιν <sup>α</sup> ἐκλαίοισιν ἔσσι ρίγεα γίνεται, δύσκριτα.

λ'. Οκόσοισι παροξυσμοὶ γίνον), ἢν ἂν ἄρρω ἀφῆ ὁ πυρελὸς, ἐς τὴν αὔριον τὴν αὐτὴν ἄρρω ἢν λάβῃ, δύσκριτα.

λά'. <sup>ι</sup> Τοῖσι κοπώδεσιν <sup>α</sup> ἐν τοῖσι πυρελοῖσιν, ἐς ἄρθρα, κη' ὡσαύτῃ τὰς γνάθους μάλισα, αἰ λ'ποσάσιες γίνον).

λβ'. Οκόσοισι <sup>ζ</sup> ἀνισταμῆοισιν ἐκ <sup>η</sup>

νέσων τι πονέει, ἐνταῦθα αἱ ἀποσάσεις γίγνον).

λγ'. Ἀτὰρ, ἢν ἐ προπεπονηκός τι ἤ πρὸς Ἔνοσέειν, ἐνταῦθα σηρίζει ἡ νῆσος.

λδ'. Ἦν ὑπὸ πυρετῶ ἐχορδῶν, οἰδήματι μὴ ἔοντι ἐν τῇ φάρυγγι, πνιξ Ἐξάφνης ἐπιγίγνηται, θανάσιμον.

λέ'. Ἦν ὑπὸ πυρετῶ ἐχορδῶν ὁ τράχηλοι Ἐξάφνης ἐπιτραφῆ, καὶ μόλις καταπίνειν δύνη), οἰδήματι μὴ ἔοντι, θανάσιμον.

λς'. Ἰδρῶτες πυρεταῖνσιν ἢν ἄρξωνται, ἀγαθοὶ τριῖαῖοι, καὶ πεμπτῶοι, καὶ ἑβδομάοι, καὶ ἑνναῖαῖοι, καὶ ἑνδεκατῶοι, καὶ τεσσαρεσκαδεκατῶοι, καὶ ἑπτακαδεκατῶοι, καὶ μίη καὶ εἰκοσῆ, καὶ ἑβδόμη καὶ εἰκοσῆ, καὶ τριακοσῆ πρώτη, καὶ τριακοσῆ τετάρτη. ἔτσι γὰρ οἱ ἰδρῶτες

bus aliquid dolet, ibi abscessus fiunt.

33. Sed et, si quid doluerit ante morbum, ibi se figit morbus,

34. Si à febre detento, tumore in faucibus non existente, suffocatio ex improvise superveniat, lethale.

35. Si à febre detento <sup>a</sup>collum de repente inversum fuerit, et vix deglutire possit, tumore non existente, lethale.

36. Sudores febricitantibus si inceperint, boni sunt die tertiâ, & quintâ, et septimâ, et nonâ, et undecimâ, et quartâ decimâ, et septimâ decimâ, et vigesimâ primâ, et vigesimâ septimâ, et trigesimâ primâ, et trigesimâ quartâ. Hi enim sudores

morbos judicant. <sup>1</sup> Qui verò ita non fiunt, laborem significant, et morbi longitudinem, <sup>2</sup> et recidivas.

37. Sudores frigidi, <sup>a</sup> cum acutâ quidem febre evenientes, mortem; cum mitiore verò, morbi longitudinem significant.

38. Et quâ corporis parte inest sudor, <sup>a</sup> ibi morbum esse indicat.

39. Et quâ corporis parte <sup>a</sup> inest calor, aut frigus, ibi morbus est.

40. Et ubi in toto corpore mutationes, et si corpus perfrigeretur, aut rursus calefiat, <sup>a</sup> aut color alius ex alio fiat, morbi longitudinem significat.

41. <sup>1</sup> Sudor multus à somno, citra causam manifestam factus, corpus uberiore alimento uti significat. <sup>2</sup> Si

νέσας κρίνουν. <sup>1</sup> οί ᾗ μὴ ἔτως γινόμενοι, πόνον σημαίνουσι, καὶ μῆκος νέσας, καὶ <sup>2</sup> ὑποπροπιασμούς.

λζ'. Οί ψυχροὶ <sup>a</sup> ἰδρώτες, ξὺν μὲν ὄξει πυρετῶ γινόμενοι, θάνατον· ξὺν πρηύτερω ᾗ, μῆκος νέσας σημαίνουσι.

λή. Καὶ ὅκως ἐνὶ τῷ σώματι ἰδρῶς, <sup>a</sup> ἐνλαῦθα φράζει τὴν νέσον.

λθ'. Καὶ ὅκως ἐνὶ τῷ <sup>a</sup> σώματι θερμὸν, ἢ ψυχρὸν, ἐνλαῦθα ἢ νέσας.

μά'. Καὶ ὅκως ἐν ὅλῳ τῷ σώματι μεταβολαί, ἢ ἢν τὸ σῶμα <sup>a</sup> καλαψύχη, ἢ αὐθις θερμαίνη, ἢ χρῶμα ἕτερον ἔξ ἑτέρου γίγη, μῆκος νέσας σημαίνει.

μά'. <sup>1</sup> Ἰδρῶς πολὺς ἔξ ὕπνου ἀνδρῶ φανερῆς ἀπίης γινόμενος, τὸ σῶμα σημαίνει, ὅτι πλείονι τροφῇ χρέε. <sup>2</sup> ἢν δὲ τροφήν μὴ λαμβάνουσι τῆτο

γίγνη), σημάίνει ὅτι κενώσι (δύε).

μδ'. Ἰδρῶς πολὺς, ψυχρὸς ἢ θερμὸς, αἰεὶ ῥέων, ὁ μὲν ψυχρὸς μείζω, ὁ δὲ θερμὸς ἐλάσσω νῦσον σημάίνει.

μγ'. Οἱ πυρετοὶ <sup>α</sup> ὀκόσοι μὴ Δι-  
λείπωντες Διὰ τρίτης ἰσχυρότεροι γίνον-  
ται, μᾶλλον ἐπικίνδυνοι· ὅτῳ δ' ἂν  
τρόπῳ <sup>β</sup> Διλείπωσι, σημάίνει ὅτι  
ἐκίνδυνοι.

μδ'. Ὀκόσοισι πυρετοὶ μακροὶ, <sup>α</sup> τε-  
τέοισι φύμαλα ἐς τὰ ἄρθρα, ἢ πόνος  
ἐγίνον).

μέ. Ὀκόσοισι φύμαλα ἐς τὰ ἄρθρα,  
ἢ πόνος ἐκ πυρετῶν γίνον), ἔτοι σι-  
τίοισι πλείοσι χρέον).

μς'. Ἦν ῥίγ (δύε) ἐπιπίπτῃ πυρετῷ  
μὴ <sup>α</sup> Διλείπωντι, ἤδη ἀσθενεῖ ἐόντι,  
θανάσιμον.



verò cibum non capienti hoc fiat, evacuatione indigere significat.

42. Sudor multus, frigidus aut calidus, semper fluens, frigidus quidem majorem, calidus verò minorem morbum significat.

43. Febres <sup>a</sup>, quæcunque non intermittentes tertiâ *die* vehementiores fiunt, magis periculosæ: quocunque autem modo intermittant, <sup>b</sup> quòd sine periculo *sint* significat.

44. Quibus febres longæ <sup>a</sup>, his tubercula ad articulos, aut dolores fiunt.

45. Quibus tubercula ad articulos, aut dolores ex febribus longis fiunt, hi pluribus utuntur cibis.

46. Si rigor incidat febri non intermittenti, <sup>a</sup> debili jam existente ægro, lethale.

47. Exscreationes in febribus non intermittibus lividæ, <sup>1</sup> et cruentæ, et graveolentes, et biliosæ, omnes malæ sunt. At probè secedentes, bonæ. <sup>2</sup> Et *eadem ratio est* quod ad *alvi* egestiones, et quod ad urinas. <sup>3</sup> Si verò nihil ex conducentibus excernatur per hæc loca, malum.

48. In non intermittibus febribus, <sup>1</sup> si externa quidem frigida sint, <sup>2</sup> interna verò urantur, et sitim habeant, lethale.

49. In febre non intermittente, <sup>3</sup> si labium, aut supercilium, aut oculus, aut nasus pervertatur, si non videat, si non audiat, corpore jam debili existente, quicquid horum fiat, in propinquo mors est.

50. Ubi in febre non intermitten-

μζ'. Αἱ ἀποχρέμψεις αἱ ἐν τοῖσι  
 πυρελοῖσι μὴ Διφλείωσιν αἱ πελι-  
 δναί, <sup>1</sup> καὶ αἱματώδεις, ἔδυσώδεις,  
 ἔχολώδεις, πᾶσαι κακαί. ἀποχω-  
 ρῆσαι ἢ καλῶς, ἀγαθαί. <sup>2</sup> ἔκτ' τὰς  
 Διφχωρήσιας, ἔκτ' τὰ ἔσρα. <sup>3</sup> ἢν ἢ  
 μή τι τῶν ξυμφερόντων ἐκκρίνη) Διφ. τῶν  
 τόπων τέτων, κακόν.

μυ'. Ἐν τοῖσι μὴ Διφλείωσιν πυρε-  
 τοῖσιν, <sup>1</sup> ἢν τὰ μὲν ἔξω <sup>α</sup> ψυχρὰ ἢ,  
 τὰ ἢ ἐνδον καμῆ), καὶ δίψῳ ἔχη,  
 θανάσιμον.

μθ'. Ἐν μὴ Διφλείωσιν πυρετῶ,  
 ἢν χεῖλῶ <sup>α</sup> ἢ ὄφρυς, ἢ ὄφθαλμός,  
 ἢ ρίς Διφσραφῆ, ἢν μὴ βλέψη, ἢν  
 μὴ ἀκμή, ἢ ὅη ἀσθενέῳ ἐόντῳ τῷ σώ-  
 ματι, ὅ, τι ἂν τετέων γένη), ἐγγύς  
 ἔθανάτι.

ν'. Ὅκασ ἂν ἐν πυρετῶ μὴ Διφλεί-

πρόλι<sup>α</sup> δύσπνοια γένη), κ<sup>η</sup> πα~~θη~~-  
φροσύνη, θανάσιμον.

νά. Ἐν τοῖσι πυρελοῖσιν λήπσημα<sup>α</sup>,  
<sup>α</sup> μὴ λυόμην πρὸς τὰς πρώτας κρί-  
σιαις, μῆκ<sup>θη</sup> νέσθ<sup>η</sup> σημαίνει.

νβ. Ὁκόσοι ἐν τοῖσι πυρελοῖσιν, ἢ  
ἐν τῆσιν ἀλλήσιν ἀρρώσθησι, κ<sup>η</sup> προαί-  
ρεσιν δακρύουσιν, <sup>α</sup> ἔδ<sup>η</sup> ἐν ἀτοπῶν·<sup>ι</sup>  
ὁκόσοι ἢ μὴ κ<sup>η</sup> προαίρεσιν, ἀτοπώ-  
τερον.

γγ. Ὁκόσοισι ἢ ἐπὶ <sup>η</sup> ὀδόντων<sup>α</sup> ἐν  
τοῖσι πυρελοῖσι πείγλιχρα γίνε<sup>η</sup>), ἰχυ-  
ρότεροι γίνον<sup>η</sup>) οἱ πυρελοί.

νδ. Ὁκόσοισιν ἐπὶ πολὺ βῆχες<sup>α</sup>  
ξηραὶ, βραχέα ἐρεθίζουσα, ἐν πυρε-  
τοῖσι καυσώδεσιν, ἔ<sup>η</sup> πάνυ τοι διψώ-  
δέες εἰσιν.

νε. Οἱ ἐπὶ βεβῶσι πυρελοὶ, πάντες  
κακοὶ, πλὴν τῆ<sup>η</sup> <sup>α</sup> ἐφημέρων.

te<sup>a</sup> difficultas spirandi et delirium fit, lethale.

51. In febribus abscessus,<sup>a</sup> qui non solvuntur ad primas judicationes, morbi longitudinem significant.

52. Quicumque in febribus, aut in cæteris infirmitatibus, ex proposito (i. e. *ob causam*) lacrymantur<sup>a</sup>, nihil inconueniens: <sup>1</sup> qui verò non ex proposito, magis inconueniens.

53. Quibus in febrè ad dentes viscosa<sup>a</sup> circumnascuntur, *his* febres fiunt vehementiores.

54. Quibus diu tusses siccae<sup>a</sup>, paulùm irritantes, in febribus ardentibus, non admodùm siticulosi sunt.

55. In bubonibus febres, omnes malæ, præter<sup>a</sup> ephemeræ.

56. <sup>1</sup> Febricitanti sudor superveniens, febre <sup>a</sup> non remittente, malum. Prolongatur enim morbus, <sup>2</sup> et copiosiore humiditatem indicat.

57. A convulsione aut tetano <sup>a</sup> detento febris superveniens solvit morbum.

58. A febre ardente detento, <sup>a</sup> rigore superveniente, solutio (fit).

59. <sup>1</sup> Tertianae exquisitae in septem ad summum circuitibus judicatur.

60. <sup>1</sup> Quibus in febre aures obsuerint, <sup>a</sup> his sanguis è naribus effluens, aut alvus exturbata, morbum solvit.

61. Febricitanti, nisi in diebus imparibus dimiserit febris, reverti solet.

62. Quibus in febre morbus regius<sup>a</sup>

SECTIO IV. 125

νς'. <sup>1</sup> Πυρέσονται ιδρώς ἐπιγενόμε-  
νῳ, μὴ <sup>α</sup> ἐκλείποντι ἔσ' πυρετῶ,  
κακόν. μηκύνει γὰρ ἡ νῆσῳ, <sup>2</sup> καὶ  
ὕγρασίῳ πλείω σημαίνει.

νζ'. Ὑπὸ σπασμῶ ἢ τετάνθ <sup>α</sup> ἐνο-  
χλημῶ πυρετὸς ἐπιγενόμενῳ λύει  
τὸ νῆσημα.

νη'. Ὑπὸ καύσθ <sup>α</sup> ἐχοιμῶ, ἐπιγενε-  
μῶς ρίγιῳ, λύσις (γίνε').

νθ'. <sup>1</sup> Τελιῶ ἀκροῦς κείνε' ἐν  
ἑσπῆρα φειόδοισι τὸ μακρόταλον.

ξ'. <sup>1</sup> Ὀκόσοισιν ἂν ἐν τοῖσι πυρε-  
τοῖσι τὰ ὦτα <sup>α</sup> κωφωθῆ, ἄιμα ἐκ  
ρίνῶν ρυέν, ἢ κοιλίη ἐκλαραχθεῖσα,  
λύει τὸ νῆσημα.

ξά. Πυρέσονται, ἢν μὴ φειασῆσιν  
ἡμέρησιν <sup>α</sup> ἀφῆ ὁ πυρετὸς, ὑποτρο-  
πιάζειν εἴωθεν.

ξβ'. Ὀκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν

ἴκτεροι <sup>α</sup> ὄπιγίνον) πρὸ τῆς ἑπταήμε-  
ρῶν, κακόν. (ἢν μὴ ξυνδέσεις ἕγρῶν  
κῆ τὴν κοιλίῳ γένων).

ξγ. Ὀκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρελοῖσι  
καθ' ἡμέρῳ ῥίγεα γίνε), καθ' ἡμέ-  
ρῳ οἱ πυρελοὶ λύον).

ξδ. Ὀκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρελοῖσι  
τῆ <sup>α</sup> ἐβδόμη, ἢ τῆ ἐννάτῃ, ἢ τῆ ἐνδε-  
κάτῃ, ἢ τεσσαρεσκαδεκάτῃ ἴκτεροι  
ὄπιγίνον), ἀγαθόν. ἢν μὴ τὸ δεξιὸν  
ὑποχόνδριον (κληρὸν ἢ ἢν ῥ μὴ, σὺκ  
ἀγαθόν.

ξε. Ἐν τοῖσι πυρελοῖσι πρὸ τὴν κοι-  
λίῳ καῦμα ἰχυρὸν, κῆ καρδιασμὸς,  
κακόν.

ξς. Ἐν τοῖσι πυρελοῖσιν ὀξέσιν <sup>α</sup>  
οἱ σπασμοὶ, κῆ οἱ πρὸ τὰ σπλάγχνα  
πόννοι ἰχυροὶ, κακόν.

ξζ. Ἐν τοῖσι πυρελοῖσιν οἱ ἐκ τῆς



supervenit ante septimum diem , malum est. ( Nisi confluxus humorum per alvum fiant ).

63. Quibus in febribus quotidie rigores fiunt , quotidie febres solvuntur.

64. Quibus in febre septimâ , aut nonâ , <sup>a</sup> aut undecimâ , aut quattodecimâ morbus regius supervenit , bonum est : <sup>1</sup> nisi dextrum hypochondrium durum sit ; alioqui , non bonum.

65. In febribus circa ventrem æstus vehemens , et oris ventriculi dolor , malum.

66. In febribus acutis <sup>1</sup> <sup>a</sup> convulsiones , et circa viscera dolores vehementes , malum.

67. In febribus , ex somnis <sup>a</sup> pa-

vores , aut convulsiones , malum.

68. In febribus spiritus offendens , malum : <sup>a</sup> convulsionem enim significat.

69. Quibus urinæ crassæ , grumossæ , paucæ , non sine febre , copia ex his succedens tenuis , juvat. Tales autem *iis* maximè prodeunt , quibus ab initio *morbi* , aut brevi post , subsidentiam continent.

70. Quibus autem in febre urinæ conturbatæ , qualis jumentorum , his capitis dolores , aut adsunt , aut aderunt.

71. Quibus *morbi* septimâ *die* judicantur , iis nubeculam rubram *urina die* quartâ continet , <sup>1</sup> et cætera secundùm rationem.

72. Quibus urinæ pellucidæ , <sup>2</sup> albæ ,

ὑπῶνων <sup>α</sup> φόβοι, ἢ σπασμοὶ, κακόν.

ξή. Ἐν τοῖσι πυρελοῖσι τὸ πνεῦμα προσκόπων, κακόν· <sup>α</sup> σπασμὸν γδ̄ σημάνει.

ξθ. Ὀκόσοισιν ἔρα παχέα, θρομβώδεια, ὀλίγα, ὅτε ἀπυρέτοισι, πλῆθῳ ἐπελθὼν ἐκ τριέων λεπλῶν, ἀφελεί. μάλιστα ἢ τὰ τοιαῦτα ἔρχεῖ), οἷσιν ἐξ ἀρχῆς, ἢ ἀπὸ ταχέων, ὑπόσασιν ἴχει.

ο. Ὀκόσοισι ἢ ἐν πυρελοῖσι τὰ ἔρα ἀναλειαραγμῆα, οἷον ὑποζυγίων, τετέοισι κεφαλαλγίᾳ ἢ πάρεσιν, ἢ παρέσον).

οά. Ὀκόσοισι ἐβδομαῖα κρίνε), τετέοισιν ἐπνέφελον ἴχει τὸ ἔρον τῆ τέλειρτη ἐρυθρὸν, <sup>1</sup> καὶ τὰλλα κτ̄ λόγον.

οβ. Ὀκόσοισιν ἔρα ἀφανέα, <sup>α</sup>

λύκῃ, πονηρά. μάλασα ἢ ἐν τοῖσιν  
φρενιλικοῖσιν ἐπιφαίνε).

ογ'. Ἰ. Ὀκόσοισιν ὑποχόνδρια με-  
τέωρα<sup>α</sup> Διαβορδορίζοντα, ὁσφύθ<sup>α</sup> ἀλ-  
γίμαθ<sup>α</sup> ἐπιγλυμοῦς, ἀφ' κοιλίᾳ τε-  
τέοσι καθυγραίνον). ἢν μὴ φύσῃ κα-  
τάρραγέωσιν, ἢ ἔρῃ πλήθ<sup>α</sup> ἐπέλθῃ.  
ἐν πυρελοῖσι ἢ ταῦτα.

οδ'. Ἰ. Ὀκόσοισιν ἐλπίς ἐς ἄρθρα  
ἀφίσααθ<sup>α</sup>, ῥύε) τ' ἀπεσάσιθ<sup>α</sup> ἔρον  
πολὺ, ἐ<sup>α</sup> παχὺ, ἐ λύκον γιγνώ-  
ρμον, οἷον ἐν τοῖσι κοπώδεσι πυρε-  
τοῖσι τελαρλιάωσιν ἄρχε) ἐνίαισι γί-  
γνεαθ<sup>α</sup>. ἢν ἢ ἐ ἐκ τῆς ῥινῶν ἀμορρά-  
γήσῃ, κῆ πάνυ ταχὺ λύε).

οε'. Ἦν<sup>α</sup> αἷμα, ἢ ἢ<sup>β</sup> πῦον ἔρέη,  
τῆς νεφρῶν, ἢ τ' κύσιθ<sup>α</sup> ἔλκωσιν ση-  
μαίνει.

ος. Ὀκόσοισιν ἐν τῇ ἔρῃ παχεῖ

malæ. Maximè autem in phreniticis observantur.

73. <sup>1</sup> Quibus hypochondria elevata <sup>2</sup> sunt murmurantia, dolore lumborum superveniente, his alvi humectantur: nisi flatus eruperint, aut urinæ copiam prodierit. In febribus autem hæc.

74. <sup>1</sup> Quibus spes est abscessum fore ad articulos, eos abscessu liberat urina multa, et crassa, et <sup>2</sup> alba reddita, qualis in febribus cum lassitudine quartâ die quibusdam fieri incipit. Si verò etiam ex naribus sanguis eruperit, brevi admodum solvit.

75. Si <sup>2</sup> quis sanguinem, <sup>1</sup> aut <sup>b</sup> pus mingat, renum, aut vesicæ exulcerationem significat.

76. Quibus in urinâ crassâ exis-

tente <sup>1</sup> carunculæ <sup>a</sup> parvæ, aut veluti pili unâ exeunt, his de renibus excernuntur.

77. Quibus in urinâ crassâ existente furfuracea simul minguntur, iis vesica scabie laborat.

78. <sup>1</sup> Qui spontè sanguinem mingunt, <sup>a</sup> his à renibus venæ ruptionem significat.

79. <sup>1</sup> Quibus in urinâ arenosa <sup>a</sup> subsident, illis vesica calculo laborat.

80. Si *quis* sanguinem mingat, et grumos, et <sup>a</sup> urinæ stillicidium habeat, et dolor incidat ad imum ventrem, et perinæum, partes circa vesicam laborant.

81. Si *quis* sanguinem et pus mingat, et squamas, et odor gravis sit, <sup>a</sup> vesicæ exulcerationem significat.

έόντι <sup>1</sup> σαρκία <sup>α</sup> μικρά, ἢ ὡσπερ τρί-  
 χες ξυνεξέρχον), τετέοισιν δὲ τῶν νε-  
 φρῶν ἐκκρίνε).

οζ. Ὁκόσοισιν ἐν τῷ ἔργῳ παχεῖ  
 έόντι πιλυράδεα ξυνεξέρε), τετέοισιν  
 ἢ κύσις ψωριᾶ.

οή. <sup>1</sup> Ὁκόσοι δὲ ταυλομάτα ἄιμα  
<sup>α</sup> ἔρεσι, τετέοισιν δὲ τῶν νεφρῶν  
 φλεβίς ρήξιν σημαίνει.

οθ. <sup>1</sup> Ὁκόσοισιν ἐν τῷ ἔργῳ ψαμ-  
 μώδεα <sup>α</sup> ὑφίσα), τετέοισιν ἢ κύσις  
 λιθιᾶ.

πί. Ἦν ἄιμα ἔρη, καὶ θρόμβος,  
 ἐ <sup>α</sup> τραγυρίω ἔχη, ἐ ὀδύνη ἐμ-  
 πίωλη ἐς τὸ ὑπεγάστριον, καὶ ἐς τὸ  
 πείναμον, τὰ πρὸ τὴν κύσιν πονέει.

πά. Ἦν ἄιμα ἐ πῦον ἔρη, ἐ  
 λεπίδας, καὶ ὀσμὴ <sup>α</sup> βαρεῖη ἢ, τὴν κύσιν  
 ἔλκωσιν σημαίνει.

πδ'. Οκόσοισιν ἐν τῇ ἐρήθρῃ Φῦμα  
 α φύε), τετέοισι, Δαπυήσανι & κῆ  
 ἐκραγένι &, λύσις.

πγ'. Ούρησις νύκλωρ ποκλή γίγ-  
 νομδή, Σμικρὴν τὴν ὑποχάρησιν ση-  
 μαίνει.





S E C T I O I V. 135

82. Quibus in urinariâ fistulâ tuberculum <sup>a</sup> nascitur, his, suppurato eo et perrupto, solutio fit.

83. Mictio noctu multa contingens, parvam *alvi* dejectionem significat.



---

 N O T Æ

I N

## SECTIONEM QUARTAM.

---

APHOR. I. Aph. v, 29. =<sup>1</sup> I, 22. =  
<sup>2</sup> I. Morb. Mul. xlij, 8. =<sup>a</sup> Cels. ij,  
 10, p. 78, l. 5. — *Vide* van-Swieten,  
 t. iv, p. 411.

Intelligenda est Hippocratis sententia de validioribus purgantibus, quæ sola ab antiquioribus in usum vocabantur. Manna, Cassiam, Tamarindos, Sennam, quocumque graviditatis tempore, cum fructu recentiores exhibent, servatâ tamen artis methodo.

APHOR. II. <sup>1</sup> Aph. j, 2. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 495, t. iij, p. 486.

APHOR. III. Aph. j, 25.

IN SECTIONEM IV. 137

APHOR. IV. <sup>1</sup> V. Epid. xxv, 16, 17.  
= <sup>2</sup> Salub. Diæt. v, 10. = <sup>a</sup> Cels. j,  
3, p. 29, l. 21,

Notum est minus humoris utilis per vomitum excludi, quàm per catharsim. Porrò æstate deest humor, hyeme redundat. Hinc intelligitur cur sub cane aridis solidis, exustis humoribus, difficilior catharsis, cur et gracilibus minùs felix.

APHOR. V. Aër. Aq. Loc. xxx, 2,  
5, 8. — Purgant. 5, 8. = <sup>1</sup> Aph. ij,  
37.

APHOR. VI. II. Morb. xij, 9. =  
<sup>1</sup> Cels. j, 3, p. 29, l. 23.

Cur cavendus hyems? Quia vasa magis compacta magis resistunt; frigus enim quodam erethismo agit.

APHOR. VII. II. Morb. xij, 35.

Cur cavenda æstas, in mediocriter carnosus? Quòd catharsis exolvat corpo.

ra, quæ jam enervat tempestatis ariditas.

APHOR. VIII. Loc. in Hom, xxxv, 4. — Int. Affect. iv, 26, xij, 36.

APHOR. IX. Aër. Aq. Loc. xj, 2. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 486.

Consilium de Melancholicis intelligendum, qui turgente atrâ bile infestantur; non de iis quibus fibra sensilior sine ullâ fere materiâ laborat. Unde maximâ in hoc applicando Aphorismo utendum est prudentiâ.

APHOR. X. <sup>1</sup> Aph, j, 22, 24. = <sup>2</sup> V. Epid. xxv, 16, 17.

APHOR. XI. Coac. ij, 279. = <sup>r</sup> Coac. iij, 286. = <sup>a</sup> Cels. ij, 7, p. 59, l. 13: — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 153.

Debilitatâ coctione, aër ex alimentis erumpit, et circum claustra intestinorum fremit: quæ si prædebilitata minùs resistant, dilatantur aëre agglomeratq

in tympanitidem. *Vide* Pneumato-Pathologiam, Part. II.

APHOR. XII. In Lienteriâ , ait Galenus , ventriculi partes passæ sunt ; scattet aphtosis ulceribus tractus intestinalis , quæ à vomitu levamen nullum , sed malam irritationem sibi comparare possunt. Fiunt autem præcipuè hyeme à repercussæ perspirationis impetu talia ulcuscula.

APHOR. XIII. Aph. j , 22 ; ij , 9 ; vij , 70. — II. Diæt. xxxvj , 18 ad xxxvij. — Loc. in Hom. xl , 3. — Verat. Us. j , 1. — II. Morb. xiiij , 10 , ad 13. — Int. Affect. xxiiij , 31 ; xxix , 41 ; xlvij , 34. — I. Morb. Mul. xxv , 13 , 14 ; xxxj , 9. — Superfæt. xx , 1. =<sup>a</sup> Cels. ij , 12 , p. 86 , l. 6 ; ij , 13. pag. 87 , l. 23. — *Vide* van-Swieten , t. iij , p. 486.

APHOR. XIV. Verat. Us. j , 2 , 3. — VI. Epid. v , 45. =<sup>1</sup> Aph. ij , 51. =  
*Vide* van-Swieten , t. iij , p. 486.

APHOR. XV. Verat. Us. j , 4. —

Superfæt. xx, 1. — VI. Epid. v, 45.  
 =<sup>1</sup> Aph. v, 27. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 486.

Hinc antiquum est illud Sydenhami præceptum, quo, purgatione peractâ, narcoticum ad somnos excitandos adhibet. Cæterum vide in utrumque hunc Aphorismum notas doctissimi de Villebrune.

APHOR. XVI. Aph. ij, 36, 37. —  
 Verat. Us. j, 5. =<sup>1</sup> Aph. v, 1. =<sup>a</sup>  
 Cels. ij, 13, pag. 87, l. 24. — *Vide*  
 van-Swieten, t. ij, p. 237; t. iij, p.  
 486.

APHOR. XVII. Verat. Us. j, 10.  
 — Affection. xiv, 12. =<sup>1</sup> II. Morb.  
 Mul. xxiv, 2, 3. =<sup>a</sup> Cels. j, 3,  
 pag. 29, l. 31. — *Vide* van-Swieten,  
 t. ij, p. 202.

APHOR. XVIII. Verat. Us. j, 10, 11.

APHOR. XIX. Verat. Us. j, 6.

Hæc propositio ad validiora tantum

IN SECTIONEM IV. 141

catharseos instrumenta pertinet quibus olim utebantur antiquiores, non ad nostram alyi subductionem molliorem et facilè mitigandam solorum diluentium usu.

APHOR. XX. Verat. Us. j, ii.

Hæc signa illicò purgandum non significant, sed non aliter morbum finiri posse indicant.

APHOR. XXI. <sup>1</sup> Prænot. x, 6. — Coac. iij, 36; vj, 22, ad 26, 42. = <sup>2</sup> Aph. iv, 23. — Coac. iij, 1. = <sup>3</sup> Aph. j, 2. = <sup>4</sup> Coac. vj, 24. = <sup>5</sup> Aph. j, 2; ij, 14. = <sup>2</sup> Cels. ij, 8, p. 76, l. 19.

Melancholicum vocabant Veteres, degencrem, quem ex obstructis intrà intestinalem tractum vasis videbant, vel per os, vel per anum effundi sanguinem, pessimo omine. Minus tamen mali ostenditur, si vis medicamenti, non verò fatiscens natura id effecerit. Vigere adhuc diversorum humorum intra intes-

tina secretionem, plurium humorum testatur excretio, de quâ pluries cum laude locutus est Hippocrates locis citatis.

APHOR. XXII. Coac. j, 100. =<sup>a</sup>  
Cels. ij, 6, p. 55, l. 33. — *Vide van-Swieten, t. ij, p. 346; t. iij, p. 496.*

Præclusum omninò sanguini venoso aditum per obstructos venæ portarum fines, hinc exundare sanguinem atrum in intestina repulsum, symptoma illud vulgò indicat; vel venenum intùs enatum, à degeneri simul bile atque tabe factis cæteris humoribus pendens, acre, erodens, acidumque, instar aquæ stygiæ; undè utroque in casu metuenda prognosis quæ in Aphorismo sequenti continetur; minùs tamen in priori casu.

APHOR. XXIII. <sup>1</sup> Aph. iv, 21. =<sup>a</sup>  
Cels. ij, 6, p. 55, l. 34. — *Vide van-Swieten, t. iij, p. 496.*

APHOR. XXIV. Coac. j, 100; iij, 292. — V. Epid. x, 2. =<sup>a</sup> Cel. ij, 8,



p. 74, l. 1. — *Vide* van-Swieten, t. iij, pag. 499.

APHOR. XXV. Aph. vij, 37. —  
Coac. ij, 254; vj, 14.

Scilicet summè distinguendus est sanguis niger ab atrâ bile, secundum Hippocratem et Galenum. Hæc enim à pristinâ qualitate degener veneni qualitatem adeptâ est. Lege hîc observationes Cl. de Villebrune.

APHOR. XXVI. <sup>1</sup> Aph. iv. 76.

APHOR. XXVII. Coac. j, 227, iij, 53.

Quamlibet magnam sanguinis profusionem sequitur relaxatio ingens; hinc viscerum concoctioni servientium debilitas summa quæ, vel diarrhœâ, vel hydrope excipiatur. Huc refer Sanctorii Aphoris. xiv, Sect. iij.

APHOR. XXVIII. Aph. iv, 60. —  
Coac. ij, 66, 103; vj, 77. =<sup>a</sup> Cels.

ij, 8, p. 70, l. 20. — *Vide* Epidemicas Hippocratis historias. *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 358, 554.

APHOR. XXIX. Coic. j, 23. — VII. Epid. xl, 20. =<sup>a</sup> Cel. ij, 4, p. 51, l. 11. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 443.

APHOR. XXX. Humor. iij, 91. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 522.

APHOR. XXXI. <sup>1</sup> Humor. iij, 98. — IV. Epid. xviiij, 16, 17. — Aph. ij, 5; iv, 74. =<sup>a</sup> Cels. ij, 7, pag. 65, l. 8. — *Vide* van Swieten, t. ij, pag. 409.

APHOR. XXXII. Humor. iij, 100. — *Vide* van - Swieten, t. ij, p. 53, 690, 723.

APHOR. XXXIII. Loc. in Hom. xxxvj, 6. — Humor. iij, 101. — IV. Epid. xxviiij, 1, 2, 3. — VI. Epid. vij, 15 ad 19. — Vict. Acut. xlv, 2, 3. — *Vide* van - Swieten, t. ij, p. 723.

IN SECTIONEM IV. 145

APHOR. XXXIV. Aph. iv, 35. — Prænot. xxiiij, 3, 4. — Coac. j, 90; ij, iij, 201, 202, 221; 96. — *Vide van-Swieten*, t. ij, p. 646.

APHOR. XXV. Aph. iv, 34; vij, 58. — Coac. ij, 221 ad 223. =<sup>a</sup> Cels. j, 6, p. 55, l. 17. — *Vide van-Swieten*, t. ij, p. 646.

APHOR. XXXVI. Aph. ij, 24. — Judicat. j, 2; iv, 13. — Prænot. v, 1, 2, 3. — Coac. iv, 36. — I. Epid. iij, 38. — Ægin. xiv, 7. =<sup>1</sup> Prænot. xxiv, 8. — Coac. j, 115. =<sup>2</sup> Aph. ij, 12; iv, 61. — *Vide van-Swieten*, t. ij, p. 80, 330, 426.

APHOR. XXXVII. Judicat. vj, 9, 10, viij, 12, 8. — Prænot. v, 4, 5. — Coac. iv, 40. =<sup>a</sup> Cels. ij, 4, p. 51, l. 30; 5, pag. 53, l. 17; 6, pag. 56, l. 11. — *Vide van-Swieten*, t. ij, pag. 80.

APHOR. XXXVIII. Aph. ij, 5. =<sup>a</sup> Cels. ij, 2, p. 48, l. 19.

APHOR. XXXIX. Judicat. viij . 3.  
 = Cels. ij, p. 48, l. 15. — *Vide van-*  
*Swieten, t. ij, p. 288.*

APHOR. XL. Aph. vij, 60. — Humor.  
 iij, 22, 53. — Judication. viij, 4. — I.  
 Prædic. vj, 4. — Coac. j, 77, 177. =  
<sup>a</sup> Cels. ij, 5, p. 53, l. 20.

Inconstantia symptomatum naturæ  
 deesse firmum robur, quo ad legitimam  
 coctionem crismque tendat, signum est.  
*Vide Sanctorium, Sect. j, Aph. 121.*

APHOR. XLI. Aph. vij, 61. — <sup>1</sup>  
 Coac. iv, 36. = <sup>2</sup> Aph. ij, 8. — *Vide*  
*Sanctorium, Sect. iv, Aph. 3.*

APHOR. XLII. Aph. vij, 61. —  
 Judicat. viij, 9. — Coac. j, 21. — I.  
 Morb. xxij, 26, ad xxij. — *Vide Sanc-*  
*torium, Sect. iv, Aph. 59.*

APHOR. XLIII. Aph. vij, 62. —  
 Coac. j, 166. — I. Epid. iij, 16. —  
 VII. Epid. xl, 19. — Vict. Acut. iij,

3. =<sup>a</sup> Cels. ij, 4, pag. 51, l. 33. =  
<sup>b</sup> Cels. ij, 3, pag. 49, l. 34; iij, 12, p.  
 141, l. 6. — *Vide* van-Swieten, t. ij,  
 p. 402.

Contraria de febris intermitten-  
 tibus docent Forestus, Morton, Torti.

APHOR. XLIV. Aph. vij, 63. —  
 Humor. iij, 98. — Prænot. xxiv, 9,  
 10, 11. — II. Prædict. 10, 7. — Coac.  
 j, 168, 169. =<sup>a</sup> Cels. ij, 7, pag. 64,  
 l. 2. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 671;  
 t. ij, p. 67.

Febres ideò longæ sunt, quòd victrix  
 natura uno ictu hostilem materiam pro-  
 terere non possit. Hinc abscessus fre-  
 quentiùs apud veteres emicabant, quòd  
 mitiorum alvi laxantium usum nesci-  
 rent.

APHOR. XLV. Aph. vij, 64. —  
*Vide* van-Swieten, j, p. 671.

APHOR. XLVI. Coac. j, 15. =<sup>i</sup>  
 Cels. ij, 6, p. 55, l. 21. — *Vide* Sanc-  
 torium, Sect. j, Aph. 121.

Bb ij

APHOR. XLVII. Aph. vij, 69. —  
 Coac. ij, 161. =<sup>1</sup> Coac. iij, 148. =  
<sup>2</sup> Prænot. xv, 10. =<sup>3</sup> Aph. j, 25. —  
*Vide* van-Swieten, t. j, p. 703; t. ij,  
 p. 725.

APHOR. XLVIII. Aph. vij, 72. —  
 Prænot. viij, 11; xiv, 12, 13; xv, 6,  
 ad 10. — Coac. j, 165; iij, 345. — I.  
 Morb. xxvij, 15. — Affection. xj, 5.  
 =<sup>1</sup> Aph. vij, 1, 26. — II. Morb. xvj.  
 2; xxxvij, 1, ad 5. =<sup>a</sup> Cels. ij, 4, p.  
 51, l. 25. ij, 6, p. 55, l. 21; 14, p. 90,  
 l. 22.

APHOR. XLIX. Aph. vij, 73. —  
 Prænot. iij, 3. — Coac. j, 104. =  
<sup>a</sup> Cels. ij, 6, p. 54, l. 24. — *Vide* van-  
 Swieten, t. ij, p. 396.

APHOR. L. Judication. viij, 17. —  
 Prænot. iv, 20; xiv, 9; xv, 3. — *Vide*  
 van-Swieten, tom. ij, pag. 69, 390,  
 442.

APHOR. LI. <sup>a</sup> Cels. ij, 5, pag. 53  
 l. 22. — *Vide* hîc notas Cl. de Ville-  
 brune huic intelligendæ propositioni ne-

IN SECTIONEM IV. 149

cessarias ; ubi *μωλυόμενα* *recedentia*, sufficitur in locum *μη λυόμενα*, qui non *solvuntur*.

APHOR. LII. Aph. viij, 2. — Prænot. ij, 18, ad 21. — IV. Epid. xxvij, 12. — VI. Epid. j, 42. =<sup>1</sup> I. Epid. ij, 176. — VI. Epid. viij, 34. =<sup>a</sup> Cels. ij, 4, p, 51, l. 15. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 397.

APHOR. LIII. Coac. ij, 153. — IV. Epid. xxvij, 13. =<sup>a</sup> Cels. ij, 4. p. 51, l. 15. — *Vide* van-Swieten, tom ij, p. 140.

APHOR. LIV. VI. Epid. ij, 43. =<sup>a</sup> Cels. iij, 7, p. 135, l. 31. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 407.

APHOR. LV. II. Epid. iij, 60. =<sup>a</sup> Cels. ij, 3, pag. 49, l. 34. — *Vide* van-Swieten, t. j, pag. 669.

Lege hîc observationes D. de Villebrune, et Riegerum in hunc Aphorismum.

APHOR. LVI. Judication. viij, 6. — Coac. iv, 36. — II. Morb. xxxvj,

12. =<sup>1</sup> I. Prædict. vij, 8. =<sup>2</sup> Aph. vij, 61. =<sup>2</sup> Cels. ij, 5, p. 53, l. 19.

APHOR. LVII Aph. ij, 26; v, 70. — Loc. in Hom. xlvij, 6. — Judication. xij, 10. — Coac. j, 231; iij, 80, ad 84. — San. Tuend. ad Dem. 10. — I. Morb. vj, 13, 14. =<sup>2</sup> Cels. ij, 1, pag 45, l. 1, 2, 3; ij, 8, p. 70, l. 6. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 328.

APHOR. LVIII. Judication. xj, 9, 16. — Coac. j, 188. =<sup>2</sup> Cels. ij, 8, pag. 70, l. 16. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 442.

APHOR. LIX. Judication. iv, 10. — Coac. j, 212. — I. Epid. iij, 26. — I. Epid. iij, 82. =<sup>1</sup> Prænot. xxv, 11.

Propositio de vernalibus solis intelligenda, non de iis quæ autumno erumpunt et rarò admodùm simplices sunt.

APHOR. LX. Aph. iv, 28. — Judicat. xj, 11, 12, 13 — Coac. ij, 66, 99, 100, 103; vj, 77, 78. =<sup>1</sup> Coac.



IN SECTIONEM IV. 151

ij, 72. — <sup>a</sup> Cels. ij, 8, pag. 70, l. 18.

APHOR. LXI. Humor. iij, 91. — Judicat. ix, 11. — Prænot. xxiv, 8. — Coac. j, 115, 210. — I. Epid. iij, 40. II. Epid. v, 30; vj, 18. — IV. Morb. xix, 10, 11; xx, 8, 12, 15. = <sup>a</sup> Cels. iij, 4, pag. 121, l. 13. — *Vide van-Swieten, t. ij, p. 427.*

Doctè herclè et criticè de hoc Aphorismo Cl. de Villebrune, qui hîc exscribendus foret.

APHOR. LXII. Judicat. iij, 5, 18, 20. — Coac. j, 172. — III. Epid. j, Ægrot. ij, 13, 16. I. Morb. vj, 2. — Vict. Acut. liv, 3, 4. = <sup>a</sup> Cels. ij, 4, pag. 52, l. 7; iij, 24, pag. 175, l. 9. — *Vide van-Swieten, tom. iij, pag. 138.*

APHOR. LXIII. Judicat. xj, 16.

Paroxysmi solvuntur in febre, etiam non intermittente. Nam rigor jam retusam priùs supponit febris violentam vim.

APHOR. LXIV. Judicat. iij, 5, 18, 20; iv, 11. — Coac. j, 173. — I. Epid. ij, 120. — I. Morb. vj, 2. =  
<sup>1</sup> Aph. vj, 42. = <sup>a</sup> Cels. iij, 42, pag. 175, l. 7. — *Vide* van-Swieten, t. iij, pag. 139.

APHOR. LXV. *Vide* van-Swieten, tom. ij, pag. 289.

APHOR. LXVI. Coac. ij, 207. =  
<sup>1</sup> Vid. Aph. ij, 26. = <sup>a</sup> Cels. ij, 4, p. 52, l. 11. *Vide* van-Swieten, t. ij, pag. 442.

APHOR. LXVII. Aph. ij, 1. = <sup>a</sup> Cels. ij, 4, pag. 52, l. 12. — *Vide* van-Swieten, t. ij, pag. 398.

APHOR. LXVIII. Vict. Acut. xxj, 21. — I. Morb. Mul. v, 7. = <sup>a</sup> Cels. ij, 7, p. 64, l. 4.

Offendens dicitur spiritus, in quo inspiratio quasi intercepta pluribus redintegratur vicibus. Res, vel à debilitate organorum per morbum acquisitâ, vel

IN SECTIONEM IV. 153

à natis intra vasa pulmonalia repagulis, vel à nervorum convulsione pendet. *Vide* Galenum de differentiis respirationis, cap. VIII. Prosp. Alpinum, de præsagiendâ vitâ et morte, lib. IV.

APHOR. LXIX. Coac. v, 80, 81.

APHOR. LXX. Coac. v. 46. — VII. Epid. liv. 5, 6, 10, 11. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 394.

APHOR. LXXI. Judicat. vj, 2; ix, 8. — Coac. j, 213; v, 5, 82. =<sup>1</sup> Aph. j, 12. — *Vide* Solano, Part. I, Sect. 2, cap. 3, Observ. 3. van-Swieten, t. ij, p. 431.

APHOR. LXXII. I. Prædic. xx, 5; j, 6. =<sup>a</sup> Cels. ij, 4, pag. 52, l. 25. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 324.

APHOR. LXXIII. Coac. ij, 240, 241, 257. — Prænot. x, 14. =<sup>1</sup> Aphor. v, 64. — Sal. Diæt. v, 10. =<sup>a</sup> Cels. ij, 3, p. 50, l. 20. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 495.

APHOR. LXXIV. Humor. xj, 13, ad 16. — Judicat. x, 4, ad 7. — VI. Epid. iv, 3, ad 6. =<sup>1</sup> Prænot. xj, 17. — II. Prædic. x, 7. =<sup>a</sup> Cels. ij, 7, p. 60, l. 21. — *Vide* van-Swieten, t. ij, pag. 53, 76, 83, 672.

APHOR. LXXV. Aph. iv, 78, 81. — Int. Affect. xvj, 4, 5. =<sup>1</sup> Nat. Human. xxvj, 4. — Prænot. xix, 11. =<sup>a</sup> Cels. ij, 7, pag. 60, l. 28. =<sup>b</sup> Genit. ij, 8. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 238.

APHOR. LXXVI. Nat. Human. xxvj, 5. =<sup>1</sup> Aph. iv, 26. — Cap. Vuln. ij, 4. =<sup>a</sup> Cels. ij, p. 60, l. 30. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 239.

APHOR. LXXVII. Nat. Human. xxvj, 6. — Prænot. xj, 8, 10.

Si suppurent renes, complicata per ureteres abripiuntur vascula; si vesica ulcere laboret, internæ membranæ fossia dejiciuntur. *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 239.

APHOR. LXXVIII. Aph. iv, 75. — Nat. Human. xxvj, 4. =<sup>1</sup> Int. Affec.

IN SECTIONEM IV. 155

xvj, 4. =<sup>a</sup> Cels. ij, 7, p. 60, l. 27, 33;  
p. 61, l. 7.

APHOR. LXXIX. IV. Morb. xxix, 13,  
ad xxx. — Int. Affect. xv, 10, 11. =<sup>r</sup>  
Nat. Human. xxvj, 1. =<sup>a</sup> Cels. ij, 7,  
p. 61, l. 16.

Id est calculus iis metuendus est; nam  
sæpè et arenæ sine calculo in vesicâ min-  
guntur, et calculus in vesicâ perstat, sine  
ullâ arenarum emissionem.

APHOR. LXXX. Aph. vij, 39. —  
<sup>a</sup> Cels. ij, 7, p. 61, l. 15, et seq.

APHOR. LXXXI. Aph. iv, 75. =  
<sup>a</sup> Cels. ij, 7, p. 60, l. 31.

APHOR. LXXXII. Aph. vij, 57. —  
Coac. iij, 311, 312. =<sup>a</sup> Cel. ij, 8, p.  
70, l. 22. — *Vide* van-Swieten, t. j, p.  
771; t. v, p. 428.

APHOR. LXXXIII. II. Diæt. xl, 10,  
ad 17. — IV. Morb. vij, 4, &c. — *Vide*  
van-Swieten, t. ij, p. 33. — *Vide* et  
Sanctorium, Sect. I. de Ponderatione,  
Aph. 89, 94, &c. V. Gorterum, de  
perspiratione, talia phænomena passim  
explanantem.

## ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟΝ.

α'. ΣΠΑΣΜΟΣ ἔξ<sup>α</sup> ἐλλεδόρα,  
θανάσιμον.

β'. Ἐπι τρώματι<sup>α</sup> σπασμὸς ἐπι-  
γλυόμεν<sup>ο</sup>, θανάσιμον.

γ'. Αἵματι<sup>ο</sup> πολλῶ<sup>ν</sup> ρυένι<sup>ο</sup>,<sup>α</sup>  
σπασμὸς, ἢ λυγμὸς ἐπιγλυόμεν<sup>ο</sup>,  
κακόν.

δ'. Ἐπὶ ὑπερκαθάρσει<sup>α</sup> σπασμὸς,  
ἢ λυγμὸς ἐπιγλυόμεν<sup>ο</sup>, κακόν.

ε'. Ἦν μεθύων ἔξάφνης ἄφωος τις  
γένηται, <sup>α</sup> σπασθεὶς ἀπεθνήσκει, ἢ  
μὴ πυρετὸς ἐπιλάβῃ, ἢ εἰς τὴν ὥρην  
ἐλθὼν, καθ' ἣν αἰ κραιπνάται λύου<sup>ν</sup>,  
φθέγγει<sup>ν</sup>.

ς'. Ὀκόσοι ὑπὸ <sup>α</sup> τετάνε ἀλί-

S E C T I O Q U I N T A.

1. **C**ONVULSIO ab <sup>a</sup> elleboro, lethale.

2. Vulneri convulsio <sup>a</sup> superveniens, lethale.

3. Sanguine multo effuso, <sup>a</sup> convulsio, aut singultus superveniens, malum.

4. Purgationi immodicæ <sup>a</sup> convulsio, aut singultus superveniens, malum.

5. <sup>1</sup> Si quis ebrius ex improvise mutus fiat, <sup>a</sup> convulsus moritur, nisi febris corripuerit, aut ubi ad horam, quâ crapulæ solvuntur, pervenit, locutus fuerit.

6. Qui à tetano <sup>a</sup> corripuntur, in

quatuor diebus pereunt. Si verò hos effugerint, sani fiunt.

7. <sup>1</sup> Quibus epilepsiæ <sup>2</sup> ante pubertatem contingunt, mutationem habent. <sup>2</sup> Quibus verò accidunt viginti quinque annos *natis*, his plerumque commoriuntur.

8. Qui pleuritici facti, non repurgantur supernè in quatuordecim diebus, his in suppurationem convertitur.

9. Tabes maximè fit ætatibus ab anno octavo decimo <sup>a</sup> usque ad quintum trigesimum.

10. Quibus anginam effugientibus <sup>a</sup> ad pulmonem vertitur, in septem diebus moriuntur. Si verò hos effugerint, suppurati fiunt.



σκονῆ), ἐν τεσσαρσιν ἡμέρησιν ἀπόλλυνῆ). ἢν ᾗ ταύτας ἀφύγασιν, ὑγίειες γίνονῆ).

ζ'. Ἱ Τὰ ὀπληθικὰ<sup>α</sup> ὀκόσοισι πρὸς τῆ ἕβης γίνεῆ), μετὰσασιν ἴχει. Ἱ ὀκόσοισι ᾗ πέντε καὶ εἴκοσιν ἐτέων γίνεῆ), τετέοισι τὰ πολλὰ ξυναποθνήσκῆ).

η'. Ὀκόσοι πλούθεικοὶ γλυόμενοι εἰς ἀνακαθάρονην ἐν τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρησιν, τετέοισιν εἰς ἐμπύημα μεθίσαῆ).

θ'. Φθείσις γίνεῆ) μάλισα ἡλικίησιν τῆσιν ἀπὸ ὀκτωκαίδεκα<sup>α</sup> ἐτέων μέχρι πέντε καὶ τετήκοντα.

ι'. Ὀκόσοισι κυνάχην ἀφύγασιν<sup>α</sup> εἰς τῆ πλούμονα τρέπεῆ), ἐν ἑπτὰ ἡμέρησιν ἀποθνήσκασιν. ἢν ᾗ ταύτας ἀφύγασιν, ἔμπυοι γίνονῆ).

ια. Τοῖσιν ὑπὸ  $\text{Ϟ}$  φθισίων ἐνοχλη-  
 μῶμοισιν, ἢ τὸ πτύσμα, ὅπερ ἂν δῖο-  
 θέσῳσι, βαρὺ <sup>α</sup> ὄζη ἐπὶ τὰς ἀνθρακας  
 ἐπιχέομενον, εἰ αἱ τρίχες δῖο  $\text{Ϟ}$  κε-  
 φαλῆς ῥέωσι, θανατῶδες.

ιβ. Ὁκόσοισιν ἂν φθισιῶσιν αἱ τρί-  
 χες <sup>α</sup> δῖο  $\text{Ϟ}$  κεφαλῆς ῥέωσιν, ἕτοι,  
 Διάρροιας <sup>β</sup> ἐπιγλομῆς, δῖοθνήσκουσιν.

ιγ. Ὁκόσοι αἶμα ἀφρώδες ἀναπ-  
 τύσσει, τκίλοισιν ἐκ  $\text{Ϟ}$  πλούμον  $\text{Ϟ}$  <sup>α</sup> ἢ  
 τοιαύτη ἀναγωγὴ γίγνη).

ιδ. Ὑπὸ φθισι  $\text{Ϟ}$  ἐχομῆ  $\text{Ϟ}$  Διάρ-  
 ροια <sup>α</sup> ἐπιγλομῆ, θανατῶδες.

ιε. Ὁκόσοι ἐκ πλούριτιδ  $\text{Ϟ}$  ἐμψυοι  
 γίγνον), ἢν ἀνακαθαρθῶσιν ἐν <sup>α</sup> τεσ-  
 σαράκοντα ἡμέρησιν, ἀφ' ἧς ἂν ἡ ῥῆξις  
 γένη), παυον). ἢν  $\text{Ϟ}$  μὴ, εἰς φθίσιν  
 μεθίσαν).

ις. Τὸ θερμὸν βλάπτει ταῦτα τοῖσι

11. A tabe vexatis, si sputum quod extussiunt, prunis superfusum, graviter oleat, <sup>a</sup> et capilli de capite defluant, lethale.

12. Quibus tabe laborantibus capilli <sup>a</sup> de capite defluunt, hi, alvi fluxu <sup>b</sup> superveniente, moriuntur.

13. Qui sanguinem spumosum expuunt, <sup>a</sup> his ex pulmone talis rejectio fit.

14. A tabe detento alvi profluvium <sup>a</sup> superveniens, lethale.

15. Qui ex pleuritide suppurati fiunt, si intra quadraginta dies, <sup>a</sup> ex quo ruptio fuerit facta, repurgentur supernè, liberantur: si verò minus, ad tabem transeunt.

16. Calidum eo frequenter uten-

tibus has affert noxas : <sup>1</sup> <sup>a</sup> carnis effœ-  
 minationem, nervorum impotentiam,  
 mentis torporem, <sup>b</sup> sanguinis erup-  
 tiones, <sup>2</sup> animi deliquia : hæc qui-  
 bus mors.

17. Frigidum <sup>a</sup> autem, convulsio-  
 nes, tetanos, nigrores, et rigores fe-  
 briles.

18. Frigidum <sup>a</sup> inimicum ossibus,  
 dentibus, nervis, cerebro, spinali  
 medullæ : calidum verò utile.

19. Quæ perfrigerata sunt, excale-  
 facere oportet, <sup>1</sup> præterquàm quæ  
 sanguinem profundunt, aut sunt pro-  
 fusura.

20. Ulceribus frigidum quidem mor-  
 dax, <sup>a</sup> cutem obdurat, dolorem non  
 suppurantem facit, nigrores, rigores  
 febriles, convulsiones, et tetanos.

SECTIO V. 163

πλεονάκεις χρεομύοισι· <sup>1</sup> <sup>a</sup> *Carκῶν*  
 ἐκθήλυνσιν, νόρων ἀκράτειαν, γνώ-  
 μης νάρκωσιν, <sup>b</sup> *αἱμορραγίας*, <sup>2</sup> *λει-*  
*ποθυμίας*. ταῦτα οἷσι θάνατι ☉.

ιζ'. Τὸ <sup>γ</sup> <sup>a</sup> ψυχρὸν, σπασμῶς, τε-  
 τάνως, μελασμῶς, καὶ ρίγعا πυρελώ-  
 δεα.

ιη'. Τὸ ψυχρὸν <sup>a</sup> πολέμιον ὀστέοισιν,  
 ὀδῶσι, νόροις, ἐγκεφάλῳ, νωτιαίῳ  
 μυελῷ· τὸ <sup>γ</sup> θερμὸν ἀφέλιμον.

ιθ'. Ὀκόσα κατέψυκται, ἐκθερ-  
 μαίνειν δεῖ, <sup>1</sup> πλὴν Ὀκόσα αἱμορραγείας,  
 ἢ μέλλει.

κ'. Ἐλκεσι τὸ μὲν ψυχρὸν δακνῶ-  
 δες, <sup>a</sup> δέρμα πρῆσκληρύνει, ὀδύνην  
 ἀνεκπύηλον ποιεῖ, μελασμῶς, ρίγعا  
 πυρελώδεα, σπασμῶς, ἐτερίανως.

κά. Ἐσι ᾗ, ὅκx ἔπι τετάνx ἰ άνδx  
 ἔλκεx, νέω δυσάρκx, θέρεx μέσx,  
 ἡ ψυχρᾗ πολλᾗ καλάχυσιx ἐπανάκλη-  
 σιν θέρμηx ποιέειx. θέρμη ᾗ ταῦτα  
 ρύεῃ).

κβ'. ἰ Τὸ θερμὸν ἐκπυητικὸν, ὅκx  
 ἔπι παντὶ ἔλκει, μέγιστον σημεῖον ἐς  
 ἀσφαλείην. ἡ δέρμα μαλάσσει, ἰχ-  
 νάνει, ἀνάδυνον, ριγέων, ἡ σπασμῶν,  
 τετάνων παρηγορικόν. τὴν δὲ ἐν τῇ  
 κεφαλῇ καρηθαρίην λύει. πλεῖστον δὲ  
 ἀφάφει ὀστέων κατάγμασι. ἡ μά-  
 λισα ᾗ τοῖσιν ἐψιλωμῆμοισι. τετάνων  
 δὲ μάλισα, τοῖσιν ἐν κεφαλῇ ἔλκεα  
 ἔχουσι. ἡ ὀκόσα ὑπὸ ψύξιx θνήσκει,  
 ἡ ἔλκεῃ), καὶ ἔρωτησιν ἐσθιομῆμοισιν  
 ἔδρη, ἡ ἀδοίω, ὑσερη, κύσει. τετάνοισι  
 τὸ μὲν θερμὸν φίλον καὶ κρείνον, τὸ ᾗ  
 ψυχρὸν πολέμιον ἔ κλείνον.

21. Est verò, ubi in tetano <sup>1</sup> sine ulcere, juveni benè carnosò, æstate mediâ, <sup>2</sup> frigidæ multæ affusio caloris revocationem facit; calor autem hæc solvit.

22. <sup>1</sup> Calidum suppuratorium, non in omni ulcere, maximum signum ad securitatem: <sup>2</sup> cutem emollit, attenuat, dolores sedat, rigores, <sup>3</sup> convulsiones, tetanos mitigat: capitis verò gravitatem solvit: plurimum autem confert ossium fracturis: <sup>4</sup> maximè verò denudatis: ex his quidem maximè, qui in capite ulcera habent: et quæ à frigore moriuntur, aut ulcerantur: et herpetibus exedentibus sedi, <sup>5</sup> pudendo, utero, vesicæ. His calidum quidem amicum et decretorium, frigidum verò inimicum et occidens.

23. <sup>1</sup> In his autem frigido uti oportet unde sanguis erumpit, aut erupturus est: non super ipsa, sed circa hæc, unde influit. Et quæcumque inflammationes, <sup>2</sup> aut flammei ardores ad rubrum et sanguineum colorem vergentes novo sanguine, super ipsos: nam inveteratos nigrefacit: erysipelas etiam non exulceratum (juvat): quoniam exulceratum lædit.

24. Frigida, velut nix, glacies, <sup>1</sup> pectori <sup>2</sup> inimica, <sup>2</sup> tusses movent, sanguinis eruptiones ac catarrhos inducunt.

25. Tumores autem in <sup>2</sup> articulis et dolores absque ulcere, et podagricos, <sup>1</sup> et convulsiones; horum plurima frigida multa affusa, et levat, et attenuat, et dolorem solvit. Torpor



κγ'. <sup>1</sup> Ἐν τεττέοισι ἃ δέῃ τὰ ψυχρὰ χρέεαζ, ὁκόθεν ἀιμορραγέει, ἢ μέλλει, μὴ ἐπ' αὐτὰ, ἀλλὰ πρὶ αὐτὰ, ὁκόθεν ἔπιρρεί. καὶ ὁκόσα φλεγμοναί, ἢ ἔπιφλογίσματα ἐς τὸ ἐρυθρὸν <sup>a</sup> ἐ ὑφαιμον ῥέπουλα νεαρά ἀμαλι, ἐπὶ ταῦτα· ἐπεὶ τάγε παλαμὰ μελαίνει· καὶ ἐρυσίπελας, τὸ μὴ ἐλκέρμημον (ἀφελῆ·) ἐπεὶ τόγε ἐλκέρμημον βλάπτει.

κδ'. Τὰ ψυχρὰ, οἷον χιῶν, χρύσταλλοι, <sup>1</sup> τὰ σήθει <sup>a</sup> πολέμια, <sup>2</sup> βηχέων κινήτικα, ἀιμορροϊκά, καρρροϊκά.

κε'. Τὰ ἃ ἐν <sup>a</sup> ἄρθροισιν οἰδήματα ἐ αλγήματα ἄτερ ἐλκεοι, ἐ πωδαγρικὰ, <sup>1</sup> καὶ σπασματα, τριέων τὰ πλείεσα τὸ ψυχρὸν πολλὸν καταχερόμημον ῥηίζει τε, καὶ ἰχναίνει, καὶ ὀδύ-

νην λύει. νάρκη γδ μερίη ὀδύνης λυ-  
τική.

κς'. Ὑδωρ τὸ ταχέως θερμανό-  
μενον, <sup>α</sup> κὴ ταχέως ψυχόμενον, κε-  
φόταλον.

κζ'. Ὀκόσοισι ἢ πιεῖν ὀρέξεις <sup>α</sup> νύ-  
κτωρ, τοῖσι πάνυ διψῶσιν, ἢ ἐπικοι-  
μηθῶσιν, ἀγαθόν.

κη'. Γυνακείων ἀγωγὸν ἢ ἐν δρώ-  
μασι πυρίη. πολλαχῶς ἢ καὶ ἐς ἄλλα  
χρησίμη ἂν ἦν, εἰ μὴ καρηθαρίας ἐνε-  
ποιεῖ.

κθ'. Τὰς κύστας φαρμακθεῖν, ἢν  
ὀργᾶ, τετραμέλωα, καὶ ἄχρη ἐπὶ τὰ  
μυῶν ἥσον ἢ τὰς. τὰ ἢ νήπια,  
ἔπρεσδύτερα, <sup>α</sup> εὐλαθέεαδ' κρή.

λ'. Γυνακὶ ἐν γαστρὶ ἐχέση, ἐπὶ  
τινὶ ὄξέων <sup>α</sup> νεσηρέατων ληφθῆναι,  
θανάσιμον.

enim modicus doloris solvendi vim habet.

26. Aqua , quæ citò calefiat , <sup>a</sup> et citò refrigeretur , levissima.

27. Quibus autem bibendi appetentiæ noctu , iis valdè sitientibus , si obdormierint , bonum.

28. Suffitus aromatum muliebria ducit : sæpius autem et ad alia utilis esset , nisi capitis gravitates induceret.

29. Prægnantes purgandæ , si turgeat *materia* , quadrimestres , et usque ad septimum mensem : hæ verò minùs. Juniores autem , et seniores *fætus* , <sup>a</sup> cautè vitare oportet.

30. Mulierem in utero gerentem ab acuto <sup>a</sup> aliquo morbo corripì , lethale.

31. Mulier in utero gerens sectâ venâ<sup>a</sup> abortit : et magis , si major fuerit fœtus.

32. Mulieri sanguinem<sup>a</sup> evomenti, menstruis erumpentibus , solutio fit.

33. Mulieri , menstruis deficientibus , è<sup>a</sup> naribus sanguinem fluere , bonum.

34. Mulieri in utero gerenti, si alvus<sup>a</sup> multùm fluxerit , periculum ne abortiat.

35. Mulieri ab uterinâ *passione* vexatæ , aut difficulter parienti, <sup>a</sup>sternutatio superveniens , bonum.

36. Mulieri menses decolores, neque secundum eadem (*tempus et modum*) semper prodeuntes , purgatione opus esse significant.

37. Mulieri in utero gerenti si

λά. Γυνή ἐν γαστρὶ ἔχουσα φλεβο-  
τομηθεῖσα<sup>α</sup> ἐκλιθάσκει· κὴ μᾶλλον, εἰ  
μεῖζον εἴη τὸ ἔμβρυον.

λβ. Γυνακὶ αἷμα<sup>α</sup> ἐμεΐση, τῆρ κα-  
ταμυλίων ραγέντων, λύσις γίνετῃ.

λγ. Γυνακὶ, τῆ καταμυλίων ἐκλει-  
πόντων, αἷμα<sup>α</sup> ἐκ τῆ ρινῶν ρυῖνα, ἀ-  
γαθόν.

λδ. Γυνακὶ ἐν γαστρὶ ἐχέση, ἣν ἡ  
κοιλίη<sup>α</sup> πολλὰ ρυῖ, κίνδυνος ἐκ-  
τρῶσαι.

λε. Γυνακὶ ὑπὸ ὑπερικῶν ἐνοχλα-  
σμή, ἢ δυσοκέση, πταρμός<sup>α</sup> ἐπι-  
γλυόμενος, ἀγαθόν.

λς. Γυνακὶ τὰ καταμύνια ἄχροα,  
κὴ μὴ κτῆ τὰ αὐτὰ αἰεὶ γινόμενα,  
καθάρσει<sup>ε</sup> δείαξ σημαίνε.

λζ. Γυνακὶ ἐν γαστρὶ ἐχέση ἣν

οἱ μαδοὶ <sup>α</sup> Ἰξάφνης ἰχνοὶ γένων), ἐκπιτρώσκει.

λή. Γυνακὶ ἐν γαστρὶ ἔχέση, ἢν ὁ ἕτερο<sup>ϑ</sup> μαδοὺς ἰχνὸς γένῃ), δίδυμα ἔχέση, θάτερον ἐκπιτρώσκει· κῆ ἢν μὲν ὁ δεξιὸς ἰχνὸς γένῃ), τὸ ἄρσεν· ἢν δὲ ὁ ἀριστερὸς, τὸ θῆλυ.

λθ'. Ἦν γυνὴ μὴ κύεσα, μηδ' ἐτετοκυῖα, γάλα <sup>α</sup> ἔχη, ταύτη τὰ καταμίνια ἐκλέλοιπε.

μέ. Γυνακξὶν ὀκόσησιν ἐς τὴν τῆθ' αἷμα <sup>α</sup> συσρέφε), μανίλω σημαίνει.

μά. Γυναῖκα ἢν θέλῃς εἰδένασ εἰ κύει, ἐπὴν παθεύδειν μέλι, (ἀδείωνω ἔσση) μελίκρατον δίδονασι πιεῖν. κῆν μὲν σρόφον ἔχη πρὸς τὴν γαστέρα, κύει· ἢν δὲ μὴ, ἔ κύει.

mammæ<sup>a</sup> ex improvise graciles fiant, abortit.

38. Mulieri in utero gerenti, si altera mamma gracilis fiat, gemellos gestanti, alterutrum abortit; et, si quidem dextra gracilis fiat, marem: si verò sinistra, foeminam.

39. Si mulier quæ nec prægnans est, nec peperit, <sup>a</sup> lac habeat, ei menstrua defecerunt.

40. Mulieribus quibus in mammas sanguis <sup>a</sup> convertitur, insaniam significat.

41. Mulierem si velis cognoscere, an prægnans sit, ubi dormitura est, (incœnatæ) aquam mulsam bibendam dato. Et si quidem tormen habeat circa ventrem, prægnans est: si verò minùs, prægnans non est.

42. Mulier prægnans, si quidem marem gestat, benè colorata est: si verò fœminam, malè colorata.

43. Si mulieri prægnanti erysipelas in utero fiat, lethale.

44. Quæ præter naturam tenues existentes in utero gerunt, abortiunt, priusquam crassescant.

45. <sup>1</sup> Quæ verò mediocriter corpus habentes abortiunt bimestres et trimestres, sine causâ manifestâ, his uteri acetabula mucò plena sunt, et non possunt continere fœtum, præ gravitate, sed abrumpuntur.

46. <sup>1</sup> Quæ præter naturam crassæ existentes non concipiunt in utero, his omentum os uteri comprimit, et, priusquam attenuentur, prægnantes non fiunt.



μδ'. Γυνή ἔγκυθη, εἰ μὲν ἄρρεν  
 κύει, εὐχρως ἐσίν· ἢν δὲ θήλυ, δύσ-  
 χρως.

μγ'. Ἦν γυναικὶ κύση ἐρυσίπελαις  
 ἐν τῇ ὑσέρῃ γένῃ), θανατῶδες.

μδ'. Ὀκόςαι ὡσαύτῃ φύσιν λεπταὶ  
 ἐῤῥσαι ἐν γαστρὶ ἔχουσιν, ἐκτίρῶσκασι,  
 πρὶν ἢ παχυνθῆναι.

μέ'. Ὀκόςαι δὲ μείριως τὸ σῶμα  
 ἔχουσαι ἐκτίρῶσκασι δέμηνα ἔ τρί-  
 μηναι, ἄτερ προφάσιθη φανερῆς, ταύ-  
 τησιν αἱ κοτυληδόνες μύξης μεσά εἰσι,  
 καὶ ἐ δύνανται κρατεῖν ὑπὸ τῆ βάρους τὸ  
 ἔμβρυον, ἀλλ' ἀπέρρηγγυν).

μς'. Ὀκόςαι ὡσαύτῃ φύσιν παχεῖαι  
 ἐῤῥσαι μὴ ξυλλαμβάνουσιν ἐν τῇ γαστρὶ,  
 ταύτησι τὸ ἔπιπλουν τὸ σῶμα τῆ  
 ὑσερῶν ἀπαιεῖται, καὶ, πρὶν ἢ λεπ-  
 τυνθῆναι, ἐ κύουσιν.

μζ'. Ἦν ὑσέρη ἐν τῷ ἰχίῳ ἐγκειμένη Διαπυήση, ἀνάγκη ἔμμοτον γένεασθ.

μη'. Ἐμδρυα, τὰ μὲν ἄρσενα ἐν τοῖσι δεξιόισι, τὰ δὲ θήλεα ἐν τοῖσιν ἄριστεροῖσι μᾶλλον.

μβ'. Εἰς ὑσέρων ἐκπτώσιαις πιαρμικὸν ὄπιθιθεις, ὄπιλαμδάνειν τὲς μυκτῆρας καὶ τὸ σῶμα.

ν'. Γυνακὶ τὰ καλαμήνια ἢν βέλη ὄπιχέιν, σικύλω ὡς μεγίστω πρὸς τὲς<sup>α</sup> τιτθὲς πρόσβαλλε.

νά'. Ὀκόσαι ἐν γαστρὶ ἔχουσι, τρέλειαν τὸ σῶμα τῷ ὑσερῶν ζυμμέμυκεν.

νε'. Ἦν γυνακὶ ἐν γαστρὶ ἐχέουσι γάλα<sup>α</sup> πολὺ ἐκ τῷ μαζῶν ρυῆ, ἀσθενὲς τὸ ἔμδρυον σημαίνει. ἢν δὲ σερεοὶ οἱ μασοὶ ἔωσιν, ὑγιεινότερον τὸ ἔμδρυον σημαίνει.

47. <sup>1</sup> Si uterus coxi incumbens suppuratus fuerit, necesse est medicamenta in linteo carpto applicari.

48. Fœtus, mares quidem in dextris, fœminæ verò in sinistris magis.

49. Ut secundæ excidant, sternutatorio indito, nares et os apprehendere oportet. )

50. Mulieri menstrua si velis cohibere, cucurbitam quam maximam <sup>a</sup> ad mammas appone.

51. Quæ in utero gerunt, harum os uteri clausum est.

52. Mulieri in utero gerenti si multum lactis <sup>a</sup> ex mammis fluxerit, infirmum fœtum significat. Si verò solidæ fuerint mammæ, saniozem fœtum significat.

53. Quæ perdituræ sunt foetus, his mammæ graciles fiunt. Si verò rursùs duræ fiant, dolor erit aut in mammis, aut in coxis, aut in oculis, aut in genibus, et non perdunt.

54. <sup>1</sup> Quibus os uteri durum est, his necesse est os uteri <sup>2</sup> clausum esse.

55. <sup>1</sup> Quæcumque in utero gerentes à febris corripuntur, et vehementer attenuantur, absque manifestâ occasione, difficulter et periculosè pariunt, aut abortientes periclitantur.

56. Si fluxui muliebri convulsio et animi deliquium superveniat, malum.

57. <sup>1</sup> Mensibus copiosioribus prodeuntibus, morbi contingunt: <sup>2</sup> non prodeuntibus <sup>a</sup>, ab utero fiunt morbi.

νγ'. Ὀκόσασι Διφθεύρειν μέλλουσι τὰ ἔμβρυα, ταύτησιν οἱ τιθθοὶ ἰχνοὶ γίγνον). ἢν ῥ' πάλιν σκληροὶ γένον), ὀδύνη ἔσασι, ἢ ἐν τοῖσι τιθθοῖσιν, ἢ ἐν τοῖσιν ἰχίοισιν, ἢ ἐν τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν, ἢ ἐν τοῖσι γέναςι, ἔξ Διφθεύρασιν.

νδ'. <sup>1</sup> Ὀκόσασι τὸ σῶμα τῶν ὑπερῶν σκληρόν ὄβσι, ταύτησιν ἀνάγκη τὸ σῶμα τῶν ὑπερῶν <sup>2</sup> ξυμμύειν.

νε'. <sup>1</sup> Ὀκόσασι ἐν γαστρὶ ἔχουσι ὑπὸ πυρετῶν λαμβάνον), κὶ ἰχυρῶς ἰχναίγον), ἀνδύ προφάσιθ φανερῆς, τίκτουσι χαλεπῶς κὶ ἔπι κινδύνως, ἢ ἐκλιτρώσκουσι κινδυνεύουσι.

νε'. Ἐπὶ ῥῶν γυναικείῳ σπασμῶς κὶ λειποθυμίῃ ἢν ἐπιγένη), κακόν.

νζ'. <sup>1</sup> Καλαμυλίων γινομῶν πλειόνων, νῆσοι ξυμβαίνουσι. <sup>2</sup> κὶ μὴ <sup>a</sup> γινομῶν, ἀπὸ τῶν ὑπέρης γίγνον) νῆσοι.

νή. <sup>1</sup> Ἐπὶ δόχῳ φλεγμάνοντι, & ἐπὶ ὑσέρῃ φλεγμάνόσῃ, καὶ ἐπὶ νεφροῖσιν ἐμπύοισι, τραγῳξή ἐπιγίνε). <sup>2</sup> ἐπὶ ᾧ ἥπατι φλεγμάνοντι, λυγξ ἐπιγίνε).

νθ'. Γυνὴ ἢν μὴ λαμβάνῃ ἐν γαστρὶ, βέλη ᾧ εἰδένασιν εἰ λήψε), περικαλύψας ἰμαλίοισι θυμῖα κάτω· κῆν μὲν πορεύεσθαι σοι δοκῆ ἢ ὁδμὴ ἀπὸ τῶν σώματ<sup>ω</sup> ἐς τὰς ρῖνας καὶ ἐς τὸ σῶμα, γίνωσκε, ὅτι αὐτὴ, & δι' ἑαυτὴν, ἀγνοσ ἔστιν.

ξ'. Ἦν γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσῃ αἰκαθάρσιες πορεύων), ἀδύνατον τὸ ἔμβρυον ὑγιαίνειν.

ξά'. Ἦν γυναικὶ καθάρσιες μὴ πορεύων), μήτε φρίκης μήτε πυρετῶ ἐπιγλομῶσ, ἄσαι ᾧ αὐτῇ προσώπτωσι, λογίξῃ τάστω ἐν γαστρὶ ἔχειν.

58. <sup>1</sup> Recto intestino inflammato ,  
 et utero inflammato , et renibus sup-  
 puratis , urinæ stillicidium superve-  
 nit : <sup>2</sup> hepatis autem inflammato , sin-  
 gultus supervenit.

59. Mulier , si in ventre non conci-  
 piat , velis autem scire an conceptura  
 sit , vestibis circumtectam subter suf-  
 fito ; et si quidem procedere tibi vi-  
 deatur odor per corpus ad nares et ad  
 os , scito hanc , non propter se ipsam ,  
 infœcundam esse.

60. Si mulieri in utero gerenti pur-  
 gationes prodeant , fœtum sanum esse  
 impossibile.

61. Si mulieri purgationes non pro-  
 deant , neque horrore , neque febre  
 superveniente , cibi autem fastidia ipsi  
 accidant ; hanc in utero gerere putato.

62. Quæ frigidos ac densos uteros habent, non concipiunt; <sup>1</sup> et quæ præhumidos habent uteros, non concipiunt; extinguitur enim ipsis genitura: et quæ siccos magis et adurentes; alimenti enim inopiâ semen corrumpitur. Quæ verò ex utrisque temperamentum habent moderatum, <sup>1</sup> hæ ipsæ proliferæ fiunt.

63. Similiter autem etiam in masculis. <sup>1</sup> Aut enim propter corporis raritatem spiritus extrâ fertur, adeò ut semen non emittat: <sup>2</sup> aut propter densitatem humidum non pervadit foras; aut propter frigiditatem non incalescit, ut ad hunc locum congregetur: aut propter caliditatem hoc idem contingit.

64. <sup>1 3</sup> Lac dare capite dolentibus,



ξβ'. Οκόσα ψυχράς καὶ πυκνάς τὰς μήτρας ἔχουσιν, ἔ κνίσκωσι. καὶ οκόσα καθύγρως ἔχουσι τὰς μήτρας, ἔ κνίσκωσιν. ἀπὸ σθένου γὰρ αὐταῖς ὁ γόνος. καὶ οκόσα ξηρὰς μᾶλλον καὶ ὠρεκαεῖς. ἐνδείη γὰρ τῆς τροφῆς φείρεται τὸ σπέρμα. οκόσα ἂν ἐξ ἀμφοτέρων τὴν κρᾶσιν ἔχουσι σύμμετρον<sup>2</sup>, αἱ τοιαῦται ἐπίτεκνοι γίνονται.

ξγ'. Παραπλησίως ἂν ἐπὶ τῶν ἀρρένων. ἢ γὰρ δι' ἀραιότητα τῆς σάματις τὸ πνεῦμα ἔξω φέρεται, πρὸς τὸ μὴ ὠρεκαεῖν τὸ σπέρμα. ἢ ἀπὸ τὴν πυκνότητα τὸ ὑγρὸν ἔ ἀσχωρεῖ ἔξω. ἢ ἀπὸ τὴν ψυχρότητα ὅτι ἐκπυρεῖται, ὥστε ἀθροίξεσθαι πρὸς τὸ τόπον τῆτον. ἢ ἀπὸ τὴν θερμοσίν τὸ αὐτὸ τῆτο γίνεται.

ξδ'. Γάλα<sup>a</sup> δίδοναι κεφαλαλγεῖσι,

H h ij

κακόν. κακόν ἢ κὶ πυρελοίησι, <sup>2</sup> κὶ  
οἷσιν ὑποχόνδρια μετέωρα Διαξορδο-  
ρίζοντα, κὶ τοῖσι διψάδεσι. κακόν ἢ  
εἰ οἷσι χολάδες ἢ πνευματώδεις, κὶ  
ἐν τοῖσι ἰξέσι πυρελοῖσιν ἰξέσι· καὶ  
οἷσιν αἰμαλῶ πολλὰ Διαχώρησις γέ-  
γονεν. <sup>3</sup> <sup>b</sup> ἀρμίζει ἢ τοῖσι φθινάδεσι  
<sup>4</sup> μὴ λίην πολλὰ πυρέσσει διδόναι  
(γάλα,) κὶ ἐν πυρελοῖσι μακροῖσι κὶ  
βληχροῖσι, μηδενὸς τῆρ προσειρημῶν  
σημείων παρεόντων· ὡσαύτ' λόγον ἢ ἐκ-  
τέληκόν.

ξέ. Ὀκείσοισι οἰδήματα ἐφ' ἑλκεί  
<sup>a</sup> φαίνονται, ἢ μάλα σπῶνται, ἢ δὲ  
μαίνονται. τετέων ἢ ἀφανισθέντων ὀξεί-  
φνης, τοῖσι μὲν ἑπιθεῖν, σπασμοὶ,  
τέτανοι· τοῖσι ἢ ἑμπροθεν, μανία,  
ἢ ὀδύνη πλῆρ' ὀξεία, ἢ ἑμπῶνσις,  
ἢ δυσεντερία, ἢ ἐρυθρὰ ἢ τὰ οἰδηματὰ.

malum. Malum verò etiam febricitantibus, <sup>2</sup> et quibus hypochondria elevata *sunt* murmurantia, et siticulosis. Malum autem et quibus dejectiones biliosæ, et iis qui in acutis sunt febribus: et quibus copiosi sanguinis facta est egestio. <sup>3</sup> <sup>b</sup> Convenit verò tabi <sup>4</sup> non admodum valdè febricitantibus (lac) dare, et in febribus longis et languidis, nullo ex supradictis signis præsentè; & præter rationem quidem extenuatis.

65. Quibus tumores in ulceribus <sup>a</sup> apparent, ii non valdè convelluntur, neque insaniunt. His autem derepentè disparentibus, quibus in postea quidem parte *fuerint*, convulsiones fiunt et tetani: quibus verò in anticâ, insanix, aut lateris dolores acuti, aut suppuratio, aut dysenteria, si rubicundi fuerint tumores.

66. Si, magnis et pravis existentibus vulneribus, tumores non <sup>b</sup> appareant, ingens malum.

67. Laxi tumores, boni: crudi verò, mali.

68. Posticâ capitis parte dolenti, recta in fronte vena secta juvat.

69. Rigores incipiunt, mulieribus quidem, ex lumbis magis, et per dorsum ad caput; viris autem posticâ magis parte, quàm anticâ corporis, velut ex cubitis ac femoribus. <sup>1</sup> Sed et cutis *viris rara est*. Hoc quidem pilus indicat.

70. A quartanis correpti, <sup>1</sup> à convulsione non admodùm corripuntur; <sup>2</sup> si verò priùs corripuntur, et postea quartana supervenerit, liberantur.

71. Quibus cutis obtenditur arida

ξς'. Ἦν, τραυμάτων ἰχυρῶν ἐόντων κὲ πονηρῶν, οἰδήματα<sup>α</sup> μὴ φαίνη), μέγα κακόν.

ξζ'. Τὰ χαῦνα, χρηστά· τὰ ἃ ἔνωμα, κακά.

ξη'. Τῶ τὰ ὀπισθεν τ' κεφαλῆς ὀδοναμύα, ἢ ἐν μετώπῳ ὀρθίῃ φλέψ τμηθεῖσα ὠφελέει.

ξθ'. Ῥίγεια ἄρχη), γυμναζέει μὲν, ἐξ ἐσφύου μᾶλλον, κὲ ἀπὸ νώτου ἐς κεφαλὴν· ἀνδράσι ἃ μᾶλλον ὀπισθεν, ἢ ἔμροσθεν τ' σώματι, οἷον ἀπὸ τε πηχέων κὲ μηρῶν. <sup>1</sup> ἀτὰρ ἐ τὸ δέρμα ἀρμόν. δηλοῖ ἃ τῆτο ἢ θρίξ.

ο. Οἱ ἐπὶ τειαρλίμων ἀλισκόμηροι, <sup>1</sup> ἐπὶ σπασμῶ ἐ πάνυ τι ἀλίσκον). <sup>2</sup> ἢν ἃ ἀλίσκον) πρότερον, εἶτα ὀπιγένη) τειαρλίμῳ, παύον).

οά. Ὀκόσοισι δέρματα ὀπιλείνεια

188 Η Ι Ρ Ρ . Α Ρ Η Ο Ρ .

καρφαλέα & σκληρά, ἄνδρ ἰδρώτων  
τελυτῶσιν· ὀκώσοισι ᾗ χαλαρὰ καὶ  
δύσμε, Ἐν ἰδρῶτι τελυτῶσιν.

οἶ. Οἱ ἰκτερώδεις & πάνυ τι πνύ-  
μαλώδεις εἰσιν.



ac dura, ii sine sudore moriuntur; quibus verò laxa ac rara, ii cum sudore moriuntur.

72. Ictericici non admodum flatulenti sunt.



---

 N O T Æ

I N

SECTIONEM QUINTAM.
 

---

APHOR. I. Aph. vij, 25. — Coac. iv, = 24. <sup>a</sup> Cels. ij, 6, pag. 55, l. 25. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 420, 486.

Convulsio ab hellebori usu inducta, lethalis, quòd et ab illo enormis producat<sup>r</sup> vacuatio, et lædantur immani irri-  
tatione nervi; hinc duplici titulo metuendum medicamen. Eadem causa idem producit in vulneribus: sed ab effuso sanguine periculosior adhuc est convulsio, quòd morte tantum proximam apparet.

APHOR. II. Coac. iij, 81, 382. — Cap. Vulner. xxxv, 5, xvj, 3, 4. =



<sup>a</sup> Cels. v, 26, §. 26, p. 296, l. 8. —  
*Vide* van-Swieten, tom. j, pag. 343,  
 764.

APHOR. III. Aph. vij, 9. — Coac.  
 iij, 57. = <sup>a</sup> Cels. ij, 8, p. 76, l. 12. —  
*Vide* van-Swieten, t. j, p. 342; t. ij,  
 242.

APHOR. IV. Aph. vij, 41. — Nat.  
 Human. x, 1 ad 7. — Loc. in Hom. xlv,  
 1. — Coac. iv, 22, 25. — Verat. Us. j,  
 8. = <sup>a</sup> Cels. ij, 8, p. 76, l. 14. —  
*Vide* van Swieten, t. j, p. 342; t. ij,  
 p. 242; t. iij, p. 194.

APHOR. V. II. Morb. xxij, 2, 3,  
 4. = <sup>a</sup> Cels. ij, 6, pag. 55, l. 27.  
 — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 3; t. iij,  
 p. 252.

APHOR. VI. Judicat. viij, 19. — III.  
 Morb. xiiij, 11. = <sup>a</sup> Cels. ij, 1, p. 45,  
 l. 3; iv 3, p. 103, l. 30. — *Vide* van-  
 Swieten, t. ij 323.

*Si quatuor dies superaverint, sani fiunt,*  
 febre scilicet superveniente quæ regu-  
 larem motum et salutarem abnormi con-  
 vulsionum impetui substituit.

APHOR. VII. VI. Epid. viij, 96.  
 =<sup>1</sup> Aph. ij, 45. =<sup>2</sup> Aph. ij, 39. —  
 II. Prædic. xvj, 1 ad, 16, 5, 15, —  
 Morb. Sac. xij, 1, 5, =<sup>a</sup> Cels. ij, 2,  
 pag. 47, l. 2; 8, p. 68, l. 26; pag. 73,  
 l. 3; iij, 23, pag. 172, l. 17. —  
 Exquisitam hujusce Aphorismi theo-  
 riam vide apud Russel *Œconomia* natu-  
 ræ in Glandulis, cap. 4, p. 50 et seq.  
 van-Swieten, t. ij, pag. 43; t. iij, pag.  
 403, 436.

APHOR. VIII. Aph. v, 15. — Loc.  
 in Hom. xxvj, 4. — Coac. iij, 131,  
 132, 171. — VII. Epid. xlvij, 16. —  
 I. Morb. iij, 29; x, 12; xj, 6, ad 11;  
 xxij, 15, 16; xxiv, 10. — III. Morb.  
 xvj, 30 ad 36. — Affect. viij, 19, 20;  
 ix, 13. — Int. Affect. j, 26. — Vict.  
 Acut. vij, 1, 2. — *Vide* van-Swieten,  
 t. iij, p. 53, 665.

IN SECTIONEM V. 193

APHOR. IX. Aph. iij, 29; viij, 7.  
— Coac. iij, 260. =<sup>a</sup> Cels. iij, 22;  
p. 169, l. 24. — *Vide* Russel, Loc. ci-  
tatis. *Vide* Theat. tabid. *Vide* Boerhaa-  
vium Aphorism. de cogn. et curand.  
morbis §. 1198. — *Vide* van-Swieten,  
t. iv, p. 14.

APHOR. X. Prænot. xxiiij, 15. —  
Coac. iij, 100, 101, 105, 106. — II.  
Morb. xxvij, 15 ad 19. =<sup>a</sup> Cels. ij, 6,  
p. 64, l. 6. *Vide* van-Swieten, tom. ij,  
p. 619.

Resolutione scilicet impossibili, su-  
perest sperandum, aut Metastasis, aut  
Abscessus.

APHOR. XI. Coac. iij, 213, 252. —  
II. Morb. xlvj, 16 ad 20; lv, 20 ad  
23. =<sup>a</sup> Cels. ij, 8, p. 72, l. 1; iij,  
22, p. 168, l. 4. — *Vide* van-Swieten,  
t. iv, pag. 64, 70.

APHOR. XII. Aph. v, 14; vij, 78.  
— Coac. iij, 244, 255. — I. Morb.

x, 36. — II. Morb. xlvi, 22. =<sup>a</sup> Cels. ii, 8, p. 71, l. 33. =<sup>b</sup> Cels. ij, 8, p. 72, l. 2. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 346; t. iv, p. 70.

APHOR. XIII. Coac. iij, 216, 250, 251, 273. — II. Morb. lj, 4. =<sup>a</sup> Cels. ij, 7, p. 61, l. 31. — Al. Trall. vij, 1. — Aretæus de signis Morb. Acut. l. 2, c. 2. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 24.

• APHOR. XIV. Aph. v, 12; vij, 78. — Coac. iij, 244, 256. — I. Morb. vj, 5; x, 36, 39 ad 41; xj, 41; xiv, 10. =<sup>a</sup> Cels. ij, 8, pag. 72, l. 2; iij, 22, pag. 171, l. 20. — Aretæus de Morb. diuturn. l. 1, 8, in fine. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 346, t. iv, p. 70.

APHOR. XV. Loc. in Hom. xxv, 10. — Coac. iij, 142, 171, 209, 215. — VII. Epid. xlvij, 16, 17. — I. Morb. x, 15, 17, 20. — II. Morb. lv, 23. — III. Morb. xvi, 35. =<sup>a</sup> Cel. ij, 7, p. 62, l. 15; ij, 8, p. 66, l. 34.

APHOR. XVI. <sup>1</sup>Humid. Us. iij, 2, 3.

IN SECTIONEM V. 195

==<sup>2</sup> Aph. j, 23. ==<sup>a</sup> Cels.:j, 3, p. 28, l. 22; ibid. 9, pag. 40, l. 6. ==<sup>b</sup> Cels. ij, 1, pag. 44, l. 34. — Aretæus de curat. Morb. Acut. ij, 2. — *Vide* van-Swieten, tom. j, pag. 36, tom. iij, pag. 362.

Docet Physica expandi à calore omnia, tensa relaxari, fluida rarescere: inde enumerati pendent effectus.

APHOR. XVII. Aph. v, 20. — Humid. Us. iij, 4; iv, 5. — Fractur. xxxvij, 6. — Articul. lxxiv, 10. ==<sup>a</sup> Cels. ij, 1, p. 45, l. 1. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 521, 610; t. ij, p. 219, 327. — *Vide* Sanctorium, Sect. ij, Aph. 16, 17, 18, 21, 35, 38, &c.

Stringit vasa, cogit liquida frigus; motum arcet et impedit: hinc a frigore Gangræna. Quid si frigus subitum et insolitum invadat? Vehementiora omnia expectanda sunt.

APHOR. XVIII. Humid. Us. iv, 1, 4. ==<sup>a</sup> Cels. j, 9, p. 39, l. 20. — *Vide*  
K'k ij

van-Swieten, t. j, p. 370, 521; t. ij, p. 219, 327.

APHOR. XIX. Aph. ij, 22; v, 23. — Humid. Us. j, 21. = <sup>1</sup> Humid. Us. xj, 28.

Ne sanguini calor faveat eruptionem molienti.

APHOR. XX. Aph. v, 17. — Humid. Us. iij, 4; iv, 5; xj, 15. — Fractur. xxxvij, 6. — Articul. lxxiv, 10. = <sup>a</sup> Cels. j, 9, p. 39, l. 24. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 291, 344, 610.

APHOR. XXI. Humid. Us. xj, 16. = <sup>1</sup> Aph. v, 25. = <sup>2</sup> III. Morb. xiv, ad xv. — *Vide* van-Swieten, tom. ij, p. 327, 328, t. iij, p. 181.

Attentè legatur Galenus in hunc Aphorismum.

Mirum illud quoque addemus, praxim hanc, velut novam et recenter inventam, à quibusdam prædicatam nuperri-

mis annis fuisse in tetano, præsertim à mephiti orto.

APHOR. XXII. Humid. Us. xj, 18 ad 28. = <sup>1</sup> Humid. Us. xj, 10. — Ulcer. v, 1. = <sup>2</sup> Humid. Us. j, 10. = <sup>3</sup> Humid. Us. j, 19. — I. Morb. vj, 14. = <sup>4</sup> Humid. Us. v, 13. = <sup>5</sup> Humid. Us. vj, 2, 3. — Legatur Galenus in *hunc aphorismum*. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 344, 521, 640, t. ij, p. 219.

APHOR. XXIII. <sup>1</sup> Aph. v, 19. = <sup>2</sup> Cels. j, 9, p. 39, l. 32. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 610; t. iij, p. 181; t. iv, p. 35.

APHOR. XXXIV. <sup>1</sup> Humid. Us. iv, 8; v, 16. = <sup>2</sup> VI. Epid. iij, 22. = <sup>3</sup> Cels. j, 9, p. 39, l. 21.

Notissimam theoriam *vide* apud van-Swieten, t. ij, p. 581; t. iv, p. 22, 35. — *Vide* et Observationes Sanctorii, Sect. ij.

APHOR. XXV. Humid. Us. x, 14,

15. =<sup>1</sup> Aph. v, 21. =<sup>2</sup> Cels. j, 9, p. 39, l. 31. — *Vide* Martianum in hunc Aphorism. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 879; t. ij, p. 327, 328; t. iij, p. 181; t. iv, p. 313.

APHOR. XXVI. Aër. Aq. Loc. xvij, 1. — II. Epid. ij, 29. =<sup>2</sup> Cels. ij, 18, p. 100, l. 11.

APHOR. XXVII. VI. Epid. iv, 42. =<sup>2</sup> Cels. j, 8, p. 38, l. 22.

APHOR. XXVIII. Natur. Mul. xxix, 161, ad 187.

APHOR. XXIX. Aph. iv, 1. — <sup>2</sup> Cels. ij, 6, p. 55, l. 30.

Idem est hic Aphorismus ac primus Sectionis quartæ, non eum tamen de suo hoc loco deturbavit Galenus, quòd speciatim hîc de muliebribus agatur. Nos autem tum hâc de causâ eum non eximemus, tum quòd citationibus variorum Auctorum numero non responderet.



IN SECTIONEM V. 199

APHOR. XXX. Aph. v, 43, 55. —  
I. Morb. iij, 9. — Hippocrat. j, Epid. ij,  
141. — De Naturâ Puer. xij, 19. =  
<sup>a</sup> Cels. ij, 6, p. 55, l. 30. — *Vide van-*  
*Swieten*; t. iij, p. 30; t. iv, p. 418.

APHOR. XXXI. <sup>a</sup> Cels. ij, pag. 77,  
l. 20, 25, &c. — *Vide van-Swieten*, t.  
ij, pag. 145, t. iv, p. 417.

Quod non ita verum, si mulieri ple-  
thoricæ parciùs mittatur sanguis, ita ut  
non fatiscant vasa, sed amissum præ-  
distendente plethorâ tonum recuperent.

APHOR. XXXII. I. Morb. vj, 11.  
= <sup>a</sup> Cels. ij. 8, pag. 69, l. 28; iv,  
4, §. 5, p. 202, l. 31. — *Vide van-*  
*Swieten*, t. iv, p. 374.

APHOR. XXXIII. Virgin. Morb. iij,  
2. — Epid. j, Sect. ij, 138, 139.  
= <sup>a</sup> Cels. ij, 8, pag. 69, l. 30. —  
*Vide van-Swieten*, t. iij, p. 285, t. iv,  
p. 19, 373.

APHOR. XXXIV. II. Prædict. xxx,

14 ad 18. — Coac. iij, 416. — I. Morb. Mul. xxxvij, 5; xli, 3, 6. — *Vide van-Swieten*, t. iv, p. 411.

APHOR. XXXV. Aph. v, 49. — Prænot. xiiij, 11. — Coac. iij, 175. — I. Morb. Mul. xciiij, 1, 6, 7. =<sup>a</sup> Cels. ij, 8, p. 69, l. 33. — *Vide van-Swieten*, t. iv, p. 464.

Rectè legit hîc Gorterus ὑπὸ ὑσερῶν, secundinis retentis : quod sensum magis verum efficit, et experienciâ comprobatum.

APHOR. XXXVI. Verat. Us. j, 11, 60. — Natur. Mul. x, 3, 13.

Scilicet interverti perspirationis et excrementorum sensibilium ordinem, coctionesque vitari signum hoc indicat.

APHOR. XXXVII. Aph. v, 53. — II. Epid. j, 42. — I. Morb. Mul. xliiv, 1, 2, 3. =<sup>a</sup> Cels. ij, 8, p. 76, l. 6. — *Vide van-Swieten*, t. iv, p. 440.

Communio quæ mammas inter et uterum ita existit, ut, vigente uteri actione, floreat illæ, rursusque elanguente flaccescant, mille experimentis comprobata est; licet illa, quæ ante cognitum sanguinis motum afferebatur causa, articularum mammariarum cum uterinis anastomosis, nihil hîc conducat.

APHOR. XXXVIII. Aph. v, 48.

Credat Judæus Apella.

APHOR. XXXIX. II. Prædict. xxxv, 5. =<sup>a</sup> Cels. ij, 8, p. 76, l. 8. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 539.

APHOR. XL. II. Epid. vj, 61. =<sup>a</sup> Cels. ij, 7, p. 63, l. 34. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 532; t. iv, p. 564.

Ad puerperas præcipuè, easque morbo acuto correptas pertinet hic Aphorismus, et lochia sursùm impetere per sanguinem rapta significat.

APHOR. XLI. Aph. v, 61. — Steril.

vj, 6, 11. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 408.

APHOR. XLII. Steril. vij, 1.

APHOR. XLIII. Aph. v, 30. — I. Morb. iij, 9. — Natur. Mul. xij, 17, 27. — II. Morb. Mul. lvij, 12, 29.

APHOR. XLIV. Natur. Mul. xix, 1, 3. — II. Mor. Mul. lxij, 20. — Steril. 1, 3. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 444.

APHOR. XLV. Natur. Mul. xxxvij, 1, ad 5. — I. Morb. Mul. lxxxiv, 1, 2, 3, =<sup>1</sup> I. Morb. Mul. xij, 4. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 445.

APHOR. XLVI. Aër. Aq. Loc. xij, 3. — II. Prædict. xxxij, 2. — Natur. Mul. xix, 4, 5, 7. — Steril. x, 7, xv, 11, ad 14. — Superfoet. xvij, 1. =<sup>1</sup> Superfoet. ix, 4. — Aristotel. de Gener. Animal. j, 18. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 257; t. iv. p. 445.

Non quod omenti moles in ipsum de-

cumbat uterum, sed dum vicina premit et urget, ad ipsum usque uterum per-tingunt ponderis, aliquando immensi, in-commoda.

APHOR. XLVII. Natur. Mul. vj, 5.  
 — I. Mor. Mul. xcj, 32. — II. Morb. Mul. xxix, 5. = <sup>1</sup> Natur. Mul. viij, 1.  
 — *Vide van-Swieten, t. iv, p. 550.*

Error hic maximi momenti in omnes ferè versiones quasi consenuit. ἔμφολον γειέσθαι, sic notante Martiano, non aliter intelligi potest nisi *necesse est pus in cava effundi*: quo sensu ἔμφολον apud Hippocratem dicuntur, qui pure intra viscera affuso colliquescent. Hunc sensum collaudavit Haën; aliter propositio nullum offert rationalem sensum. *Vide Hipp. de artic. de morbis mulierum lib. 2, et quæ doctè conguessit in hunc locum exempla Cl. de Villebrune.*

APHOR. XLVIII. Aph. v, 38. — II. Prædict. xxxiv, 10, 11. — II. Epid. vj, 32. — Superfœt. xvij, 10, 11, 12.

APHOR. XLIX. Aph. v, 35. — Coac.

iiij, 175. — Prænot. xiiij, 11. — II. Epid. v, 42, 43. — I. Morb. Mul. lxxvj, 6, 7; xciiij, 1, 6, 7. — II. Morb. Mul. xliij, 6, 7. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 512.

APHOR. L. II. Epid. vj, 33. — II. Morb. Mul. j, 4; ij, 17. =<sup>a</sup> Cels. ij, 11, p. 83, l. 24; iv 20, pag. 233, l. 33. — *Vide* van-Swieten, t. j, pag. 620; t. iv, p. 539.

APHOR. LI. Aph. v, 54. — Octimest. iv, 5, 6, 7. — Superfoet. ij, 1, 2, 3; xix, 1. — *Vide* van-Swieten, t. iv, pag. 403.

APHOR. LII. II. Epid. vj, 35, 36. =<sup>a</sup> Cels. ij, 7, pag. 62, l. 1. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 440, 539.

APHOR. LIII. Aph. v, 37. — II. Epid. ij, 39 ad 42. — I. Morb. Mul. xliv. 1, 2, 3. — *Vide* van-Swieten, t. iv, pag. 440.

APHOR. LIV. Aph. v, 51. — Natur.

IN SECTIONEM V. 205

Mul. xxxj, 10. — II. Morb. Mul. xxij, 11; xlv, 11, 12; xlvj, 1, 2; xlvij, 1; xlix, 1, 2; l, 1, 2. =<sup>1</sup> Natur. Mul. xix, 9. =<sup>2</sup> I. Morb. Mul. xxiv, 2; lxvij, 5. — II. Morb. Mul. xvij, 24; l, 13. — *Vide van-Swieten*: t. iv, p. 403.

APHOR. LV. Aph. v, 30, 43. — Coac, iij, 408. =<sup>1</sup> Aph. ij, 28. — *Vide van-Swieten*, t. iv, p. 433.

APHOR. LVI. Aph. v, 3. — Coac. iij, 424. — II. Morb. Mul. xij, 7, 9. — *Vide van-Swieten*, t. iv, p. 451.

APHOR. LVII. <sup>1</sup> Natur. xij, 5; xxxix, 1, 2, 5, 6; xl, 2, 5, 6. — I. Morb. Mul. xiv, 1, 12. — II. Morb. Mul. iij, v, vj, &c. =<sup>2</sup> De Genitur. vij, 8. — Natur. Puer. vj, 14; xij, 1. — Coac. Prænot. iij, 412, 413. — Virg. Morb. ij, 5 ad 14. — Natur. Mul. xvij, 1, ad 5. — I. Morb. Mul. iij, 1; x, 1, ad 5. — Superfoet. xxiv, 1. =<sup>2</sup> Cels. ij, 7, p. 59, l. 29. — *Vide van-Swieten*, t. iv, 360.

APHOR. LVIII. <sup>1</sup> Fistul. iij, 1; iv, Mm

1. =<sup>2</sup> Aph. vij, 13. — Int. Affect. xli, 6. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 243, t. iij; pag. 84, 172, 238; t. iv, p. 546.

Vicinia vasorum, imò et fibrarum communio pariunt hæc symptomata.

APHOR. LIX. Aph. v, 41. — Natur. Mul. vij, 9. — I. Morb. Mul. cvij, 1, &c. — II. Morb. Mul. xl, 20, 21. — Steril. vj, 3. — Superfoet. ix, 3; x, 9, 11. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 368.

Fidem his derogat Anatome.

APHOR. LX. Natur. Puer. v, 3. — I. Morb. Mul. xl, 2, 5, 9, 11; xliv, 4, 5, 6; xcix, 2. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 439.

APHOR. LXI. Aph. v, 41. — I. Morb. Mul. xcix, 2. — Steril. vj, 9, 10. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 400.

APHOR. LXII. I. Morb. Mul. xxvj, 27 xxxij, 5; xxxiv, 1. =<sup>2</sup> II. Prædict. xxxiij, 2, ad 6.



APHOR. LXIII. <sup>1</sup> Aliment. iv, 1, 2, 5. = <sup>2</sup> Aliment. vj, 3, 4, 6, 7

APHOR. LXIV. Ægin. xij, 7. =  
<sup>1</sup> I. Morb. Mul. lxxxviiij, 22. =  
<sup>2</sup> Aph. iv, 73. = <sup>3</sup> Int. Affect. iv, 23; xj, 26. = <sup>4</sup> II. Mor. Mul. viij, 21. = <sup>a</sup> Cels. iij, 22, pag. 170, l. 7. = <sup>b</sup> Cels. iij, 22, pag. 170, 11.  
 — Aretæus de Curat. Acut. 1, 3.  
 — *Vide* van-Swienten, t. ij, p. 196; t. iv, p. 40, 96.

Dum caput dolet, et in quavis febre, vel primariò, vel sympathicè patitur ventriculus: res evidentior est, si murmurent hypochondria, si plexûm nervosorum abdominalium irritatio, costas melancholicè attollat. Hinc facilè degener lac corrumpitur, acescit. Laborat pariter ventriculus, si bilis copiosius erumpens coctioni deficiat; si febris omnes succos vitiet, si hæmorrhagia vires postraverit. Hæc absint signa, dulce gustu, dulce facultate lac acria involvit, vires reficit, nutrit optimè.

M m ij

APHOR. LXV. II. Epid. iij, 129 ad 132. =<sup>a</sup> Cels. ij, 7, p. 62, l. 5.

Firma ab Hippocratis ævo, ad nostrum usque, prognosim hanc demonstravit experientia, quam nulla assequi potest Recentiorum theoria. *Vide* de his præcipuè clarissimum Duretum nostrum in Coacas, cap. iv, p. 114 et seq.

APHOR. LXVI. II. Epid. iij, 128. <sup>a</sup> Cels. v, 26, p. 295, l. 31. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 207.

APHOR. LXVII. II. Epid. iij, 128. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 207.

Laxi dicuntur tumores qui humore alluuntur ad partem affluentem, ex ordine naturæ, solutionemque facilem promittunt. Crudi sunt tumores qui, vel erethismo constricti, vel languentis circuitus vi vitali destituti sunt.

APHOR. LXVIII. Loc. in Hom. xlix, 10. — II. Prædict. xxxvj, 5, 6. — VI. Epid. ij, 48. — Affection. ij, 10, 11. — Soran. Ephes. Isagog. c. xxj.

APHOR. LXIX. II. Epid. iij, III. — VI. Epid. iij, 30, ad 35. =<sup>1</sup> Natur. Puer. xvij, 2, 3, 14, xvij, I. — Lege hinc observationem D. de Villebrune.

APHOR. LXX. Aph. ij, 26. — I. Epid. iij, 17, 18. — VI. Epid. vj, 16; viij, 95, 96, 97. =<sup>1</sup> San. Tuend. ad Dem. 12. =<sup>2</sup> Vid. Aph. iv, 57. — *Vide* van-Swieten, t. ij, pag. 3, 476, t. iij, pag. 437.

APHOR. LXXI. VI. Epid. vj, 29.

APHOR. LXXII. Fateor rem mihi experientiâ non adeò veram videri; imò theoriæ repugnat, cùm debilissima sit in ictero coctio, nisi de eo intelligatur ictero in quo bilis exundat undequaque; aut particula & præposterè addita fuerit, ut vult Galenus in hunc Aphorismum.



## Τ Μ Η Μ Α Ἐ Κ Τ Ο Ν .

α. ἘΝ τῆσι χρονίῃσι λειντερήσιν ὄξυρεσμὴ ἑπιγίνομδύη , μὴ γενομδύη πρότερον , σημεῖον ἀγαθόν.

β. Οἷσι ῤίν-ς ὑγρότερα φύσει , καὶ ἡ γονὴ ὑγρότερη , ὑγιαίνουσι νοσηρότερον · οἷσι ῥ τάναντία , ὑγιεινότερον.

γ. Ἐν τῆσι μακρῆσι δυσεντερήσιν αἰ δ' ἀπιστία , κακόν · καὶ σὺν <sup>α</sup> πυρέλῳ , χάλιον.

δ. Τὰ περιμάδηρα ἔλκεα <sup>α</sup> κακοήθεια.

ε. Τῶν ὀδυνέων ἔ ἐν πλευρῆσι , ἔ ἐν στήθεσι , ἔ ἐν τοῖσιν ἄλλοισι (μέρεσιν) ἢν μέγα ἀφέρωσι , καλαμαθητέον.

## S E C T I O S E X T A.

1. **I**N diuturnis intestinorum lævitatibus ructus acidus superveniens, qui prius non fuit, signum bonum.

2. Quibus nares naturâ humidiores, et genitura humidior, imperfectiùs sani sunt : quibus verò contraria, perfectiùs.

3. In longis dysenteriis appetitus prostratus, malum : et <sup>a</sup> cum febre, pejus.

4. Ulcera circum - glabra <sup>a</sup> maligna.

5. Dolores et in lateribus, et in pectoribus, et in ceteris (partibus,) si multùm differant, considerandum.

6. Renum et vesicæ dolores difficulter sanantur *in* senibus.

7. Dolores qui in ventre fiunt, elati quidem, leviores: non elati verò, vehementiores.

8. Hydropicis ulcera in corpore orta <sup>a</sup> non facile sanantur.

9. Efflorescentiæ latae non admodum pruriginosæ.

10. Caput <sup>a</sup> laboranti, & circumcirca dolenti, pus, aut aqua, aut sanguis effluens per nares, aut per os, aut per aures, solvit morbum.

11. Melancholicis, et nephriticis, hæmorrhoides supervenientes, bonum.

12. Ab hæmorrhoidibus sanato diuturnis, nisi una servata fuerit, periculum <sup>a</sup> est ne hydrops superveniat, aut tabes.

ε'. Τὰ νεφρίικα, καὶ ὀκόσα κτ' τὴν κύσιν ἀλγήμελα, ἐργαδῶς ὑγιάζεσθαι τοῖσι πρεσβύτησι.

ζ'. Τὰ ἀλγήμελα τὰ κτ' τὴν κοιλίην γινόμενα, τὰ μὲν μετέωρα, κενώτερα· τὰ δὲ μὴ μετέωρα, ἰχυρότερα.

η'. Τοῖσιν ὑδρωπικοῖσι τὰ γινόμενα ἔλκεα<sup>α</sup> ἐν τῷ σώματι, ἐρηδίως ὑγιάζεσθαι.

θ'. Τὰ πλατέα ὄξανθήματα ἐ πάνυ τι κνησμάδεα.

ι'. Κεφαλὴν<sup>α</sup> πονέοντι, καὶ ὤρειον, πύον, ἢ ὕδωρ, ἢ αἷμα ῥυέν κτ' τὰς ῥίνας, ἢ κτ' τὸ σῶμα, ἢ κτ' τὰ ὦτα, λύει τὸ νέσημα.

ιά. Τοῖσι μελαγχολικοῖσι, καὶ τοῖσι νεφρίικοῖσιν, αἰμορροΐδες ἐπιγινόμενα, ἀγαθόν.

ιβ. Αἰμορροΐδας ἰσθέντι χρονίας, ἢν μὴ μία φυλαχθῆ, κίνδυνος<sup>α</sup> ὑδρωπα ἐπιγίνασθαι, ἢ φθίσιν.

Νη

ιγ'. Ὑπὸ λυγμῶν ἐχομῶν πιαρομοὶ  
 ἂ ἐπιγλομῶμοι λύσει τὸ λυγμόν.

ιδ'. Ὑπὸ ὕδροπος ἐχομῶν, ἔκ τῶν  
 τὰς φλέβας ἐς τὴν κοιλίῳ ὕδατι  
 ῥυέντι, λύσει.

ιε'. Ὑπὸ Δερρῶν ἂ ἐχομῶν μα-  
 κρῆς, ἀπὸ ταυλομάτῃ ἐμείνῃ ἐπιγλο-  
 μῶμοι λύσει Δερρῶν.

ισ'. Ὑπὸ πλευρίτιδος, ἢ ὑπὸ πει-  
 πλεμονίης ἐχομῶν ἂ Δερρῶν ἐπι-  
 γλομῶν, κακόν.

ιζ'. Ὀφθαλμιῶν ἂ ὑπὸ Δερρῶν  
 ληφθῆναι, ἀγαθόν.

ιη'. Κυσιν Δερρῶν, ἢ ἐκέφαλον,  
 ἢ καρδίῳ, ἢ φρένας, ἢ τῶν ἐντέρων  
 τι τῶν λεπτῶν, ἢ κοιλίῳ, ἢ ἥπαρ,  
 θανατῶδες.

ιθ'. Ἐπὶ Δερρῶν ὁσέον, ἢ χόν-



S E C T I O VI. 215

13. A singultu detento sternutationes<sup>a</sup> supervenientes solvunt singultum.

14. Ab hydrope detento, si aqua secundum venas in alvum fluxerit, solutio fit.

15. A diuturno alvi<sup>a</sup> profluvio detento, spontè superveniens vomitus, alvi profluvium solvit.

16. A pleuritide, aut à peripneumoniâ detento, alvi<sup>a</sup> profluvium superveniens, malum.

17. Ophthalmiâ<sup>a</sup> laborantem alvi profluvio corripit, bonum.

18. Cui persecta est vesica, aut cerebrum, aut cor, aut septum transversum, aut aliquod ex intestinis tenuibus, aut ventriculus, aut hepar, lethale.

19. Ubi dissectum fuerit os, aut

cartilago, <sup>1</sup> aut nervus, <sup>2</sup> aut genæ pars tenuis, aut præputium, neque augetur, neque coalescit.

20. Si in ventrem sanguis effusus <sup>a</sup> fuerit præter naturam, necesse est suppurari.

21. Insanientibus si varices, <sup>a</sup> aut hæmorrhoides supervenerint, insanientiæ solutio fit.

22. Quæ ruptiones ex dorso ad cubitos descendunt, venæsectio solvit.

23. Si metus et <sup>a</sup> tristitia multo tempore perseverent, melancholicum hoc ipsum.

24. Si ex intestinis tenuibus aliquod dissectum fuerit, non coalescit.

25. Erysipelas foris quidem intro

δρϞ, <sup>1</sup> ἢ νεῦρον, <sup>α</sup> ἢ γνάθος τὸ λεπτόν, ἢ ἀκροποσθίη, ἕτε ἀύξει, ἕτε ξυμφύει).

κ'. Ἦν ἐς τὴν κοιλίῳ αἷμα <sup>α</sup> ἐκχυθῆ ὡς αὐτὴ φύσιν, ἀνάγκη ἐκπυθῆναι.

κά. Τοῖσι μαγνομύοισι, κισσῶν, <sup>α</sup> ἢ αἰμορροΐδων ἔπιγενομύων, τ' μανίης λύσις.

κβ'. Ὀκόσα ρήγματα ἐκ τ' νάτης <sup>2</sup> ἐς τὰς ἀγκῶνας κάλαθαίνει, φλεβοτομία λύει.

κγ'. Ἦν φόβος ἐ <sup>α</sup> δυοθυμίη πολὺν χρόνον διατελέη, μελαγχολικὸν τὸ τοῖστον.

κδ'. Ἐντέρων ἢν διακοπῆ τῶν λεπτῶν τι, ἕ ξυμφύει).

κε'. Ἐρυσίπεγας ἕξωθεν μὲν εἶσα

τρέπεαζ, σὺν ἀγαθόν· ἔσωθεν ἢ ἔξω,  
ἀγαθόν.

κς'. Ὀκόσοισιν ἂν ἐν τοῖσιν καύσοισι  
τρομοὶ <sup>α</sup> γένων), ὄρακοπὴ λύει.

κζ'. Ὀκόσοι ἔμψυοι, <sup>ι</sup> ἢ ὑδρωπι-  
κοὶ <sup>α</sup> κήον), ἢ τέμνον), ἐκρύν-  
τῃ <sup>β</sup> πύς, ἢ <sup>β</sup> ὕδαλῃ ἀθρόα, πάν-  
τως λ'πόλλυν).

κή. Εὐνῆχοι <sup>α</sup> ἐ ποδαγριῶσιν, <sup>α</sup>  
ἐδ' ἐ φαλακροὶ γίννον).

κθ'. Γυνὴ <sup>α</sup> ἐ ποδαγριῶ, ἢν μὴ τὰ  
καλαμῆνια <sup>β</sup> αὐτῆ ἐκλίπη.

λ'. Παῖς <sup>α</sup> ἐ ποδαγριῶ, πρὸ <sup>β</sup>  
ἀφροδισιασμῶ.

λά. Ὀδύνας ὀφθαλμῶν ἀκρηλοπο-  
σίη, ἢ λειρὸν, ἢ πυρίη, ἢ φλεβολο-  
μίη, ἢ φαρμακείη λύει.

λβ'. <sup>ι</sup> Τραυλοὶ ὑπὸ Δ'αῤ'ροίης μά-  
λισα ἀλίσκον) μακρῆς.

verti, non bonum : intùs verò foràs ,  
bonum.

26. Quibus in febre ardente tremores<sup>a</sup> fiunt, delirium solvit.

27. Qui suppurati, <sup>1</sup> aut hydrofici<sup>a</sup> uruntur, aut secantur, *hi* pure, aut aquâ acervatim effluente, omninò moriuntur.

28. Eunuchi<sup>a</sup> non laborant podagrâ, <sup>1</sup> neque calvi fiunt.

29. Mulier non<sup>a</sup> laborat podagrâ, nisi menses<sup>a</sup> ipsi defecerint.

30. Puer<sup>a</sup> non laborat podagrâ, ante Veneris usum.

31. Oculorum dolores meri potus, aut balneum, <sup>a</sup> aut fomentum, aut venæ sectio, aut purgatio solvit.

32. <sup>1</sup> Balbi ab alvi profluvio maximè corripuntur longo.

33. Acidum ructantes non admodum pleuritici fiunt.

34. Qui calvi *sunt*, his varices magni non fiunt. Quibus verò dum sunt calvi superveniunt varices, hi rursus capillati fiunt.

35. Hydropicis tuſſis <sup>a</sup> superveniens, malum.

36. Urinæ difficultatem venæ sectio solvit : secundæ verò internæ.

37. Ab anginâ detento tumorem <sup>a</sup> fieri in collo, bonum : foràs enim morbus vertitur.

38. <sup>1</sup> Quibus occulti cancri fiunt, eos non curare melius est. Curati enim citò pereunt. Non curati verò longius tempus perdurant.

39. Convulsio fit, aut à repletionem, aut ab evacuationem. Sic quidem etiam singultus.

λγ'. Οἱ ὄξυρευμειώδεις ἔ πάνυ τι πλευρίτικοί γίνονται).

λδ'. Οκόσοι φαλακροί, τετέοισι κισσοί μεγάλοι ἔ γίνονται). οκόσοισι δὲ ἂν φαλακροῖσιν ἔσσι κισσοί ἔπιγένων), πάλιν ἔτοι γίνονται) δασέες.

λε'. Τοῖσιν ὑδρωπικοῖσι βήξ<sup>α</sup> ἔπιγενομένη, κακόν.

λς'. Δυσσρίλυ φλεβοτομή λύει· τάμνειν ἔ τὰς εἴσω.

λζ'. Ὑπὸ κυνάγχης ἐχομένη<sup>α</sup> οἰδημα γλυέας ἐν τῇ τραχήλῳ, ἀγαθόν· ἔξω γὲ τρέπει) τὸ νέσημα.

λη'. Οκόσοισι κρυπτοὶ καρκῖνοι γίνονται), μὴ θεραπεύειν βέλιον· θεραπευόμενοι γὲ ἀπόλλυνται) ταχέως· μὴ θεραπευόμενοι ἔ πλείω χρόνον ἀβιελῶσι.

λθ'. Σπασμὸς γίνε) ἢ ὑπὸ πληρώσει⊕, ἢ κενώσει⊕. ἔτω ἔ καὶ λυγμός.

μ'. Ὀκόσοισι ὡεὶ τὸ ὑποχόνδριον  
 πόνοι γίνονται ἄτερ<sup>α</sup> φλεγμονῆς,  
 τετέοισι πυρετὸς ἐπιγνώμῃ<sup>β</sup> λύει τὸ  
 πόνον.

μά. Ὀκόσοισι Διάπυον τι ἔον ἐν  
 τῷ σώματι μὴ Δρασημαίνει, τετέοισι  
 Διὰ παχύτητα<sup>γ</sup> ἢ πύξ, ἢ<sup>δ</sup> τώπε,  
 ὅσα Δπωσημαίνει.

μδ'. Ἐν τοῖσιν ἰκτερικοῖσι τὸ ἥπαρ  
<sup>α</sup> σκληρὸν γινέσθαι, πονηρόν.

μεγ'. Ὀκόσοι σπλινῶδες ὑπὸ<sup>α</sup>  
 δυσεντερίας ἀλίσκον<sup>β</sup>, ἢ τετέοισιν,  
 ἐπιγενομένης μακρῆς<sup>γ</sup> ἢ δυσεντερίας,  
<sup>α</sup> ὑδραψ<sup>δ</sup> ἐπιγίνε<sup>ε</sup>, ἢ λειεντερία, καὶ  
 ἀπόκλυ<sup>ς</sup>).

μδ'. Ὀκόσοισιν ἐκ<sup>α</sup> τραγχερίης  
 εἰλεὸς ἐπιγίνε<sup>β</sup>, ἐν ἑπτὰ ἡμέρησιν  
 ἀπόκλυ<sup>γ</sup>, ἢν μὴ πυρετῶ<sup>δ</sup> ἐπιγνομή<sup>ε</sup>  
 ἄλλισ τὸ ἔρον ῥυῆ.



40. Quibus ad hypochondrium dolores fiunt, absque<sup>a</sup> inflammatione, his febris superveniens solvit dolorem.

41. Quibus suppuratum quid in corpore existens, nullum sui signum prodit, his propter crassitudinem puris, aut loci, signum non exhibet.

42. In ictericis hepar<sup>a</sup> durum fieri, malum.

43. Qui lienosi à dysenteriâ<sup>a</sup> corripuntur, his longâ superveniente dysenteriâ, hydrops supervenit, aut intestinorum lævitas, et pereunt.

44. Quibus ex<sup>a</sup> urinæ stillicidio volvulus supervenit, in septem diebus pereunt, nisi febre superveniente urina abundè fluxerit.

45. Ulcera quæcumque annua fiunt, aut longius tempus occupant, necesse est os abscedere, <sup>1</sup> et cicatrices cavas fieri.

46, <sup>1</sup> Qui gibbi ex asthmate, aut tussi fiunt ante pubertatem, pereunt.

47. Quibus venæ sectio, aut purgatio conducit, his vere convenit venam secare, aut purgationem facere.

48. Lienosis dysenteria <sup>a</sup> superveniens, bonum.

49. Qui podagrici morbi fiunt, hī, sedatâ inflammatione, in quadraginta diebus decedunt.

50. Quibus percissum fuerit cerebrum <sup>1</sup>, his necesse est febrem, & bilis vomitum supervenire.

51. Quibus sanis dolores derepentè

μέ. Ἐλκεα ὀκόσα ἐνιαύσια γίνε), ἢ μακρότερον χρόνον ἴχουσιν, ἀνάγκη ὀσέον ἀφίσααξ, ἢ ἐ τὰς ἐλάς κοίλας γίνεαξ.

μς. Ἐκόςοι ὑδοὶ ἐξ ἀσθαλιῶ, ἢ βηχὸς γίγνον) πρὸ τῆς ἡδης, ἀπόλ-  
λυν).

μζ. Ἐκόςοισι φλεβοτομία, ἢ φαρ-  
μακεία ξυμφέρι, τστέεξ προσῆκον ἔ  
ἡρῶ φλεβοτομεῖν, ἢ φαρμακεύειν.

μη. Τοῖσι σπλῆνώδεσι<sup>α</sup> δυσεντερία  
ἐπιγνομή, ἀγαθόν.

μθ. Ἐκόςοα ποδαγρικὰ νσσήμαλα  
γίγνον), ταῦτα δ'ποφλεγμαῖνα<sup>α</sup> ἐν  
τεσσαράκοντα ἡμέρησιν δ'ποκαθίσαν).

ν. Ἐκόςοισιν ἀν ὁ ἐκέφαλιῶ<sup>α</sup> ἀλα-  
κοπῆ, τστέοισιν ἀνάγκη πυρετὸν, καὶ  
χολῆς ἔμελον ἐπιγίνεαξ.

νά. Ἐκόςοισιν ὑγιάνησιν ὀδύνα γί-

Γνον) ἔξαιφνης ἐν τῇ κεφαλῇ, ἔπα-  
ραχρῆμα ἄφανοι γίνον), ἔρέγχασιν,  
ἀπόχυν) ἐν ἐπιὰ ἡμέρησιν, ἢ ἢν μὴ  
πυρετὸς ἐπιλάβῃ.

νβ'. Σκοπεῖν ἢ χρῆ ἔ τὰς ὑποφά-  
σιαις τῶ ὀφθαλμῶν ἐν τοῖσιν ὑπνοῖσιν.  
ἢν γὰρ τι ὑποφαίνηται, ξυμβαλλο-  
μῶν τῶ βλεφάρων, <sup>α</sup> τῶ λευκῆ, μὴ  
ἐκ ἀφροσύνης πονέοντι, ἢ ἐκ φαρμακοπο-  
σίης, φλαῦρον τὸ σημεῖον, ἔ θανα-  
τῶδες σφόδρα.

νγ'. Αἱ ὀφθαλμοσύναι, αἱ μὲν μῆ  
<sup>α</sup> γέλωτι γινόμεναι, ἀσφαλέστεραι· αἱ  
ἢ μῆ σπασμῶς, ἐπισφαλέστεραι.

νδ'. Ἐν τοῖσιν ὀξέσι πάθει τοῖσι  
μῆ πυρετῆ, αἱ κλαυθμώδεις ἀναπ-  
νοαί, κακά.

νε'. Τὰ ποδαγριγὰ <sup>α</sup>, τῶ ἢρ ἔ τῶ  
φθινοπωρῶ, κινέει) ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ.

fiunt in capite, et statim muti fiunt, ac stertunt, in septem diebus pereunt, <sup>1</sup> nisi febris apprehenderit.

52. Considerare verò etiam oportet oculorum subtùs apparentia in somnis. Si enim albi quid<sup>a</sup>, palpebris commissis, subtùs appareat, *id* que non ex alvi profluvio sit, aut ex potione purgante, pravum signum, et valdè lethale.

53. Deliria, cum<sup>a</sup> risu quidem accidentia, securiora: cum studio verò, periculosiora.

54. In acutis affectionibus quæ cum febre *sunt*, luctuosæ respirationes, malæ.

55. Podagrici *morbi*, vere et autumno, moventur ut plurimùm.

56. <sup>1</sup> Morbis melancholicis ad hæc periculosi sunt *humorum* <sup>2</sup> decubitus, <sup>3</sup> aut corporis siderationem, aut convulsionem, aut insaniam, aut cæcitate[m] significant.

57. Apoplectici autem fiunt maxime, ætate ab anno quadragesimo usque ad sexagesimum.

58. Si omentum exciderit, necesse est putrefieri.

59. Quibus à diuturno coxendicis morbo vexatis coxa excidit, et rursus incidit, his mucus innascitur.

60. <sup>1</sup> Quibus à diuturno coxendicis morbo vexatis coxa <sup>2</sup> excidit, his crus tabescit, <sup>3</sup> et claudicant, nisi ulti fuerint.



νς'. <sup>1</sup> Τοῖσι μελαγχολικοῖσι νουή-  
μασιν ἐς τὰδε ἑπικίνδυνοι <sup>2</sup> αἱ δ' ὑπο-  
σκήψεις, <sup>3</sup> ἢ δ' ὑποληξίην ἔσάμαλθ',  
ἢ σπασμὸν, ἢ μανίην, ἢ τύφλωσιν ση-  
μαίνουσι.

νζ'. Ἀπόωληκτοὶ ἢ μάλιστ' ἀγίνοντο,  
ἡλικίῃ τῇ δ' ὑπὸ τεσσαράκοντα ἐτέων  
ἄχρις ἐξήκοντα.

νη'. Ἦν ἐπίπλοον ἐκπέση, ἀνάσκη  
δ' ὑποσπῆσαι.

νθ'. Ὀκόσοισιν ὑπὸ ἰχιάδθ' ἐνο-  
χλημύμοισι χρονίῃς ἔξιστα) τὸ ἰχίον,  
καὶ πάλιν ἐμπίπτει, τετέοισι μύξαι ἐπι-  
γίνοντο).

ξ'. <sup>1</sup> Ὀκόσοισιν ὑπὸ ἰχιάδθ' ἐνο-  
χλημύμοισι χρονίῃς τὸ ἰχίον <sup>2</sup> ἔξιστα),  
τετέοισι τήκε) τὸ σκέλθ', <sup>2</sup> καὶ χα-  
λῶν), <sup>3</sup> ἢν μὴ καυθῶσιν.



---

 N O T Æ

I N

## SECTIONEM SEXTAM.

---

APHOR. I. II. Epid. ij, 49, 50, 51.  
 — I. Morb. vj, 10. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 116; t. ij, p. 341.

Signum est scilicet restitutæ incipientis quantumvis leviter coctionis. Aliter rem intelligit Russel œconomiâ Naturæ in Glandul. p. 125.

APHOR. II. IV. Epid. vj, 37. — *Vide* Boerhaav. de Morbis fibræ debilis et laxæ, et Commentaria van-Swieten in §. 24 et sequentes.

APHOR. III. VI. Epid. viij, 1. — Coac. vj, 100. = <sup>a</sup> Cels. ij, 8, pag. 69, l. 5.



APHOR. IV. VI. Epid. viij, 2. =  
<sup>a</sup> Cels. v, 26, §. 31, p. 300, l. 10.

Cum scilicet circa ulceris limbos nulla inflammatio vasa in tumorem attollit, illaque ulceri suppuranti non favet; licet illud sit naturæ actuosæ votum.

APHOR. V. II. Prædict. xvij, 4; xix, 6, 7; xx, 4; — VI. Epid. vij, 83. — Vict. Acut. lij, 1, 2, 3. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 75.

APHOR. VI. VI. Epid. viij, 4. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 222.

Solida atona in senibus induruere; liquida minus cocta sunt; perspiratio minor; vesica ex rei necessitate iners et corrugata.

APHOR. VII. Hi, dum intestina distendunt, flatus et humores ad exitum promptos indicant, illi fixum in membranis, aut glandulis acre irritans ostendunt; exemplo sit colicus pictorum dolor.

Qq ij

APHOR. VIII. <sup>a</sup> Cels. iij, 21, p. 161, l. 4. — *Vide* van-Swieten, t. j, 209.

Frustrâ ab humorum compage solutâ penitùs et perversâ pus bonum speraremus. Quod tamen ad medelam ulcerum necessarium est.

APHOR. IX. VI. Epid. ij, 52. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 360.

APHOR. X. Judicat. xij, 3. — Coac. ij, 25, 26, 27, 59. — Sal. Diæt. xiv, 4. — VII. Epid. xxx, 6, 16. — II. Morb. ìv, 18; xij, 1, ad 7; xvj, 10. — III. Morb. ij, 6, 7, 8. = <sup>a</sup> Cels. ij, 8, p. 70, l. 9. — *Vide* van-Swieten, t. j, pag. 411; t. iij, p. 308.

APHOR. XI. Aph. vj, 21. — Humor. xj, 1. — Judicat. x, 9. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 787; t. iij, p. 233.

APHOR. XII. Humor. xj, 3. — IV. xxxj, 1, 2. — V. Epid. x, 18, ad 21. Epid. — VI. Epid. iij, 65, = <sup>a</sup> Cels. ij,

IN SECTIONEM VI. 233

7, p. 62, l. 12. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 19.

APHOR. XIII. Prænot. xij, 11. — Coac. iij, 175. =<sup>a</sup> Cels. ij, 8, p. 69, l. 27. — Van-Swieten, t. ij, p. 243; t. iv, p. 465.

APHOR. XIV. Aph. vij, 29. — Flat. xvij, 8, 9. — Judicat. xj, 20. — Coac. iij, 285, 289. — I Morb. vj, 7. — II. Morb. lxix, 11, 12. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 338, 347; t. iv, p. 165.

APHOR. XV. II. Diæt. xxvj, 15, 16. — Loc. in Hom. xlv, 8. — Coac. iij, 7. =<sup>a</sup> Cels. ij, 8, pag. 69, l. 27. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 354.

Non tam impete vomitûs facto vacuatur morbi fomes, quàm minuitur et invertitur motus peristalticus celerrimè deorsùm vergens.

APHOR. XVI. Aph. v, 12, 14. — Loc. in Hom. xxix, 15, 16, 17. — I,

Morb. vj, 5; x, 41. — III. Morb. xvij, 59. =<sup>a</sup> Cels. ij, 8, pag. 71, l. 10. — *Vide* van-Swieten, tom. ij, pag. 345, 671.

Putridam enim testatur morbi indolem profusus et symptomaticus alvi fluxus. Tenuiora, diluentia, à parte inflammata avertit. Vires morbo ferendo reddit impares.

APHOR. XVII. Judicat. xij, 9. — Coac. ij, 130, 133. =<sup>a</sup> Cels. ij, 8, pag. 69, l. 20. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 345, 350.

APHOR. XVIII. Aph. vj, 24. — II. Prædict. xix, 2, ad 6, 11, 12; xxij, 1. — Coac. iij, 387, 388, 389. — I. Morb. iij, 4; vij, 21. =<sup>a</sup> Cels. v, 26, §. 2, p. 283, l. 18. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 478.

Docet contrarium experientia, laterali calculi operatione.

APHOR. XIX. Aph. vij, 28. —

IN SECTIONEM VI. 235

Coac. iij, 380, ad 382. — II. Prædic. xxiv, 1. — I. Morb. iij, 32, 33; vij, 21. =<sup>a</sup> Cels. ij, 10, p. 81, l. 24; v, 26, §. 22, p. 291, l. 28. — Aristotel. histor. Animal. 13. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 513.

Meliora docuit recentiorum observatio.

APHOR. XX. Aph. vij, 38. — I. Mor. iij, 37; x, 42, ad 48, xij, 4; xv, 4. =<sup>a</sup> Cels. ij, 7, p. 62, l. 29. — *Vide* van-wieten, t. j, p. 255, 438; t. iij, p. 665.

Non suppuratione verâ, sed corruptelâ degener fit, si non resorbeatur sanguis.

APHOR. XXI. Aph. vij, 5. — Humor. xj, 1. =<sup>a</sup> Cels. ij, 8, p. 69, l. 21. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 304, 553, 554; t. iij, p. 284, 510.

APHOR. XXII. II. Cels<sup>a</sup> ii, 10, p. 81, l. 8.

Nomine τῶ ῥήματος Antiqui causas intellexêre quæ fibras divellunt, aut

distrahunt. Galenus credidit legendum  
*ἀλγήματα.*

APHOR. XXIII. Aph. vij, 40. =  
<sup>a</sup> Cels. ij, 7, p. 62, l. 17. — *Vide van-*  
*Swieten, t. iij, p. 467.*

APHOR. XXIV. Aph. vj, 18, 19. —  
 II. Prædict. xix, 4. — Coac. iij, 379,  
 387. — I. Morb. vij, 21. — *Vide van-*  
*Swieten, t. j, p. 478, 482.*

Contrarium docuit sera Recentiorum  
 experientia.

APHOR. XXV. Aph. vj, 37. —  
 Prænot. vij, 3; xxij, 9. — Coac. iij,  
 103. — I. Morb. vj, 8, 9. — *Vide van-*  
*Swieten, t. ij, p. 73, 369.*

APHOR. XXVI. Judicat. xj, 10. —  
 Coac. j, 185. = <sup>a</sup> Cels, ij, 8, p. 69,  
 l. 34. — *Vide van-Swieten, tom. ij,*  
*p. 441.*

Vel malo omine solvit levius malum  
 noxa gravior, vel delirium febrile tollit  
 convulsivos tremores; vel dum instan-

tem præſagit hæmorrhagiam ſignum  
proximius , remotiora ſanat.

APHOR. XXVII. Aph. ij, 51; vij,  
44. — Coac. iij, 91, 92. — II. Morb.  
xlv, 24, ad 28. — III. xxvij, 2, 8, 14.  
— Int. Affect. iv, 30; x, 20, ad 23;  
xxv, 33, ad 36; xxvij, 5. =<sup>1</sup> VI. Epid.  
vij, 62. =<sup>2</sup> Cels. ij, 8, p. 72, l. 26. —  
*Vide* van-Swieten, t. j, p. 463, 655,  
t. iij, p. 680; t. iv, p. 120, 209.

APHOR. XXVIII. <sup>1</sup> Natur. Puer.  
xvij, 4, 5, 6; xix, 1. =<sup>2</sup> Cels. iv,  
24, p. 237, l. 20. — *Vide* van-Swieten,  
t. iv, p. 255.

APHOR. XXIX. V. Epid. xxxij, 5, 6.  
— VI. Epid. viij, 98, ad 106. — VII.  
Epid. xlix, 12. — I. Morb. Mul. xij, 6,  
13. =<sup>2</sup> Senec. Ep. xcv. =<sup>2</sup> Cels. iv,  
24, p. 237, l. 22. — *Vide* van-Swieten,  
t. iv, p. 254.

APHOR. XXX. Coac. iij, 395. =  
<sup>2</sup> Cels. iv, 24, p. 237, l. 20. — *Vide*  
Ruſſel, œconom. Naturæ in Glandul.

— *Vide* van-Swieten, t. iv, pag. 254.

APHOR. XXXI. Aph. vij, 46. — II. Epid. vj, 26. =<sup>a</sup> Cels. vj, 6, p. 348, l. 10.

Prout à causis contrariis possunt oriri.  
Lege hîc notas Cl. de Villebrune.

APHOR. XXXII. <sup>1</sup> Præcept. xij, 1, ad 5. — Coac. ij, 147. — Verat. us. j, 12. — *Vide* Commentatores in hunc Aphorismum non satis experientiæ consonum.

APHOR. XXXIII. *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 13.

APHOR. XXXIV. II. Epid. v, 40. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 553.

APHOR. XXXV. Aph. vij, 47. — II. Prædict. xj, 1, 16. — II. Epid. v, 28. =<sup>a</sup> Cels. ij, 8, p. 72, l. 25. — *Vide* Galenum in hunc Aphorismum. *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 177.

APHOR. XXXVI. Aph. vij, 48.



De delectu venarum multi scripsère ,  
pauci consentiunt.

APHOR. XXXVII. Aph. vij, 49. =  
<sup>a</sup> Cels. iv, 4, p. 196, l. 18; pag. 197,  
l. 14.

APHOR. XXXVIII. <sup>1</sup> II. Prædict.  
xviiij, 5, 9; xxj, 5. — II. Morb. Mul.  
xxiiij, 25. — *Vide* van-Swieten, t. j, p.  
795, 802, 821, 828.

APHOR. XXXIX. *Vide* van-Swiet.  
t. j, p. 342; t. ij, p. 242, 320; t. iiij, p. 441.

Quod plenitudinem spectat , veteres  
ad eam retulère , sub fluxionis nomine ,  
varia irritationis genera , ut eos accuratè  
legenti satis patebit.

APHOR. XL. Aph. iv, 73; vij, 52.  
— Coac. 3, 272. = <sup>a</sup> Cels. ij, 8, p.  
70, l. 3; iiij, 10, p. 139, l. 17.

Scilicet à stagnantibus orta humori-  
bus circa hypochondria gravitas, et natus  
ab infarctu dolor , novâ vi motûs circu-  
laris per febrem additâ, solvuntur.

APHOR. XLI. Coac. ij, 238, 239.  
— II. Morb. xlv, 14. — III. Morb.  
xxvij, 1. — *Vide* van-Swieten, t. iij,  
p. 667.

APHOR. XLII. Aph. iv, 64. — Coac.  
ij, 223, 225, ad 229. =<sup>a</sup> Cels. ij, 8,  
p. 74, l. 22. — *Vide* van-Swieten, t. iij,  
p. 139.

APHOR. XLIII. Aph. vj, 48; vij, 76.  
— Coac. iij, 295, 296. =<sup>1</sup> I. Morb.  
iij, 27. =<sup>2</sup> Coac. iij, 275. — Affect.  
xxj, 23; xxiiij, 3; xxviiij, 1. =<sup>a</sup> Cels.  
ij, 8, pag. 74, l. 24. — *Vide* van-Swie-  
ten, t. iij, p. 155.

Rupta esse vasa lienis, ipsumque cor-  
ruptum dysenteria talis indicat. Alioquin  
Aph. 48, bona dicitur, si ex naturæ vi  
enata, motu vasis addito, infarctum lie-  
nis tollere sit idonea.

APHOR. XLIV. Judicat. xij, 2. —  
Coac. iij, 314; v, 75, 87. =<sup>a</sup> Cels. ij,  
8, p. 70, l. 7; ij, 8, p. 74, l. 28. —  
*Vide* van-Swieten, t. iij, p. 230.

IN SECTIONEM VI. 241

APHOR. XLV. Fractur. xxxvj, 2.  
= <sup>1</sup> Ulcer. v, 4. — *Vide* van-Swieten,  
t. j, p. 311, 875.

APHOR. XLVI. <sup>1</sup> Articul. xxxvij, 1,  
4, 5, 6; xxxviii, 4, 5. — Vectiar, xxj,  
6. — *Vide* Ballonium. Cons. 51, p. 204.

APHOR. XLVII. Aph. vij, 53.

Vere rarescunt humores, motus in-  
tenditur, liquescunt spissiora, canali-  
bus libertas inducitur.

APHOR. XLVIII. Aph. vj, 43. —  
Coac. iij, 295. — I. Morb. vj, 7. =  
<sup>a</sup> Cels. ij, 8, p. 70, l. 1. — *Vide* van-  
Swieten, t. iij, p. 140, 155.

APHOR. XLIX. Judicat. vj, 3. = <sup>a</sup>  
Cels. iv, 24, p. 240, l. 1. — *Vide* van-  
Swieten, t. iv, p. 280.

APHOR. L. II. Prædict. xxij, 12, 16;  
xxiij, 5, ad 11. — Coac. iij, 371, 383,  
384. — III. Morb. j, 3, 9. = <sup>c</sup> Cels. v.  
26, p. 296. l. 14. — *Vide* van-Swieten,  
t. j, p. 395.

Hoc et in capitis vulneribus, aut commotionibus experientia declarat.

APHOR. LI. Judicat. xij, 4, 5, 6. — Coac. ij, 6; iij, 320 ad 323. — II. Morb. vj, 1, 2, 3, 4, 7; xxj, 2 ad 12. — III. Morb. viij, 2, 3. =<sup>1</sup> I. Prædic. x, 13; xij, 8. =<sup>a</sup> Cels. ij, 8, p. 72, l. 14.

APHOR. LII. Prænot. iij, 1. — I. Prædict. xj, 2. — Coac. ij, 124. =<sup>a</sup> Cels. ij, 6, pag. 54, l. 20; ij, 8, pag. 72, l. 18.

APHOR. LIII. Coac. j, 141. =<sup>a</sup> Cels. iij, 18, p. 154, l. 32. — *Vide van-Swieten*, t. ij, p. 294, 549.

APHOR. LIV. Oppressum scilicet thoracem, languentem, aut impeditum per vasa pulmonalia sanguinis circuitum arguunt luctuosa suspiria. — *Vide van-Swieten*, t. ij, p. 391.

APHOR. LV. Aph. iij, 20. =<sup>a</sup> Cels. ij, 1, pag. 43, l. 28; iv, 24, p. 238, l. 3. — *Vide van-Swieten*, t. iv, p. 253.

APHOR. LVI. <sup>1</sup> Aph. vij, 40. = <sup>2</sup> Vict. Acut. xlv, 3. — II. Prædict. xij, 3. = <sup>3</sup> Coac. iij, 316, 317. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 275, 481, 496, 507.

APHOR. LVII. Aph. iij, 31. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 276, 496.

APHOR. LVIII. Coac. iij, 378. — I. Morb. iij, 36.

Distinctionem adhibe ex van Swieten, t. j, p. 484.

APHOR. LIX. *Vide* van-Swieten, t. j, p. 335, 550; t. v, p. 618, 630.

APHOR. LX. <sup>1</sup> Glandul. x, 6, 7, 8. = <sup>2</sup> I. Morb. iij, 16. — Int. Affect. lvij, 2. = <sup>3</sup> Aër. Aq. Loc. xlvij, 5. — Affect. xxx, 12. = <sup>4</sup> Cels. iv, 23, p. 236, l. 19. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 335; t. v, p. 630.

De capsulæ ligamentosæ infarctu et tumore indè exorto res intelligenda est.



Τ Μ Η Μ Α Ἐ Β Δ Ο Μ Ο Ν .

ἀ. ἘΝ τοῖσιν ὀξέσι νοσήμασι ψύ-  
ξις <sup>α</sup> ἀκρωτηρίων , κακόν .

β'. Ἐπὶ ὀσέω νοσήοντι σὰρξ πελι-  
δνή , κακόν .

γ'. Ἐπὶ ἐμέτω <sup>α</sup> λυγξ καὶ ὀφθαλμοὶ  
ἐρυθροὶ , κακόν .

δ'. Ἐπὶ ἰδρῶτι <sup>α</sup> φρίκη , ἔχρησόν .

ε'. Ἐπὶ μανίῃ δυσεντερίῃ , ἢ ὕδρωψ ,  
ἢ ἔκτασις , ἀγαθόν .

ς'. Ἐπὶ νέσῳ πολυχρονίῃ , ἀπσι-  
τίῃ <sup>α</sup> καὶ ἀκρητοὶ <sup>β</sup> ὑποχωρήσεις , κα-  
κόν .

ζ'. Ἐκ πολυποσίης ῥιγθ εὐψα-  
φροσύνη , κακόν .

η'. Ἀπὸ φύμαθ εἴσω ῥήξιθ ἔκλυ-  
σις , ἐμεθ , καὶ λειποψυχίη γίγνεθ .

S E C T I O S E P T I M A.

1. **I**N morbis acutis <sup>a</sup> extremarum partium frigus, malum.
2. Ex osse ægrotante caro livida, malum.
3. A vomitu singultus <sup>a</sup>, et oculi rubri, malum.
4. A sudore <sup>a</sup> horror, non bonum.
5. Ab insaniâ dysenteria, aut hydrops, aut exstasis, bonum.
6. In morbo diuturno appetitus prostratus, <sup>a</sup> <sup>1</sup> et meracæ <sup>b</sup> dejectiones, malum.
7. A multo potu rigor, et delirium, malum.
8. A tumoris intus ruptione, exsolutio, vomitus, et animi deliquium fit.

9. A sanguinis fluxu <sup>a</sup> delirium, aut etiam convulsio, malum.

10. Ab ileo vomitus, aut <sup>a</sup> singultus, aut convulsio, aut delirium, malum.

11. A pleuritide <sup>a</sup> peripneumonia, malum.

12. A peripneumoniâ phrenitis, malum.

13. Ab ardoribus vehementibus <sup>a</sup> convulsio, aut tetanus, malum.

14. A plagâ <sup>a</sup> in caput, stupor, aut delirium, malum.

15. A sanguinis sputo, puris sputum, malum.

16. <sup>1</sup> A puris sputo, tabes, et fluxus, malum. <sup>2</sup> Postquam verò sputum <sup>a</sup> retinetur, moriuntur.

17. Ab hepatis inflammatione <sup>a</sup> singultus, malum.



θ'. Ἐπὶ αἵματι<sup>⊙</sup> ρύσει<sup>α</sup> ὠχραφρο-  
σύνη, ἢ ἔσπασμὸς, κακόν.

ι'. Ἐπὶ εἰλεαί<sup>⊙</sup> ἔμελι<sup>⊙</sup>,<sup>α</sup> ἢ λυγξ,  
ἢ σπασμὸς, ἢ ὠχραφροσύνη, κα-  
κόν.

ια'. Ἐπὶ πλυσίτιδι<sup>α</sup> ὠειπιδυμο-  
νίη, κακόν.

ιβ'. Ἐπὶ ὠειπιδυμονίῃ φρενίτις,  
κακόν.

ιγ'. Ἐπὶ καύμασιν ἰχυροῖσι<sup>α</sup> σπα-  
σμὸς, ἢ τέταν<sup>⊙</sup>, κακόν.

ιδ'. Ἐπὶ πληγῇ<sup>α</sup> ἐς τὴν κεφαλὴν  
ἔκπληξις, ἢ ὠχραφροσύνη, κακόν.

ιε'. Ἐπὶ αἵματι<sup>⊙</sup> πτύσει<sup>α</sup> πύε πύ-  
σις, κακόν.

ισ'<sup>1</sup> Ἐπὶ πύε πτύσει φθίσις καὶ  
ρύσις, κακόν.<sup>2</sup> Ἐπὴν ᾗ τὸ πτύελον<sup>α</sup>  
ἴχη<sup>⊙</sup>, ἀποθνήσκουσιν.

ιζ'. Ἐπὶ φλεγμονῇ<sup>⊙</sup> ἥπατι<sup>⊙</sup><sup>α</sup> λυγξ,  
κακόν.

ιή. Ἐπὶ ἀγρυπνίῃ σπασμὸς <sup>α</sup> ἢ  
 ψαφροσύνη, κακόν.

ιβ. Ἐπὶ ὀσέεσσι ψιλώσει ἐρυσίπτελας  
 (κακόν).

ιγ. Ἐπὶ ἐρυσιπέλασι Σηπεδῶν, ἢ  
 ἐκπύησις (κακόν).

ιδ. Ἐπὶ ἰχυρῶσι Σφυγμῶσι ἐν τοῖσιν  
 ἔλκεσιν <sup>α</sup> αἰμορραγίῃ, (κακόν).

ιε. Ἐπὶ ὀδύνη πολυχρονίῃ τῇ πρὸς  
 τὴν κοιλίαν, ἐκπύησις, (κακόν).

ις. Ἐπὶ ἀκρήτῳ ὑπεχωρήσει <sup>α</sup> δυ-  
 σεντηρίῃ, (κακόν).

ιζ. Ἐπὶ ὀσέεσσι Διακοπῇ ψαφρο-  
 σύνη, ἢ κενεὸν λάβη.

ιη. Ἐκ Φαρμακοποσίης Σπασμὸς,  
 θανατῶδες.

ιθ. Ἐπὶ ὀδύνη ἰχυρῇ τῇ πρὸς  
 τὴν κοιλίαν ἀκρωτηρίων <sup>α</sup> ψύξις,  
 κακόν.

S E C T I O VII. 249

18. A vigiliâ convulsio , aut delirium , malum.

19. Ab ossis denudatione erysipelas , ( malum ).

20. Ab erysipelate putredo , aut suppuratio , ( malum ).

21. A forti pulsu in ulceribus , sanguinis <sup>a</sup> eruptio , ( malum ).

22. A dolore diuturno partium circa ventrem , suppuratio , ( malum ).

23. A meracâ dejectione <sup>a</sup> dysenteria , ( malum ).

24. Ab osse percisso delirium , si in vacuum penetraverit.

25. A purgantis potione convulsio , lethale.

26. A <sup>1</sup> dolore vehementi partium circa ventrem , extremarum <sup>a</sup> frigus , malum.

27. Mulieri in utero gerenti, tenesmus superveniens, abortire facit.

28. Quodcunque os, aut cartilago, aut nervus in corpore dissectus fuerit, neque augetur, neque coalescit.

19. Si à leucophlegmatiâ detento vehemens diarrhœa <sup>a</sup> superveniat, morbum solvit.

30. Quibus spumosæ egestionis in alvi profluviis, <sup>1</sup> his de capite pituita defluit.

31. Quibus febricitantibus, <sup>1</sup> in urinis subsidentiae fiunt crassiori farinæ similes, longam infirmitatem significat.

32. Quibus autem biliosæ <sup>a</sup> subsidentiae, ab initio verò tenues, acutum morbum significat.

κζ'. Γυνακί εν γαστρί έχόση τει-  
νεσμός επιγλυόμυϑ, κληρωσση ποιέει.

κη'. Ο, τι αν όσέον, ή χόνδρϑ, ή  
νεϋρον άποκοπη εν τω Γώματι, έτε  
άυξε), έτε ζυμφύε).

κθ'. Ην υπό λυκϑ φλέγματι έχο-  
μύω άφάρροια <sup>α</sup> επιγίνη) ίχυρή, λύει  
την νϑσον.

λ'. Οκόσοισιν αφρώδεα τά άφχω-  
ρήματα εν τησι άφρροίησι, τελείοισιν  
δπό τ κεφαλήσ φλέγμα κατάρρει.

λά'. Οκόσοισι πυρέσσιν <sup>1</sup> εν τοΐσιν  
έροισι κριμνώδεσ αι ύποσάσιεσ γί-  
γνον), μακρήν την άρρωσίην ζημά-  
νει.

λδ'. Οκόσοισι η χολώδεεσ <sup>α</sup> αι ύπο-  
σάσιεσ, άνωθεν η λεπταί, όξειλω άρρω-  
σίλω ζημάνει.

λγ'. Ὀκόσοισι ἢ <sup>1</sup> διεσηκότα τὰ ἔ-  
ρα γίνε<sup>2</sup>), τετέοισι ταρραχὴ ἰχυρὴ ἐν  
τῷ Σώματί ὄσιν.

λδ'. Ὀκόσοισι ἢ ὅπῃ τοῖσιν ἔργισιν  
ἐπίσκηλα <sup>a</sup> πομφόλυγες , νεφρικήα  
Σημάνεσι , καὶ μακρὴν τὴν ἀρρώστην  
ἔσεαθ.

λέ. Ὀκόσοισι ἢ λιπαρὴ ἢ ὀπίσασις  
καὶ ἀθρόη , τετέοισι νεφρικήα καὶ ὀξεία  
Σημάνει.

λς'. Ὀκόσοισι ἢ , νεφρικόισιν ἔσσι ,  
τὰ προειρημμένα ξυμδάνει σημεῖα , πό-  
νοι τε πρὸς τὰς μύας τὰς ῥαχιαίας  
γίνων<sup>3</sup>), ἢν μὲν πρὸς τὰς ἔξω τόπων  
γένων<sup>4</sup>), δ' ὀπσημα προσδέχῃ ἐσόμνον  
ἔξω· ἢν ἢ μᾶλλον οἱ πόνοι πρὸς τὰς  
εἴσω τόπων γίνων<sup>5</sup>), καὶ τὸ δ' ὀπσημα  
προσδέχῃ ἐσόμνον μᾶλλον εἴσω.

λς'. Ὀκόσοι αἴμα <sup>a</sup> ἐμέσιν , ἢν μὲν

S E C T I O VII. 253

33. Quibus autem urinæ <sup>1</sup> divulsæ fiunt, iis vehemens est in corpore turbatio.

34. Quibus verò, in urinis bullæ superstant, <sup>a</sup> renum affectiones significant, & longam fore invaletudinem.

35. Quibus autem pingue est et confertum quod supernatat, his *affectiones* nephriticas, et acutas significat.

36. Quibus verò, nephriticis existentibus, prædicta signa accidunt, et dolores circa musculos spinales fiunt, si quidem ad loca exteriora fiunt, abscessum expecta futurum extrorsum. Si verò dolores fiant magis ad interna loca, etiam abscessum magis introrsum fore expecta.

37. Qui sanguinem <sup>a</sup> vomunt, si

quidem sine febre, salutare : si verò cum <sup>b</sup> febre, malum. Curandum autem refrigerantibus, et astringentibus.

38. Destillationes in ventrem supernum, in viginti diebus suppurantur.

39. Si *quis* sanguinem et grumos mingat, et stranguriam habeat, et dolor incidat ad perinæum, et inum ventrem, et pectinem, *partes* circa vesicam laborare significat.

40. Si lingua ex improvise impotens fiat, aut aliqua corporis pars siderata, <sup>1</sup> melancholicum hoc ipsum fit.

41. Si senioribus nimum purgatis, singultus superveniat, non bonum.

42. Si febris, *quæ non est à bile*, detineat, <sup>a</sup> aquâ multâ, et calidâ in caput affusâ, febris solutio fit.



άνευ πυρετῶ , (ωλήριον· εἰ ἢ ξὺν ὁ  
 πυρετῶ , κακόν. Φεραπύειν ἢ τοῖσι  
 ψυχλικοῖσι, καὶ τοῖσι συπλικοῖσι.

λη'. Καλιάρροι ἐς τὴν ἀνω κοιλίην  
 ἐκπυῶν) ἐν ἡμέρησιν εἴκοσιν.

λθ'. Ἦν ἐρέη αἷμα ἐ φρόμβους, καὶ  
 φραγφρίην ἔχη, καὶ ὀδύνη ἐμπώπη  
 ἐς τὸ πείναιον καὶ τὸ ὑπογάστριον, ἐ  
 τ' κτένα, τὰ πρὸ τὴν κύστιν νοσέειν  
 ζημαίνει.

μα'. Ἦν ἡ γλῶσσα ἐξάφνης ἀκρατῆς  
 γένη), ἢ ἀποπληκίον τι εἶ (ἀμαίθη,  
 ἢ μελαγχολικὸν τὸ τοιοῦτο γίγνε).

μαά'. Ἦν ὑπερκαθαρμῶν τῶν πρεσ-  
 βυτέρων, λυξὶς ἐπιγένη), ὅσα ἀγαθόν.

μαβ'. Ἦν πυρετὸς μὴ ἀπὸ χολῆς ἔχη,  
 ὑδαίθη πολλῶ καὶ θερμῶ ἢ καλαχεο-  
 μῶς καὶ τ' κεφαλῆς, λύσις εἶ πυρετῶ  
 γίνε).

μγ'. Γυνή ἀμφιδέξις ἔ γίνεταί.

μδ'. Ὀκόσοι ἔρευτοι κάονταί, ἢ τέμνονταί, ἢν μὲν τὸ πύον καθαρὸν ῥυῆ ἔ λευκόν, ᾤειγίγονταί. <sup>1</sup> ἢν ᾗ ὕφαιμον, κὲ βορβοράδες, ἔ δυσῶδες <sup>2</sup>, ἀπόλλυνται.

μέ'. Ὀκόσοι τὸ ἥπαρ <sup>a</sup> ἀλέπυον κάονταί (ἢ τέμνονταί) ἢν μὲν τὸ πύον καθαρὸν ῥυῆ κὲ λευκόν, ᾤειγίγονται. ἐν χιτῶνι γὰρ τὸ πύον τετέοισιν ὄσιν. <sup>1</sup> ἢν δὲ οἶον ἀμόρφη <sup>b</sup> ῥυῆ, ἀπόλλυνται.

μς. Εἰς ὀδύνας ὀφθαλμῶν, ἀκρήλον ποτίσας, καὶ λέσας πολλὰ θερμά, φλεβοτόμει.

μζ'. Ὑδρωπιῶντα ἢν <sup>a</sup> βήξ ἔχη, ἀνέλπιτος ὄσι.

μη'. Στραγγίτην κὲ δυσσρίην θά-

43. Mulier ambidextra non fit.

44. Qui suppurati uruntur, aut secantur, si quidem purum effluat pus et album, evadunt: <sup>1</sup> si verò subcruentum, et cænosum, ac graveolens, pereunt.

45. Qui *ad* hepar <sup>a</sup> suppuratum uruntur (aut secantur) si quidem purum effluat pus et album, superstites evadunt: ipsis enim pus est in tunicâ: <sup>1</sup> si verò effluat velut <sup>b</sup> amurca, pereunt.

46. In doloribus oculorum, postquam merum bibendum dederis, et multâ calidâ laveris, venam secato.

47. Hydropicum si <sup>a</sup> tussis habeat, desperatus est.

48. Urinæ stillicidium, et urinæ

difficultatem vini potus, et venæ sectio solvit. Secundæ verò internæ (venæ).

49. Ab angînâ detento tumor et rubor in pectore superveniens, bonum : foràs enim vertitur morbus.

50. Quibus cerebrum <sup>1</sup> sphacelo fuerit affectum, in tribus diebus pereunt : si verò hos effugerint, sani fiunt.

51. <sup>1</sup> Sternutatio fit ex capite, percalefacto cerebro, aut perhumectato, *quod est* in capite, vacuo. Aër enim qui intus est supra modum (i. e. *vi*) foràs effunditur. <sup>2</sup> Strepit autem, quia per angustum ipsi est transitus.

52. Quibus hepar circumcirca dolet, his febris superveniens, dolorem solvit.

ρηξίς ἐ φλεβοτομίῃ λύει. τέμνειν ἢ τὰς εἴσω (φλέβας).

μβ'. Ὑπὸ κυνάρχης ἐχορμῶν οἴδημα κὶ ἐρύθημα ἐν τῷ εἴθει ἐπιγλυόμενον, ἀγαθόν· ἔξω γὼ τρέπειται τὸ νόσημα.

ν'. Ὀκίσοισιν ἀν' ἰ (φακελιωτῆ ὁ ἐγκέφαλος, ἐν τρισὶν ἡμέρησιν ἀπόλλυται· ἢν ἢ ταύτας ἀφαύγασιν, ὑγιέες γίνονται).

νά'. ἰ Πταρμὸς γίνετ' ἐκ τῆ κεφαλῆς, ἀθερμασμομῶν ἔ' ἐγκεφάλου, ἢ διυγρασμομῶν ἔ' ἐν τῇ κεφαλῇ κενῶ. ὑπερχεῖτ' γὼ ὁ ἀῆρ ὁ ἐνεῶν ἔξω. ἰ ψοφεῖ ἢ, ὅτι ἀφ' αὐτῶν ἢ διέξοδ' αὐτῶν ἔσιν.

νε'. Ὀκίσοισιν ἢ παρ' αἰωδυνῶν, τετάρτοις πυρετὸς ἐπιγενόμενον λύει τὴν ὀδύνην.

νγ'. Ὀκόσοισι ξυμφέρεαι αἷμα ἀφαρ-  
ρεῖαζ δ' ἀπὸ τῶ φλεβῶν , τελέεσ χρη ἤρ<sup>θ</sup>  
φλεβοιορρεῖαζ.

νδ'. Ὀκόσοισι μελαζὺ τῶ φρενῶν κῆ  
τῶ γαστρὸσ φλέγμα δ' ἀποκλείεται , καὶ  
ὀδύνῳ παρέχει , ὅσκι ἔχον διέξοδον  
ἐσ ἐδετέρῳ τῶ κοιλιῶν , τετέοισι κῆ  
τὰσ φλέβασ ἐσ τὴν κύσιν τραπένι<sup>θ</sup> τῶ  
φλέγμαι<sup>θ</sup> , λύσισ γίννε<sup>ι</sup> τῶ νέσσ.

νε'. Ὀκόσοισιν ἂν τὸ ἤπαρ ὑδαί<sup>θ</sup>  
πλησθὲν ἐσ τὸ ἐπίπλοον ραγῆ , τε-  
τέοισιν ἢ κοιλίῃ ὑδαί<sup>θ</sup> ἐμπωλα<sup>ι</sup> ,  
εἰ δ' ἀπεθνήσκουσιν.

νς'. Ἀλύκῳ , χάσμῳ , φρίκῳ ,  
οἶν<sup>θ</sup> ἴσ<sup>θ</sup> ἴσῳ πινόμῳ λύει.

νζ'. Ὀκόσοισιν ἐν τῇ ἐρήθρη φύμα<sup>α</sup>  
γίνετα , τετέοισι διαπυήσανι<sup>θ</sup> καὶ  
ἐκραγένι<sup>θ</sup> , λύε<sup>ι</sup> ὁ πόν<sup>θ</sup>.

53. Quibus sanguinem de venis auferre conducit, his vere venam secare oportet.

54. Quibus inter septum transversum, et ventrem pituita excluditur, et dolorem exhibet, in neutrum ventrem habens transitum, his per venas in vesicam pituitâ versâ, morbi solutio fit.

55. Quibus hepar aquâ repletum ad omentum eruperit, his venter aquâ impletur, et moriuntur.

56. Anxietatem, oscitationem, horrorem <sup>1</sup> vinum par pari aquâ potum solvit.

57. Quibus in urinariâ fistulâ tuberculum <sup>2</sup> fit, his suppurato eo et perrupto, solvitur dolor.

58. Quibus cerebrum concussum fuerit ab aliquâ causâ, *necesse est eos statim mutos fieri.*

(Si à febre detento collum invertatur, et deglutire non possit, tumore non existente in collo, lethale).

59. Corporibus humiditas carnes habentibus, famem inducere oportet: <sup>1</sup> *fames enim siccat corpora.*

60. Ubi in toto corpore mutationes, et corpus perfrigeratur, et rursus calefit, aut calor alius ex alio permutatur, longitudinem morbi significat.

61. <sup>1</sup> *Sudor multus, calidus, aut frigidus, semper fluens, <sup>2</sup> humidi redundantiam adesse significat. <sup>3</sup> Educere igitur oportet, robusto quidem, supernè: debili verò, infernè.*



νή. Ὀκόσοισι δ' ἂν ὁ ἐγκέφαλος  
σειοῖτο ὑπό τινος προφάσιτος, ἀνάγκη  
ἀφώνως γλυεῖται ὡς ακρήμα.

(Ἦν ὑπὸ πυρετῶ ἐχομῶν ὁ τρά-  
χηλος ὀπιστραφῆ, καὶ καταπίνειν μὴ  
δύνη), οἰδήματι μὴ ἐόντι ἐν τῷ  
τραχήλῳ, θανάσιμον).

νθ'. Τοῖσι ζώμασι τοῖσιν ὑγρὰς τὰς  
ζάρκας ἔχουσι, δεῖ λιμὸν ἐμποίειν.  
1 λιμὸς γὰρ ξηραίνει τὰ ζώματα.

ξ'. Ὅκως ἂν ἐν ὅλῳ τῷ ζώματι  
μελαδολαί, καὶ τὸ ζῶμα καταψύχῃ  
καὶ πάλιν θερμαίνῃται, ἢ χρῶμα ἕτερον  
ἔξ ἑτέρου μελαδολαί, μῆκος νέου  
σημαίνει.

ξά. 1 Ἰδρῶς πολὺς, θερμὸς ἢ ψυ-  
χρὸς, ῥέων αἰεὶ, σημαίνει 2 ἔχειν  
πλησμονὴν ὑγρῶ. 3 ἀπάγειν ἐν χρῆ, τῷ  
μὲν ἰσχυρῶ, ἀνωθεν τῷ δὲ ἀσθενεῖ,  
κάτωθεν.

ξδ'. Ὅτι πυρελοὶ οἱ μὴ ἀλαλείπων-  
τες, ἢν ἰχυρότεροι ἀλὰ τρίτης γέ-  
νον), ἔπικίνδυνοι. ὅτῳ δ' ἂν τρόπῳ  
ἀλαλείῳσι, ζημαίνει, ὅτι ἀκίνδυνοι.

ξε'. Ὅκόσοισι πυρελοὶ μακροὶ, τρι-  
τέοισιν, ἢ φύμαλα, ἢ ἐς τὰ ἄρθρα πόνοι  
ἐγγίγνον).

ξδ'. Ὅκόσοισι φύμαλα μακρὰ, ἢ  
ἐς τὰ ἄρθρα πόνοι ἐκ πυρετῶν γί-  
γνον), ἔτοι σιτίοισι πλείοσι χρέον).

ξε'. Ἦν τις τὰ πυρέσσοντι τροφήν  
διδῶ, τὰ μὲν ὑγιαίνοντι, ἰχύς· τὰ δ' ἔ  
κάμνοντι, νῆσθ.

ξε'. Τὰ ἀλὰ τῆς κύσιθ ἀσχω-  
ρέοντα ὀρεῖν δεῖ, εἰ οἷα τοῖς ὑγιαίνου-  
σιν ὑποχωρέε). τὰ ἥκιστα ἔν ὅμοια  
τριτέοισι, ταῦτα νοσηδέτερα. τὰ δ'  
ὅμοια τοῖσιν ὑγιαίνουσιν, ἥκιστα νοσερά.

ξζ'. Καὶ οἷσι τὰ ὑποχωρήμαλα,

S E C T I O VII. 265

62. Febres non intermittentes , si per tertiam diem vehementiores fiant, periculosæ. Quocunque autem modo intermittant, significat periculi esse expertes.

63. Quibus febres longæ sunt , his aut tubercula , aut ad articulos dolores fiunt.

64. Quibus tubercula diutina , aut ad articulos dolores ex febribus fiunt, hi cibus utuntur copiosioribus.

65. Si quis febricitanti cibum det, convalescenti quidem robur; ægro-  
tanti verò morbus *fit*.

66. Per vesicam prodeuntia inspicere oportet, an *sint* qualia sanis prodeunt. Quæ igitur minimè his similia, eo morbosiora; sanis verò similia, minimè morbosa.

67. Et quibus <sup>1</sup> egestiones , si

Y y

stare permiseris , et non moveris , <sup>2</sup> subsident veluti ramenta ; et si pauca fuerint , parvus fit morbus : si verò multa , magnus ; his confert alvum infernè purgari. <sup>3</sup> Si autem non purgatâ alvo sorbitiones dederis , quantò plures dederis , eò magis lædes.

68. Quæ cruda deorsùm secedunt , ab atrâ sunt bile : si plura , major ; si pauciora , minor *est* morbus.

69. Exscreationes in febribus non intermittentibus lividæ , et cruentæ , et biliosæ , et graveolentes , omnes malæ *sunt*. At ritè secedentes , bonæ. Sic etiam per alvum , et vesicam , et ubicunque quid secedens restiterit non purgatum , malum.

70. Corpora oportet , ubi quis purgare vult , facilè fluentia reddere. <sup>1</sup>

ἢν ἑάσης σῆναι καὶ μὴ κινήσης, <sup>2</sup> ὑφί-  
 σαται οἷον ξύσματτα· καὶ, ἢν ὀλίγα ἦ,  
 ὀλίγη ἢ νῆσθ (γίγνεῖ)· ἢν δὲ πολλὰ,  
 πολλή τετέοισι ξυμφέρεει ὑποκαθῆραι  
 τὴν κοιλίαν. <sup>3</sup> ἢν δὲ μὴ καθαρὴν ποιή-  
 σαις διδῶς τὰ ροφήματα, ὁπόσω ἂν  
 πλείω διδῶς, μᾶλλον βλάψεις.

ξυ. Ὅκοσα ἂν κάτω ὤμα Διχα-  
 ρεῖη, ἀπὸ χολῆς μελάνης ὅσιν· ἢν πλείω,  
 πλείων· ἢν ἐλάσσω, ἐλάσων ἢ νῆσθ.

ξβ'. Αἱ ἀποχρέμψεις, αἱ ἐν τοῖσι  
 πυρετοῖσι τοῖσι μὴ Διλείπασιν, καὶ  
 πελιδναί, ἐ αἵματώδεις, καὶ χολώ-  
 δεις, ἐ δυσώδεις, πᾶσαι κακαί. ἀπο-  
 χωρέσασθ δὲ καλῶς, ἀγαθαί· καὶ κατὰ  
 κοιλίαν, καὶ κύσιν, καὶ ὅκασ ἂν τι ἀπο-  
 χωρέον σῆ μὴ κεκαθαρημένον, κακόν.

ό. Τὰ Γάματα χρῆ, ὅκασ τῖς  
 βέλεῖ) " καθαίρεαθ, εὔροα ποίεειν.

κῆν μὲν ἄνω βέλη) εὔροα ποίειν ,  
 εἴσω τὴν κοιλίην · ἢν δὲ κάτω , ὑγρῆ-  
 ναί .

οά. Ὑπὸν⊕ , ἀγρυπνίη , ἀμφοτέρω  
 μάλλον ἔμετρις γινόμενα , νῆσ⊕ .

οδ'. Ἐν τοῖσι μὲν Δαλείωσι πυ-  
 ρελοῖσιν , ἢν τὰ μὲν ἔξω <sup>b</sup> ψυχρὰ ἦ ,  
 τὰ <sup>γ</sup> ἔσω καίη) , καὶ δίψαν ἔχη ,  
 θανάσιμον .

ογ'. Ἐν μὲν Δαλείωσι πυρετῶ  
 ἢν χεῖλ⊕ , ἢ ρίς , <sup>ι</sup> ἢ ὀφθαλμοί , ἢ  
 ὀφρὺς διασραφῆ , ἢν μὲν βλέψη , ἢν  
 μὲν ἀκὴ ἤδη ἀσθενὴς εἶν , ὅ , τι ἂν  
 τριέων γένη) , θανάσιμον .

οδ'. Ἐπὶ λευκῶ φλέγματι ὑδρωψ  
 ὀπιγίνε) .

οε'. Ἐπὶ διάρροίῃ <sup>a</sup> δυσεντερίῃ .

οε'. Ἐπὶ δυσεντερίῃ <sup>b</sup> λειεντερίῃ  
 (ὀπιγίνε) .

Et si quidem velit efficere facilè fluentia sursùm, alvum sistere : si verò deorsùm, humectare.

71. Somnus, vigilia, utraque modum excedentia, morbus.

72. In non intermittentibus febribus, si externa quidem b sint frigida, interna verò urantur, et sitim habeant, lethale.

73. In febre non intermittente, si labium, aut nasus, <sup>1</sup> aut oculus, aut supercilium distorqueatur, si non videat, si non audiat, jam debilis existens; quidquid horum fit, lethale.

74. Leucophlegmatix hydrops supervenit.

75. Ab alvi profluvio dysenteria.

76. A dysenteriâ <sup>a</sup> intestinorum lævitas (supervenit).

77. A sphacelo abscessus ossis.

78. A sanguinis vomitu tabes , et puris <sup>a</sup> purgatio sursùm.

( A tabe, fluxus ex capite. A fluxu, alvi profluvium. Ab alvi profluvio, inhibitio purgationis sursum. Ab inhibitione, mors).

( A sanguinis sputo, puris sputum, et fluxio. Postquam autem sputum inhibetur, moriuntur ).

79. Qualia etiam in his quæ per vesicam , et in his quæ per alvum *funt* egestionibus, <sup>a</sup> et in his quæ per carnes, et sicubi aliâ naturæ *viâ* corpus diffluat : si parum , parvus morbus fit ; si multum , magnus ; si admodùm multum , hoc ipsum lethale.





οζ' Ἐπὶ Ἐφακελισμῶ δ' ἄποσασι ὀσέεσ.  
 οή. Ἐπὶ αἵματι ἔμέτω φθόη, κὺ  
 ἔ<sup>α</sup> πύσ κάθαρσις ἄνω.

(Ἐπὶ φθόη ρεῦμα ἐκ τ' κεφαλήσ.  
 ἐπὶ τῶ ρεῦματι διάρροια. ἐπὶ διαρ-  
 ροίῃ χέσις τ' ἄνω καθάρσι. ἐπὶ τῇ  
 χέσει θανάι).

(Ἐπὶ αἵματι πτύσει τύσ πτύ-  
 σις, κὺ ρύσις. ἐπὴν ἔ σίαλον ἴχη),  
 δ' ἀπθνήσκουσιν).

ὀθ'. Ὀκοῖα ἐ ἐν τοῖσι κὺ τὴν κύσιν,  
 κὺ ἐν τοῖσι κὺ τὴν κοιλίῳ ὑπερχω-  
 ρήμασι, κὺ ἐν τοῖσι κὺ τὰς ζάρκας,  
 κὺ ἦν πε ἄλλη τ' φύσι ἐκδῶνῃ τὸ  
 ζῶμα ἦν ὀλίγον, ὀλίγη ἢ νῆσ γί-  
 γνε. ἦν ἔ πολὺ, πολλή. ἦν πάνυ  
 πολὺ, θανάσιμον τὸ τοῖστον.



---

 N O T Æ

I N

## SECTIONEM SEPTIMAM.

---

APHOR. I. Aph. vij, 26. — Prænot. xv, 9. — Coac. j, 165. — VI Epid. viij, 93. =<sup>1</sup> Aph. iv, 48. =<sup>2</sup> Cels. ij, 4, p. 51, l. 25; ij, 6, p. 55, l. 21.

APHOR. II. *Vide* van-Swieten, t. j, p. 861.

APHOR. III. Coac. iv, 20. =<sup>2</sup> Cels. ij, 4, p. 51, l. 27.

Prius signum ventriculo hærentis irritationis est; posterius sanguinis ad cerebrum nitentis. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 298.

APHOR. IV. I. Prædict. vij, 14, 15. =<sup>2</sup> Cels. ij, 4, pag. 51, l. 26.

IN SECTIONEM VII. 273

Sudor naturæ motus, horror morbi  
grassantis symptoma vinci naturam à  
morbo edocent.

APHOR. V. Aph. v, 21. — *Vide*  
van-Swieten, t. ij, p. 554; t. iij, p. 526.  
*Vide* Observationem cl. Mead. cap. de  
*insaniâ*, monit. et præcept. medica.

APHOR. VI. <sup>1</sup> Aph. vij, 23. =  
<sup>a</sup> Cels. ij, 4, p. 51, l. 29. = <sup>b</sup> Cels. ij,  
4, p. 53, l. 3. — *Vide* van-Swieten,  
t. ij, p. 345.

APHOR. VII. Aph. v, 5.

De vini potu rem intellige.

APHOR. VIII. Coac. ij, 236. —  
I. Morb. xij, 7. — *Vide* van-Swieten,  
t. j, p. 671.

APHOR. IX. Aph. v, 3. — Coac.  
iij, 57. = <sup>a</sup> Cels. ij, 8, p. 76, l. 12.

APHOR. X. Coac. iij, 303. = <sup>a</sup> Cels.  
ij, 8, p. 74, l. 20.

Rapi in inflammationis communionem ventriculi tunicas singultus et vomitus docent; cerebrum nervosque iisdem malis affici delirio et convulsione patet. — *Vide* van-Swieten, tom. ij, p. 243, 549.

APHOR. XI. Coac. iij, 172. — Affect. ix, 12. =<sup>a</sup> Cels. ij, 7, p. 64, l. 13.

Summum inflammationis gradum, motum sanguinis per vasa pulmonum præpeditum, quomodò peripneumonia pleuritidi superveniens indicet, *vide* apud van-Swieten, t. iij, p. 62.

APHOR. XII. *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 548.

APHOR. XIII. Aph. ij, 26. =<sup>a</sup> Cels. ij, 7, p. 64, l. 14.

Hujus Aphorismi veritatem observatione consecrarunt Bontius, Hans Sloane, Hillari, aliique ferventium regionum medici. In aëre inflammabili fac-

titio illicò tetano animalia corripuntur.

APHOR. XIV. Coac. ij, 8; iij, 371.  
— VII. Epid. xxx, 8; cap. Vuln. xv,  
I. =<sup>a</sup> Cels. ij, 7, pag. 64, l. 16. —  
*Vide* van-Swieten, t. j, p. 394.

APHOR. XV. Aph. vij, 16, 78.  
— Nat. Human. xxij, 1. — II. Prædict.  
xiv, 1, 3. — *Vide* van-Swieten, t. iv,  
p. 7, 70.

APHOR. XVI. Aph. vij, 15, 78. =  
<sup>1</sup> Glandul. x, 2, 3, 4. =<sup>2</sup> Coac. iij,  
257. — I. Morb. x, 17, 20; xj, 40.  
— Vict. Acut. vij, 6, 7, 8. =<sup>a</sup> Cels.  
ij, 8, p. 72, l. 5. — *Vide* van-Swieten,  
t. iv, p. 70.

Sive *ῥύσις* sit alvi profluvium, sive sit  
colliquescentis corporis marasmus, ut  
alii volunt.

APHOR. XVII. Aph. v, 48. =<sup>a</sup>  
Cels. ij, 7, p. 62, l. 3. — *Vide* van-  
Swieten, t. iij, p. 84.

APHOR. XVIII. <sup>a</sup> Cels. ij, 7, p. 64,

1, 17. — *Vide* van-Swieten, tom. ij, p. 531.

APHOR. XIX. Cap. Vuln. xxvij, 4.  
— *Vide* van-Swieten, t. j, p. 359.

APHOR. XXI. <sup>a</sup> Cels. ij, 7, p. 64,  
l. 18.

APHOR. XXII. Aph. vij, 26.

APHOR. XXIII. Aph. vij, 6. =  
<sup>a</sup> Cels. ij, 7, p. 64, l. 10.

Meraca ἀκριτος quæ alibi ειλικρινής  
sincera, id est, cruda, indigesta de-  
jectio, si in dysenteriam desinat, in-  
gentem in visceribus irritationem ena-  
tam et cruditati junctam designat. —  
*Vide* van-Swieten, t. ij, p. 345.

APHOR. XXIV. *Vide* van-Swieten,  
t. j, p. 394.

APHOR. XXV. Aph. v, 1.

APHOR. XXVI. <sup>1</sup> Aph. iv, 48, vij,

IN SECTIONEM VII. 277

22. =<sup>a</sup> Cels. ij, 8, pag. 68, l. 14.

Sive adsit febris lypiria, sive immineat gangræna, sive demùm præ doloris vehementiâ nervi constringantur. —  
*Vide* van-Swieten, t. iij, p. 186.

APHOR. XXVII. I. Morb. Mul. xlij, 4. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 220; t. iv, p. 444.

APHOR. XXVIII. Aph. vj, 19. —  
*Vide* van-Swieten, t. j, p. 513.

APHOR. XXIX. Flat. xvij, 8, 9. —  
Judicat. xj, 21. — Coac. iij, 285, 326. — I. Morb. vj, 7. — II. Morb. lxxix, 11, 12. — Int. Affect. xxij, 12. —  
=<sup>a</sup> Cels. ij, 8, p. 68, l. 14. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 346; t. iij, p. 286, 374; t. iv, p. 230.

Modò virium constantia, ægri euphoria morbi imminutionem indicent.

APHOR. XXX. Morb. Sac. vij, 28,

A a a

==<sup>1</sup> Coac. v, 13, 14. — *Vide van-Swieten*, t. ij, p. 338.

Scilicet adest vasis excernenda transmittentibus laxitas et atonia, hinc crudorum effluxus.

APHOR. XXXI. <sup>1</sup> Prænot. xj, 7. — Coac. ij, 199; x, 12, 64, 65. — *Vide Savonarolam de Urin.* pag. 700. Prosper. Alpin. de præagiendâ vitâ et morte, lib. vij, cap. 13.

APHOR. XXXII. Coac. v, 6, 8. — 1. Morb. xxvij, 28. — Vict. Acut. liv, 5. ==<sup>2</sup> Cel. ij, 5, p. 53, l. 26.

Acrem scilicet designant et valde biliosam materiam intus grassari, quæ inflammet vasa. *Vide Savonarolam de Urin.* p. 677, 679; undè ardentes urinæ vocantur, *ibidem*, p. 680.

APHOR. XXXIII. <sup>1</sup> Coac. v, 15, 16, 76. — IV. Epid. vj, 14, 19.

Crudissimæ sunt ex urinis, quæ non



IN SECTIONEM VII. 279

aggregatas, sed divulsas partes ferunt, eæ tamen omnia susdeque ferri significant, imò cruda coctionem affectare.

APHOR. XXXIV. <sup>a</sup> Cels. ij, 5, p. 53, l. 29. — II. 7, p. 60, l. 31.

Abrasâ scilicet mucilagine turgescunt.

APHOR. XXXV. Prænot. xij, 1, 2. — Coac. v, 43. — IV. Epid. vj, 12, 13.

Forsan ob vicinum renibus adipem, qui præ putredine indolem saponis insumit.

APHOR. XXXVI. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 242.

APHOR. XXXVII. Aph. iv, 25. — Caoc. iij, 238 ad 243. = <sup>a</sup> Cels. iv, 4, p. 203, l. 13, 21. = <sup>b</sup> Cels. ij, 6, p. 56, l. 15.

Aliquandò sanguis à vasis debilioribus ad salutem evomitur; sed rarò id

A a a ij

accidere fatendum est, & plerumque infido levamine, cùm aut infarctum per abdominalia vasa demonstret sanguinis vomitus, aut debilitatem saltem vasorum. — *Vide* van-Swieten, tom. iij, p. 123, 127.

APHOR. XXXVIII. Aph. vj, 20. — Loc. in Hom. xvij, 7. — I. Morb. xj, 2, 3.

APHOR. XXXIX. Aph. iv, 80.

APHOR. XL. <sup>1</sup> Aph vj, 23, 57. — II. Prædict. xvj, 12. — Coac. iij, 87, 88, 315, 317.

Sensus Hippocratis est, quasi melancholicus humor aliquandò apoplexiam possit inducere. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 252, 264.

APHOR. LI. Vid. Aph. v, 4. — *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 194.

Extinctâ scilicet vi vitali, quæ in senio debilis est, fit singultus.

APHOR. XLII. <sup>a</sup> Cels. iij, 14, p. 143, l. 26.

APHOR. XLIV. Aph. vj, 27; vij, 45. — Prænot. vij, 6; xix, 4. — II. Morb. xlv, 34, 35. =<sup>1</sup> Coac. iij, 217, 218, 269. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 647; t. iij, p. 56, 683.

APHOR. XLV. Aph. vij, 44. — Prænot. vij, 6. =<sup>1</sup> Coac. iij, 218, 274. =<sup>2</sup> Cels. ij, 8, p. 67, l. 3. =<sup>3</sup> 3. =<sup>b</sup> Cels. ij, 8, p. 71, l. 13. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 647, 674; t. iij, p. 106, 116, 117.

APHOR. XLVI. *Vide* Aph. vi, 31. — *Vide* notas Cl. de Villebrune.

APHOR. XLVII. Aph. vj, 35. — I. Prædict. xj, 1, 6. — II. Epid. v, 28. =<sup>2</sup> Cels. ij, 8; p. 72, l. 25. — *Vide* van-Swieten, t. iv, p. 177.

APHOR. XLVIII. Aph. vj, 36. — II. Epid. vj, 39.

Non ita intelligendus est Hippocrates, quasi eidem casui conveniat vini potio et venæ sectio. Sed cùm idem symptoma causis oppositis competat, opposita pariter adhibenda Medicina.

APHOR. XLIX. *Vide* Aph. 37. — Prænot. vij, 3; xxij, 14. — Coac. ij, 221; iij, 97, 102. — II. Morb. xxvj, 26; xxvij, 14. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 858.

APHOR. L. Coac. ij. — II. Morb. v, 2, 21; xx, 2, 8, 9, 10. = <sup>1</sup> VII. Epid. xxx, 7. — *Vide* van-Swieten, t. j, p. 398.

Quid de cerebri sphacelismo sentendum sit nemo pleniùs et meliùs exposuit Cl. de Villebrune in Aphor. xij, sect. iij.

APHOR. LI. <sup>1</sup> Prænot. xij, II. = <sup>2</sup> Princip. et Car. xix, I ad 4.

Fit sternutatio, vel convulsivè, vel à sensu ingrato in membranâ pituitariâ.

IN SECTIONEM VII. 283

APHOR. LII. Aph. vj, 40. — Coac. iij, 272.

APHOR. LIII. Aph. vj, 47.

APHOR. LIV.

Propositio Anatomiae repugnans de qualibet pituitae mucilaginosâ stagnatione intelligatur, seu vasis contenta sit, seu, ruptis vasis, sibi ipsi cavum molita fuerit.

APHOR. LV. Prænot viij, 6. — Coac. iij, 276, 278. — Affection. xxiiij, 3 ad 10. — Int. Affect. xxvj, 2.

An de hepate in hydatides converso loqui voluit Hippocrates?

APHOR. LVI. II. Epid. vj, 45. =  
<sup>1</sup> II. Morb. xxxviiij, 6. — Int. Affect. v, 14. — II. Morb. Mul. lxxxviiij, 2.

APHOR. LVII. *Vide* Aph. iv, 12. =  
<sup>a</sup> Cels. ij, 8, pag. 70, l. 22. —  
*Vide* van-Swieten, t. v, p. 428.

APHOR. LVIII. Coac. iij, 370. —  
 I. Morb. iij, 34. — Aph. iv, 35. —  
*Vide van-Swieten, t. j, p. 408.*

APHOR. LIX. Aph. ij, 21; iv, 13,  
 41; vij, 50. =<sup>1</sup> II. Diæt. xxxviii, 1,  
 2. — III. Diæt. xvj, 12, 14. — II.  
 Prædict. viij, 8, 13. — Insomn. xv,  
 14, 15. — Affect. xxviii, 2; xli, 7, 8,  
 11, 12. — *Vide van-Swieten, t. iv,  
 p. 238.*

APHOR. LX. Aph. iv, 40. — I.  
 Prædict. ij, 4; iv, 2; vij, 12; x, 2.  
 — Coac. v, 6, 78; vj, 85. — Vict.  
 Acut. xlvj, 4, 5.

APHOR. LXI. <sup>1</sup> Aph. iv, 41, 42. =  
<sup>2</sup> Aph. iv, 56. = <sup>3</sup> Aph. j, 21.

APHOR. LXII. *Vide* Aph. iv, 44.

APHOR. LXIII. *Vide* Aph. iv, 44.

APHOR. LXIV. *Vide* Aph. iv, 45.

APHOR. LXV. Aph. ij, 10; vij, 67.  
 — Vet. Medic. xij, 11.

IN SECTIONEM VII. 285

APHOR. LXVI. VI. Epid. viij, 29,  
40.

APHOR. LXVII. <sup>1</sup> Judicat. viij, 10,  
11. = <sup>2</sup> Prænot. x, 8. — Coac. vj,  
85. — Epid. vj, 10. = <sup>3</sup> Aph. ij, 10,  
viij, 65. — *Vide van-Swieten, tom. ij,*  
*p. 348.*

APHOR. LXVIII. Aph. j, 22. —  
Judicat. viij, 12.

Delendum hunc Aphorismum vult  
Prosp. Martianus, aut legendum ut in  
lib. de Judicat. *Si atra bilis deorsum*  
*exeat, pauca, &c.*

APHOR. LXX. *Vide* Aph. ij, 9; iv,  
13. = <sup>1</sup> II. Diæt. xxxvj, 18 ad 23.  
= <sup>2</sup> Cels. iij, 3, 18, p. 154, l. 33.

APHOR. LXXI. *Vide* Aph. ij, 3.

APHOR. LXXII. *Vide* Aph. iv, 48.  
= <sup>2</sup> Cels. ij, 6, p. 55, l. 21.

APHOR. LXXIII. *Vide* Aph. iv, 49.

— I. Prædict. x, 7. =<sup>1</sup> Coac. ij, 117, 128.

APHOR. LXXIV. I. Morb. iij, 28.  
— Affection. xx, 13, xxxij, 3. —  
Int. Affect. xxiv, 1. — *Vide* van-Swieten, t. j, 93.

APHOR. LXXV. <sup>a</sup> Cels. ij, 7, pag. 64, l. 10. — *Vide* van-Swieten, t. ij, p. 349.

APHOR. LXXVI. Aph. vj, 43. —  
Coac. ij, 296. — I. Morb. iij, 26. =  
<sup>a</sup> Cels. iv, 4, p. 203, l. 5.

APHOR. LXXVIII. Aph. vij, 15, 16. — II. Prædict. xiv, 1, 3. — I. Morb. x, 69; xix, 4 ad xx. =<sup>a</sup> Cels. iv, 4, p. 203, l. 5. — Vid. Aph. v, 12, 14. — II. Prædict. xij, 3. — Coac. iij, 259. — *Vide* Aph. vij, 15, 16.

Ad intelligendum hujus Aphorismi sensum, obscuræ Benneti Londinensis de tabe observationes accuratè legendæ sunt. Theatr. Tabid.



IN SECTIONEM VII. 287

APHOR. LXXIX. Prænot. ij, 1, &c.  
xv, 10, 11. = <sup>1</sup> Aph. viij, 18. —  
Aliment. vj, 1 ad 8. — Insomn. iv, 16.  
— Epid. vj, 2. — *Vide van-Swieten,*  
t. ij, p. 387.



Multi L. B. sectionem octavam omittunt. Plurimi sex ejus priores adjiciunt Aphorismos. Alii sectionem totam addunt, ut hinc factum vides. Nam quæ spuria tibi videntur, in lectione præteriri facile possunt.

## Α Φ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι

Παρεμβεβλημένοι.

## Τ Μ Η Μ Α Ο Γ Δ Ο Ο Ν .

α. Ὀκόςσοι ἑπὲρ τὰ τεσσαράκοντα ἕτεα φρενιτικοὶ γίγνοντ', ἔ πάνυ τοί υγιάζοντ'.<sup>2</sup> ἥσων γδ' κινδυνύουσιν, οἷσιν ἂν οικεῖη τ' φύσιθ, καὶ τ' ἡλικίης, ἢ νῆσθ ἤ.

β'. Ὀκόςσοισιν ἐν τῆσιν ἀρρώσῃσιν οἱ ὀφθαλμοὶ κτ' προαίρεσιν<sup>α</sup> δακρύουσιν, ἀσθόν. ὀκόςσοισι ἧ ἄνευ προαίρεσιθ, κακόν.

γ'. Ὀκόςσοισιν ἐν τοῖσι πυρελοῖσι

---



---

A P H O R I S M I

I N T E R J E C T I.

SECTIO OCTAVA.

1. **Q**UI<sup>1</sup> supra quadraginta annos phrenitici fiunt, non admodum sanantur. <sup>2</sup> Minus enim periclitantur, quorum naturæ, et ætati, morbus similis fuerit.

2. Quibus, in infirmitatibus, oculi ex proposito (i. e. *ob causam*)<sup>a</sup> lacrymantur, bonum. Quibus verò sine causâ, malum.

3. Quibus in febribus quartanis exis-

tentibus, sanguis ex naribus fluxerit, malum.

4. Sudores in diebus criticis oborientes, vehementes et veloces, periculosi: <sup>1</sup> et qui expelluntur ex fronte, velut guttæ, et aquæ salientes, et frigidi valdè, ac multi. Necesse enim est talem sudorem prodire cum violentiâ, et laboris excessu, et expressione diuturnâ.

5. Ex morbo diuturno alvi defluxus, malum.

6. Quæ medicamenta non sanant, ea ferrum sanat. Quæ ferrum non sanat, ea ignis sanat. Quæ verò ignis non sanat, ea insanabilia existimare oportet.

7. Tabes maximè fiunt ab anno octavo decimo usque ad quintum et tricesimum.

τελαρταίοισιν ἔξουσιν αἷμα ἐν τῇ ῥινῶν  
 ῥυῆ, πονηρόν.

δ. Ἰδρῶτες ἐν τῇσι κρισίμοισιν  
 ἡμέρησι γινώσκουσι ῤοδροὶ καὶ τα-  
 χέες, ἔπικίνδυνοι· ἢ καὶ οἱ ὠθέμενοι ἐκ  
 ἔμετάωπα, ὅσπερ σαλαγμοὶ καὶ κρενοὶ,  
 καὶ ψυχροὶ ῤοδρα, καὶ πολλοὶ ἀνάγκη  
 γὰρ τὸ τριῖτον ἰδρῶτα πορεύεσθαι μετὰ  
 βίης, καὶ πόνου ὑπερβολῆς, καὶ ἐκθλί-  
 ψις πολυχρονίαις.

ε. Ἐπὶ χρονίῳ νεσθήματι κοιλιῆς  
 κατὰφορῇ, κακόν.

ς. Ὅσα φάρμακα σὺν ἰῆ), σί-  
 δηρῶ ἰῆ). ὅσα σίδηρῶ σὺν ἰῆ), πῦρ  
 ἰῆ). ὅσα ἢ πῦρ σὺν ἰῆ), ταῦτα χρὴ  
 νομίζειν ἀνίατα.

ζ. Φθίσιες μάλιστα γίνονται ἀπὸ  
 ὀκτωκάδεκα ἑτέων, μέχρι τριήκοντα  
 ἔπειτα.

ή. <sup>1</sup> Τὰ ἴ μὲν φύσιν γιγνόμενα  
 κτὲ φθίσιν, πάντα μὲν ἰχυρὰ, τὰ ἴ  
 κὲ θανατώδεια. <sup>2</sup> Δύτερον ἴ, ἢν μὲν  
 ἐν τῇ ᾠρῃ νεσείη, αὐτῇ ἢ ᾠρῃ ξυμ-  
 μαχεῖ τῇ νεσείῃ, οἷον κάυσῃ θερμῷ,  
 ὑδρωπικῷ χειμῶν· ὑαφνικῶ γὰρ τὸ  
 φυσικόν· φοβερώτερον ἴ Ἐπληνί.

θ. Γλῶσσα μέλαινα κὲ αἱματώδης,  
 εἴ τι τῶν τοιούτων σημείων ἄπεισι, μὴ  
 Ἐφόδρα κακόν· δηλοῖ γὰρ νεσον Ἐμι-  
 κροτέρω.

ί. Ταῦτα μὲν ἔν ἐν τοῖσι πυρελοῖσιν  
 ὀξείσι σημειῶσθαι χρὴ, ὅποτε μέλλει  
 ἀπθνήσκειν, ἔ ὅποτε Ἐωθήσειαθ.

ιά. Ὁρχις δεξιὸς ψυχρὸς ἔ Ἐπασ-  
 μώδης, θανατώδης.

ιδ. Ὁνυχες μέλαινες, <sup>α</sup> καὶ οἱ δάκ-

8. <sup>1</sup> Quæ secundùm naturam ad tabem disposita *sunt*, omnia quidem vehementia; quædam verò etiam lethalia. <sup>2</sup> Secundùm autem, si quidem in *eo* tempore ægrotet, *cùm* tempus ipsum unà cum morbo impugnat, velut cum febre ardente æstas, cum hydrope hyems. Natura enim longè superior est: leni verò plus offert timoris.

9. Lingua nigra atque cruenta, si quid horum signorum abest, non valdè malum: morbum enim minorem declarat.

10. Hæc igitur in febribus acutis notare oportet, quando *quis* moriturus sit, et quando evasurus.

11. Testis dexter frigidus et convulsus, lethale.

12. Ungues nigri, et digiti manuum

et pedum frigidi, contracti, vel remissi, mortem in propinquo esse ostendunt.

13. Labia livida, aut etiam resoluta et inversa, et frigida, lethalia.

14. Aures frigidæ, pellucidæ, contractæ, lethales sunt.

15. Et tenebricosâ vertigine laborans, et lucem aversans, et somno ac ardore multo detentus, desperatus.

16. Et qui in rabiem actus furit intrepidè, et non agnoscit, et neque audit, neque intelligit, *jam moribundus est.*

17. Morituris *signa* hæc magis fiunt manifesta, et ventres attolluntur, atque inflantur.

18. Terminus verò mortis *est*, si animæ calor suprâ umbilicum ad lo-



τυλοὶ τῶν χειρῶν καὶ ποδῶν ψυχροὶ ,  
 ξυνεσαλμῆροι ἢ καθειμῆροι , ἐγγὺς τῷ  
 θάνατον δηλοῦσι.

ιγ'. Τὰ χεῖλη πελιδῆα , ἢ καὶ δῦο-  
 λελυμῆα , ἐξερμαμῆα , καὶ ψυχρὰ ,  
 θανατώδεια.

ιδ'. Τὰ ἄτα ψυχρὰ , διαφανέα ,  
 ξυνεσαλμῆα θανατώδεια εἰσι.

ιε'. Καὶ Κολοδιναῖων , ἢ ἐπὶ τὴν αὐγὴν  
 δῦοστροφόμυθον , ἐπὶ ὕπνῳ καὶ καύματι  
 πολλῶν κατεχόμενῳ , ἀνέλπεισθον.

ισ'. Καὶ λυσάων ἀτρέμα , ἐπὶ ἀγνοέων ,  
 καὶ μηδὲ ἀκίμων , μηδὲ ξυνιείς , θανα-  
 τώδεις.

ιζ'. Μέλλουσιν ἀποθνήσκειν ταῦτα (α-  
 φέσερα γίνεσθαι) , ἐπὶ αἰ κοιλίᾳ ἐπαί-  
 ρον) , ἐπὶ φουσῶν).

ιη'. Ὅρασθαι τὸ θάνατον , ἐὰν τὸ  
 τῷ ψυχῆς θερμὸν ἐπανέλθῃ ὑπὲρ τῷ

ὀμφαλῶ εἰς τὸ ἄνω τῆς φρενῶν τόπον ,  
 1 ἔστι Συγκαυθῆ τὸ ὑγρὸν ἅπαν. ἐπεὶ δὲ  
 ὁ πλεύμων καὶ ἡ καρδία τὴν ἰκμάδα  
 ἀποβάλλουσι , τῆς δερμῶς ἀθροῦσιν ἐν  
 τοῖσι θανατώδεσι τόποις , ἀπώνεται  
 ἀθρόον τὸ πνεῦμα τῆς δερμῶς , ὅθεν περ  
 ξυνέστη τὸ ὄλον , εἰς τὸ ὄλον . 2 παλιν  
 τὸ μὲν Διὰ τῆς Σαρκῶν , τὸ δὲ Διὰ τῆς  
 ἐν κεφαλῇ ἀναπνοῶν , ὅθεν τὸ ζῆν κα-  
 λῶμεν , ἀπολείπεται ἡ ψυχὴ τὸ τῆς  
 Σάμαϊστος Σκῆνστος , καὶ τὸ ψυχρὸν , ἔστι  
 τὸ θνητὸν εἶδωλον , ἅμα ἔστι χολῆ , καὶ  
 αἷματι , ἔστι φλέγματι , ἔστι Σαρκί , πα-  
 ρέδωκεν .

Τ Ε Λ Ο Σ .

S E C T I O VIII. 297

cum septo transverso superiorem ascenderit, <sup>1</sup> et omne humidum fuerit combustum. Postquam pulmo et cor humorem amiserint, calore in mortiferis locis coacervato, caloris spiritus confertim exhalat, undè totum in toto constitit. <sup>2</sup> Rursus partim quidem per carnes, partim verò per spiracula in capite, unde vivere dicimus, relinquens anima corporis tabernaculum, et mortale simulacrum, unà cum bile, et sanguine, et pituitâ, et carne, deditione tradit.

F I N I S.

D d d

---

 N O T Æ

I N

## SECTIONEM OCTAVAM.

---

 APHORISMUS I. <sup>1</sup> Aph. ij, 39, 40; vj, 6. = <sup>2</sup> Aph. ii, 34; iv, 48.

 APHOR. II. Aph. iv, 52. = <sup>a</sup> Cels. ij, 4, p. 51, l. 14.

 APHOR. III. Judicat. x, 7. — I. Prædict. j, 2. — Coac. ij, 37, 38; iij, 433. — VI. Epid. ij, 40. — *Vide van-Swieten*, t. ij, p. 473.

Notat Prosper Alpinus se narium hæmorrhagiâ à quartanâ liberatum fuisse, quod tamen hujusce dogmatis Hippocratici veritatem non impedit; cùm symptoma illud ab immeabili obstructione pendere soleat. Prosp. Alp. de præsag. vitâ et morte. Lib. vj, cap. xiiij.

IN SECTIONEM VIII. 299

APHOR. IV. <sup>1</sup> Judicat. vj, 9. —  
Prænot. v, 4, 8. — I. Prædict. v, 7.  
— Coac. iij, 91; iv, 38, 39. — Vict.  
Acut. liij, 8, 9.

APHOR. V. *Vide* van-Swieten, t. ij,  
p. 346; t. iij, p. 374.

APHOR. VI. Arte xij, 12 ad 18.  
— *Vide* van-Swieten, t. iij, p. 67.

APHOR. VII. Aph. v, 9.

APHOR. VIII. <sup>1</sup> I. Morb. xx, 1, 2,  
3. = <sup>2</sup> Aph. ij, 34; iij, 3; viij, 1. —  
VI. Epid. viij, 45. — Affect. vij, 3, 4.

APHOR. IX. Coac. ij, 140, 148.

APHOR. X. Prænot. ij, iij, iv.

APHOR. XI. Prænot. viij, 20. —  
Coac. iij, 352.

APHOR. XII. Prænot. viij, 15; xv,  
9. — Coac. iij, 349. = <sup>2</sup> Cels. ij, 6,  
p. 55, l. 4; ij, 7, p. 66, l. 13.

APHOR. XIII. Coac. j, 97.

300 NOTÆ IN APHOR.

APHOR. XIV. Prænot. ij, 9. —  
Coac. ij, 67, 108.

APHOR. XV. Prænot. ij, 18, 19. —  
<sup>1</sup> Coac. ij, 117.

APHOR. XVI. Coac. iij, 327.

APHOR. XVIII. <sup>1</sup> Morb. xxx, 12 ad  
16. = <sup>2</sup> Vid. Aph. vij, 79. — Ali-  
ment. vj, 1 ad 8.



---

LUD. VERHOOFD  
PRÆFATIO

AD

I N D I C E M.

SISTO tibi, L. B. indicem, qui (ut verum fatear) in meum factus est usum. Sed cùm is jam aliis etiam conceditur, quid quærentem monere velim verbo dicam.

Ordo ejus est litterarum idem, Prout quærendum cæperit à litterâ, in eâdem illud videri de-

Eee

bet. Quidquid eundem affectum concernit , in summum collegi caput , ut uno intuitu omnia videantur. Methodo ad Praxin directâ disposui.

Primò *Affectum* pono. Deinde *Anni Tempus* , in quo accidit. Mox *Ætatem* cui est familiaris. Inde ad *Signa* progredior. Hinc *Causas* adscribo , simul cum aliis affectibus , unde originem trahit. Deinceps descendo ad *Prognosin* , bonam , vel malam. Tum *Diætam* præscribo. Postea *Curam* subjungo , sub quâ *Purgationem* quandoque simul præcipio. Tandem *Crisin* , sive *Solutionem* , quomodo ea fiat , annec-



to. Denique quibus superveniens morbis *eosdem solvat*, refero. Ultimò *Species varias* ( in quibus tractandis eadem iterum servatur methodus ) addo. Et si quæ *supra hæc* occurrant, adjicio.

Verùm de omni affectu hæc singula conjungere volumen breve vetat.

Jam si quid in indice omissum putes, in alio id quære capite, et fortasse non frustra feceris. Si tamen idem pluribus notetur in locis, quæso, ne id offendat. Tuâ enim gratiâ id repetitum est: atque decies redundare, quàm semel deficere, malo sciens. Ordinis

304 P R Æ F A T I O.

rationem, quia brevis esse cogor,  
non reddo. Fruere, fave, vale.

Καιρὸν γνῶθι.

Ὅξὺς γάρ.

Aph. I. 1.

---



---

# I N D E X.

## A.

**ABDOMEN.**

Crassi et tenuis

*Prog.* ij, 35.**ABORTUS.***Tempus* iij, 11.Futuri *signa à**mammis*, v, 37,

38, 53.

*Causa V. S.* v, 31.*Diarrhœa*, v, 34.*Tenesmus*, vij,

27.

*Uteri mucus*, v,

45.

*Macies p. n.* v,

44.

*Extenuatio in fe-**bre*, v, 55.**ABSCCESSUS.**Futuri *sign.* in*feb.* iv, 31.*In morb. diutur-*  
*no*, iv, 32.*Solutio*, iv, 74.*Longi sig.* iv, 51.*In articulis unde*  
*post. feb.* iv, 31.*Prævertitur*, iv,  
74.*In nephriticis sig.*  
VII, 36.*Abscess. ossis. in*  
*ulcere diuturno*,

vj, 45.

*A sphacelo*, vij,  
77.**ÆTAS.***Temperamentum.*

j, 14, 15.

*Progn.* ij, 34, 45;

iij, 24; viij,

I.

*Diæta*, j; 13, 14,  
15, 16.

*Cautio in diæta*,  
1, 17; iij, 3.

*In aliis*, j, 2.

*Nuper natus*.

*Morbi*. iij, 24.

*Dentiens*.

*Morbi*. iij, 25.

*Morbor. crisis*,  
iij, 28.

*Puer*.

*Ver et æstas con-*  
*veniunt*, iij, 18,

*Fames*, 1, 13,  
14.

*Morbi*. iij, 27.

*Non laborat po-*  
*dagrá*. VI, 30.

*Morbor. progn.*  
ij, 39; iij, 28.

*Diæta*. j, 16.

*Puber*.

*Ver et æstas con-*  
*ducunt*. iij, 18.

*Morbi*. iij, 27.

*Morbor. progn.*  
iij, 28.

*Adolescens*.

*Fames*. j, 13.

*Alvi. progn.* ij,  
20, 53.

*Morbi*. iij, 29.

*Morbor. progn.*  
ij, 45; v, 7.

*Vir*.

*Autumno et hye-*  
*me valet*, iij,  
18.

*Fames*, j, 13.

*Morbi*, iij, 30;  
vj, 57.

*Senex*.

*Temperamentum*,  
j, 14.

*Æstate valet*,  
iij, 18.

*Fames*, j, 13, 14.

*Alvus*, ij, 20, 53.

*Morbi*, j, 14; iij,  
31.

*Progn.* ij, 39,  
40, 49; iij,

12; vj, 6;

viiij, 1.

ALPHI. *Tempus*,

- iij, 20.  
**ALVI EXCRE-  
 MENTA,**  
 egestionēs.  
 Χωρέον, j, 23.  
 Ἀποχωρέον, vij,  
 69.  
 Διαχώρημα, iv,  
 28; vij, 30.  
 Διαχώρησις, ij,  
 iv, 47, v, 64.  
 Ὑποχωρέον, iv,  
 25, 26.  
 Ὑποχωρημα, j,  
 12; iv, 21;  
 vij, 76, 79.  
 Ὑποχωρησις, iv,  
 83; v, 64;  
 vij, 6, 23.  
 Ἐκκρίσις, ij, 15.  
 Ὑπελθόν, iv,  
 22.  
 Ὑπελσθόν, iv,  
 23.  
*Progn.* j, 12;  
 vij, 79.  
*In feb. continuâ,*  
 iv, 47; vij, 69.  
*Diat.* in sanis,  
 ij, 15.  
*In biliosis,* ij, 15;  
 v, 64.  
*Biliosorum solu-  
 tio,* iv, 28.  
*Ab atrâ bile le-  
 thalia,* iv, 22,  
 23, 24.  
*Nigror. progn.* iv,  
 21.  
*A purgante,* iv,  
 21.  
*Sanguis, niger bo-  
 nus,* iv, 25.  
*Lethalis,* iv, 23.  
*Spumosa unde,* vij,  
 30.  
*Sincera. Progn.*  
 vij, 23.  
*In morbo diu-  
 turn.* vij, 6.  
*Celeria unde,* ij,  
 18.  
*Pauca ubi,* iv, 83.  
*Carunculæ, malæ,*  
 iv, 26.  
*Ramentorum pro-*

- gnosis.* vij, 67.  
**ALVI FLUXUS.**  
*Διαρροία*, iij,  
 21, 25, 30;  
 v, 12, 14; vj,  
 15, 16, 17,  
 32; vij, 29,  
 30, 75, 78.  
*Ψύσις*, ij, 14;  
 iij, 16.  
*Ψύειν*, v, 34.  
*Ταραχή*, j, 2;  
 iv, 60.  
*Καταφορά*, viij,  
 5.  
*Υγρότης*, iij, 31.  
*Tempus*, iij, 16,  
 21.  
*Ætas*, iij, 25, 31.  
*A fluxione capi-*  
*tis*, vij, 78.  
*Progn.* ij, 14;  
 vij, 75.  
*Malus*, v, 34;  
 vj, 16; viij, 5.  
*Lethalis*, v, 12,  
 14.  
*Solutio*, vj, 15.
- Morbum solvit*,  
 iv, 60; vj, 17;  
 vij, 19.  
*Spontanei prog.* i,  
 2.  
*Spumosus à capi-*  
*te*, vij, 30.  
*Longo obnoxii*, ij,  
 30; vj, 32.  
*Ætas*, iij, 30.  
**ALVI MUTATIO**  
*naturalis*, ij,  
 20, 53.  
**ALVUS HUMI-**  
**DA, SICCA.**  
*Tempus*, iij, 1,  
 17.  
*Progn.* ij, 20, 53.  
*Humidæ ætas*, iij,  
 31.  
*Ubi fiat*, iv, 27,  
 73.  
**ANGINA.**  
*Tempus*, iij, 16,  
 20, 22.  
*Progn. bona*, vj,  
 37; vij, 49.  
*Mala*, v, 10.

- ANIMUS. Videatur Mens. *xæ*, v, 28.
- ANXIETAS. ARS MEDICA  
*Vino solvitur*, *longa*, i, i.  
 vij, 56. *Requisita*, j. i.
- APHTHÆ. *Ætas*. ARTICULO-  
 ij, 24. RUM Dolor.
- APPETITUS. Vid. Tubercula.  
 Fames. Vid. Dolor.  
Tubercula.
- APOPLEXIA. ARTUS, &c.  
*Tempus*, ij, 16, *Progn. mortis*,  
 23. vij, 10, ad  
*Ætas*, ij, 31; 18.  
 vj, 57.
- In melancholicis* ASTHMA.  
*unde*, vj, 56. *Tempus*, ij, 22.  
*Progn.* vj, 51. *Ætas*, ij, 26,  
*Curæ*, ij, 42. 30.  
*Progn.* vj, 48.
- Particularis, vij, AUDITUS.  
 40. *Progn. in feb.* iv,  
49; vij, 73.
- AQUA. Hebetis *tempus*,  
*Levis sign.* v, 26. ij, 5, 17.  
*Calidæ effectus*, *Ætas*, ij, 31.  
 vij, 43, 31. *Acuti tempus*, ij  
*Frigidæ effectus*, 17.
- v, 21. AURES.  
*Progn.* viij, 14.
- AROMATA. *Suf-* Fff  
*fitus vis et no-*

Humidarum *ætas*,  
 iij, 24, 31.  
 Doloris *tempus*,  
 iij, 21.  
 AUSTER. vid.  
 Ventus.  
 AUTUMNUS. vid.  
 Tempestas.

## B.

BALBUS.  
*Progn.* vj, 32.  
 BALNEUM.  
*Dolores oculo-*  
*rum solvit*, vj,  
 31; vij, 46.  
 BILIS.  
*Atræ sign.* vij, 68.  
*Lethalis ubi*, iv,  
 22, 23, 24.  
 BOREAS. vid.  
 Ventus.  
 BUBO. *Progn.* iv,  
 54.

## C.

CACHEXIA.  
*Ætas*, iij, 31.  
*Diæta*, ij, 10;  
 vij, 67.  
*Purgationis pro-*  
*gn.* ij, 36.  
 CALCULUS. vid.  
 Vesica.  
 CALIDUM IN-  
 NATUM.  
*Majoris tempus*,  
 j, 15.  
*Ætas*, j, 14.  
 CALOR.  
*Utilis ubi*, v,  
 18, 22.  
*Magni progn.* vij,  
 13.  
*Frequentioris mor-*  
*bi*, v, 16.  
*Mutati, progn.* iv,  
 40; vij, 60.  
*Particularis, quid*  
*notet*, iv, 39.  
*Ventris, quando*



- major*, j, 15.  
*Progn.* iv, 48;  
 vij, 69.  
**CALVUS.** *vid.* *Capilli.*  
**CANCER.** *Occulti progn.* vj, 38.  
**CAPILLI, PILUS.**  
*Quid indicent*,  
 v, 69.  
*E renibus*, iv, 76.  
*Defluxus in tabe*  
*lethalis*, v,  
 11, 12.  
*Calvi progn.* vj,  
 34.  
*Eunuchus non fit*,  
 vj, 28.  
**CAPUT.**  
*Doloris tempus*,  
 iij, 13, 23.  
*Sign.* iv, 70.  
*Progn.* vj, 51.  
*Diæta*, v, 64.  
*Cura*, *V. S.* v,  
 61.  
*Solutio*, vj, 10,  
*Gravitatis rem-*  
*pus*, iij, 5, 17.  
*Causa*, v, 28.  
*Cura*, *calor*, v,  
 22.  
*Vulneris progn.*  
 vij, 14.  
*Ulcus*, *calor juvat*,  
 v, 22.  
**CARTILAGO.**  
*Dissecta non*  
*coalescit*, vj,  
 19, 28.  
**CATARRHUS.**  
*Ætas*, iij, 12,  
 21.  
*Sign. in diarrhæâ*,  
 vij, 30.  
*Causa*, *frigus*, v,  
 24.  
*A tabe*, vij, 78.  
*Lethalis ubi*, iij,  
 12.  
*In pectus ruentis*,  
*progn.* viij, 38.  
**CAUTIO GE-**  
**NERALIS.** j,  
 2, 3, 17.  
**CEREBRUM.**

- Frigus nocet*, v,  
 18.  
*Concussi sympto-  
 mata*, vij, 58.  
*Vulneris sympto-  
 mata*, vj, 50.  
*Progn.* vij, 14.  
*Lethale est*, vij,  
 18.  
*Sphaceli progn.*  
 vij, 50.  
**CHOLERA.**  
*Ætas*, iij, 30.  
**CIBUS.** *Nutritio.*  
*Cautio*, j, 17; ij,  
 7, 51.  
*Progn.* ij, 31, 32.  
*Concoction. pro-  
 gn. à tempore*,  
 j, 18; ij, 18.  
*Differentia*, ij,  
 18.  
*Tutus quandò.* ij,  
 15; vij, 65.  
*Nocet*, j, 11, 19;  
 ij, 10, vij,  
 65, 67.  
*Pauco ubi opus*,  
 1, 10, 14, 18.  
*Multo ubi opus*,  
 14, 15, 18.  
*Copiosi sign.* ij, 8,  
 17; iv, 41,  
 45; vij, 64.  
*Effectus*, ij, 17.  
*Consuetus præ-  
 fertur*, ij, 38.  
*Humidus, quibus  
 utilis*, j, 16.  
*Citò nutriens*, ij,  
 18.  
*Et lentè ubi ne-  
 cesse*, ij, 7.  
*Mutatio, ubi ju-  
 vet*, ij, 45.  
*Pravi progn. in  
 purgante*, ij,  
 36.  
*Vid. plura in Diæ-  
 ta.*  
**COLLIQUEFAC-  
 TIO.**  
*Prog. in feb.* ij, 28.  
*In gravidâ*, v, 55.  
*Diæta*, v, 64.  
**COLLUM.** *Inversi*

- progn.* iv, 35;  
viii, 58.
- COLOR.** *Variantis progn.* iv, 40; vii, 60.
- CONCEPTUS.**  
*Sign.* v, 41, 51, 61.  
*Impedimentum,* v, 46, 62.  
*Maris locus,* v, 38, 48.  
*Sign. à colore,* v, 42.
- CONCOCTA.**  
*Movenda, non cruda,* j, 22.  
*Cruda, à bile atrá,* vij, 68.
- CONSUETUDO.**  
*Vis.* ij, 45.  
*Ejus habenda ratio,* j, 16, 17; ij, 38, 49, 50.
- CONTRARIUM.**  
*Remedium est,* ij, 17, 22, 48, 50; v, 19.
- Paulatim adhibendum,* ij, 51.
- CONVULSIO.**  
*Vid.* Spasmus.
- COR.** *Vulnus, lethale,* vj, 18.
- CORPUS.**  
*Præparatio,* vid. in Purgatione.  
*Statura,* ij, 54.
- CRANIUM.** *Læsi symptomata,* vij, 24.
- CRISIS.**  
*Futuræ sign. à nocte,* ij, 13.  
*Ab urinâ,* iv, 71.  
*Critici dies,* ij, 24; iv, 36, 61.  
*Progn.* j, 12.  
*Non turbanda,* j, 19, 20.  
*Imperfecta,* ij, 12; iv, 51, 61, 62; viij, 4.
- CUCURBITULÆ.** *Ubi ne-*  
G g g

*cesse*, v, 50.  
**CUTIS.**

*Progn.* v, 61.  
*Raræ*, v, 69.

D.

**DEGLUTITIO.**

*Progn.* iv, 34,  
 35; vij, 58.

**DELIQUIUM  
 ANIMI.**

*Causa, calor fre-*  
*quens*, v, 16.

*A tuberculo rup-*  
*to*, vij, 8.

*Progn.* ij, 41.

*In fluore mulie-*  
*bri malum*, v,  
 56.

*Ubi opus*, j, 23.

**DELIRIUM.**

Φρενίτις.

*Ætas*, iij, 30.

*Sign. ab urinâ*, iv,  
 72.

*Progn. in sene*,  
 viij, 1.

*Mala, ex perip-*  
*neumonia*, vij,  
 12.

Παραφροσύνη.

*In cranio fracto.*  
 vij, 24.

*Progn. bona, à*  
*somno*, ij, 2.

*A risu*, vj, 53.

*Mala, in febr.*  
 iv, 50.

*Cum studio*, vj,  
 53.

*Post potum*, vij,  
 7.

*In hæmorrhagiâ*,  
 vij, 9.

*In ileo*, vij, 10.

*In vigiliis*, vij,  
 18.

*In plagâ capitis.*  
 vij, 14.

Παρακωπή.

*Ubi bona*, vj,  
 26.

Μανία.

*Tempus*, iij, 20,  
 22.

*Ab ulcere*, v, 65.

*In melancholicis*, vj, 65.

*A mammis*, v, 40.

*Progn.* vij, 5.

*Solutio*, vj, 21.

*Rabies*, viij, 16.

**DENTES.**

*Dentitionis, ætas et morbi.* iij, 25.

*Frigus nocet*, v, 18.

*Lentoris, in feb. progn.* iv, 53.

**DESTILLATIO.**

vid. *Catarthus.*

**DIÆTA.**

*Cautio*, j, 9, 10, 16, iij, 3.

*Pleniori ubi opus*, j, 4, 5, 7, 10.

*Tenui ubi opus*, j, 7, 8, 10, 11.

*Mutatio quos iu- vet*, ij, 45.

*Erratum*, j, 5.

*Vid. plura, in Ci- bo.*

**DIAPHRAGMA.**

*Vid. septum transversum.*

**DIARRHŒA.**

*Vid. Alvi flu- xus.*

**DOLOR.**

*Progn. si non sentiatur*, ij, 6.

*Si sint bini*, ij, 46.

*Calor lenit*, v, 22.

*Torpor solvit*, v, 25.

*Ab anginâ*, v, 10.

*In ulcere.* v, 65.

*Cautio*, vj, 65.

**Lumborum.**

*Tempus*, iij, 23.

*Progn.* iv, 11.

*Purgatio.* iv, 20.

G g g ij

Ventris.

*Progn.* iv, 11;  
vj, 7; vij, 22,  
26.

*Purgatio*, iv, 20.

*Viscerum. Progn.*  
iv, 66.

*Articulorum.*

*Tempus*, iij, 16,  
20.

*Ætas*, iij, 31.

*Post febres, lon-*  
*gas*, iv, 44;  
vij, 63.

*Causa, cibus co-*  
*piofior*, iv, 45;  
vij, 64.

*Frigida solvit*,  
v, 25.

DYSENTERIA.

*Tempus*, iij, 11,  
12, 16, 22.

*Ætas*, iij, 30.

*In ulcere*, v, 65.

*A diarrhæâ*, vij,  
75.

*Progn.* vj, 3, 43;  
vij, 76.

*Bona in lienosis*,  
vj, 48.

*In insaniâ*, vij,  
5.

*Mala, à sincerâ*  
*dejectione*, vij,  
23.

*Lethalis ab atrâ*  
*bile*, iv, 24.

*Cum carunculis*,  
iv, 6.

DYSPNŒA. Vid.  
*Respiratio.*

DYSURIA.

*Tempus*, iij, 5.

*Ætas*, iij, 31.

*Cura, V. S.* vj,  
36; vij, 48.

*Vinum*, vij,  
48.

E.

EBRIUS. *Progn.* v,  
5.

ELLEBORUS.

*Præparatio ad El-*  
*leborum*, iv, 13.

- Quomodo juvetur, et sistatur,*  
iv, 14, 15.  
*Sanis periculosus,* vij, 76.  
*Progn. à spasmo,* v, 1.  
*Vid. plura in purgante.*
- EMPYEMA.**  
*Causa, à sanguine effuso,*  
vj, 20.  
*A pleuritide,* v, 8.  
*Quot diebus fiat,*  
vij, 38.  
*Progn. v,* 15.  
*In curâ,* vij, 34.  
*Cautio in curâ,*  
vj, 27.
- EPILEPSIA.**  
*Tempus,* iij, 16, 20, 22.  
*Ætas,* iij, 29.  
*Progn. v,* 7.  
*Cura,* 2, 45.
- ERYSIPELAS.**
- Ab osse nudato,*  
vij, 19.  
*Progn. vj,* 25  
vij, 20.  
*Lethalis in gravidæ utero,* v, 43.  
*Cura non exulcerati,* v, 23.
- EVACUATIO.**  
*Ubi opus,* ij, 8;  
iv, 41.  
*Cautio,* j, 23;  
ij, 29.  
*Quâ viâ,* j, 21;  
vij, 61.  
*Progn. j,* 2, 23  
25.  
*Extrema periculosa,* j, 3; ij, 51.  
*Cura,* ij, 22.
- EUNUCHUS.**  
*Progn. vj,* 28.
- EXCRETIO, Vid.**  
Alvi excrementa.
- EXSOLUTIO.**

- Ἐκλύω, ij, 23,  
41; vij, 8.  
Διαλύω. iij, 17.  
Καταλύω. ij.  
*Tempus*, 43, 17,  
112.  
*Causa*, ij, 36;  
vij, 8.  
*Progn.* ij, 41,  
43.
- EXPERIMENTUM.**  
*Periculosum*, j,  
1.
- EXTENUATUS:**  
*Progn.* ij, 28,  
35; iv, 23.  
Vide plura in *Pingu*.
- EXTREMARUM**  
frigus. Vid.  
*Frigus*.
- F.**
- FAMES.**  
*Variat cum ætate*, j, 13.
- Progn.* ij, 4.  
*Labor nocet*, ij  
16.  
*Siccatur corpus*,  
vij, 59.  
*Expletur difficilius quàm sitis*, ij, 11.  
*Solvitur vino*,  
ij, 21.  
*Appetitus dejectus.*  
*Progn.* ij, 32.  
*Malus*, vj, 3;  
vij, 6.  
*Curatur purgatio*,  
iv, 17.  
*Fastidium cibi. In muliere progn.*  
v, 61.
- FAUCES.**  
*Laborantium progn.* ij, 15.  
*Asperarum tempus*, iij, 5.
- FEBRIS.**  
*Ætas*, iij, 25.  
*Progn.* ij, 28;



- iij, 6.  
*A tempore*, iij, 6.  
*A paroxysmo*, iv, 30.  
*A somno*, iv, 67.  
*A lachrymis*, iv, 52; viij, 2.  
*A surditate*, iv, 60.  
*A dentibus*, iv, 53.  
*A collo*, iv, 35; vij, 58.  
*A respiratione*, iv, 68.  
*A suspiriis*, vj, 54.  
*A suffocatione*, iv, 34.  
*A vomitu sanguinis*, vij, 73.  
*Ab hypochondriis*, iv, 73.  
*Ab urinâ*, iv, 69, 70; vij, 31.  
*Ab alvi excrementis*, iv, 21.  
*A dysenteriâ*, vj, 3.  
*A calore*, iv, 65.  
*A rigore*, iv, 29.  
*A spasmo*, ij, 26.  
*Ab bubone*, v, 55.  
*A lassitudine*, iv, 31.  
*Ab abscessu*, iv, 51.  
*Ab extenuatione*.  
*Ab hæmorrhagiâ*, iv, 27.  
*A diebus criticis*, iv, 36, 61.  
*Ab ictero*, iv, 62, 64.  
*Sudoris in febribus tempus*, iij, 6.  
*Diata*, j, 16; v, 65.  
*Cibus cui noceat*, vij, 65.  
*Nocet in paro-*

- xysmo*, j, 19.  
*Cura febris, quæ non est à bile*, vij, 42.  
*Morbum solvit*, ij, 26; iv, 57; v, 5; vj, 40, 44, 51; vij, 52.  
**Acuta.**  
*Tempus*, iiij, 7; ij, 14.  
*Ætas*, j, 14; iiij, 29.  
*Progn.* iv, 66; viij, 10.  
*A sudore*, iv, 37.  
*Diæta*, v, 67.  
**Ardens.**  
*Tempus*, iiij, 21.  
*Ætas*, iiij, 30.  
*Progn.* iv, 54.  
*A tempore*, viij, 1.  
*A tremore*, vj, 26.  
*Cura. Rigor solvit*, iv, 58.  
*Delirium quando*, vj, 26.  
**Continua.**  
*Tempus*, iiij, 21.  
*Progn. à sudore*, iv, 56.  
*A rigore*, iv, 46.  
*A Sputo*,  
*Urinâ et Excrementis*, iv, 47; vij, 69.  
*A spasmo*, iv, 49, vij, 73.  
*A delirio et Respiratione*, iv, 50.  
**Leipyria.**  
*Progn.* iv, 48; vij, 73.  
**Ephemera.**  
*Progn.* iv, 55.  
**Quotidiana.**  
*Sign.* iv, 63.  
*Quæ sit difficilis*, iv, 30.  
**Tertiana.**  
*Tempus*, iiij, 21.  
*Crisis*, iv, 59.

- Tertiana continua*, periculosa; intermit-  
tens, non,  
iv, 43; viij, 62.
- Quartana.  
*Tempus*, iij, 21, 22.  
*Sign. ab urinâ*,  
iv, 74.  
*Prog.* v, 70.  
*A tempore*, ij, 25.  
*Ab hæmorrhagia*, viij, 3.  
Symptomática, ij, 47; vj, 50.
- Vaga.  
*Tempus*, iij, 22.
- Longa.  
*Tempus*, iij, 16.  
*Ætas*, iij, 27.  
*Unde*, vj, 45; vij, 64.  
*Longæ futuræ sign.*  
*A sudore*, iv, 36.
- Ab urinis*, vij, 31.  
*Ab abscessu*, iv, 51.  
*Progn.* iv, 44; viij, 63.  
*Diæta*, v, 64.  
Lenta.  
*Diæta*, v, 64.  
Cum lassitudine.  
*Quibusdam jam*  
Lymphaticâ diætâ.  
*Sign. ab urinâ*,  
iv, 31.  
*Causa*, ij, 12.  
*Unde*, iv, 36, 61.
- FERRUM. *In curâ prog.* viij, 6.
- FLUOR MULIEBRIS.  
*Progn.* v, 56.
- FŒMINA. Vid. Mulier.
- FOTUS, SUFFITUS.  
Πυρία.  
*Menses movet*,  
v, 28.
- H h

- Oculorum dolores solvit*, vj, 31.  
*Ejus noxa*, v, 28.
- Επιαιμα.*  
*Experimentum circa prægnationem*, v, 59.
- FRIGUS.  
*Ætas*, iij, 14.  
*Ubi juvet*, v, 21, 23, 25.  
*Nocet*, v, 18, 20, 22, 23, 24.  
*Morbi à frig.* v, 17, 20, 24.  
*Particulare, quid notet*, iv, 39.  
*Progn. mala*, viij; ij, 12, 14.  
*Extremarum. progn.* vij, 1, 26.  
*In febre progn.* iv, 48, 7, 69.  
*Mutati, progn.* iv, 40; vij, 60.
- Mortis imago*, viij, 18.  
*Cura, calor*, ij, 22; v, 19.
- FUROR. Vid. in *Delirio Rabies.*
- G.  
 GEMELLI.  
*Alterutrius abortus*, v, 38.
- GENA. *Tenuis particula dissecta non coalescit*, vj, 19.
- GENITALIUM.  
*putredines. Tempus*, iij, 21.
- GENUUM *gravitas. Purgatio curat*, iv, 20.
- GIBBUS. *Progn.* vj, 46.
- GINGIVÆ. *Pru-*

- ritus. Vid. *in utero*, v, 43.
- Pruritus. 43.
- GRACILIS. Vid. *A febre*, v, 55.
- in Pingui.* *A morbo acuto*, v, 30.
- GRAVEDO. *Ab extenuatione*, p. n. v, 44.
- Tempus*, iij, 13, 20, 23.
- Progn. in sene*, iij, 40.
- Diurnæ tempus*, iij, 14.
- GRAVIDA. *Sign.* v, 41, 51, 61.
- Fætus locus*, v, 38, 48.
- Progn. à mam- mis*, v, 37, 38, 52, 53.
- A menstruis*, v, 60.
- A colore*, v. 42.
- A V. S.* v, 31.
- A diarrhœâ*, v, 34.
- A tenesmo*, vij, 27.
- Ab erysipelate*, *H.*
- HABITUS. *Progn.* iij, 34.
- Athleticus*, i, 15.
- Periculosus*, j, 3.
- HÆMOPTOE. Vid. *Sanguinis sputum.*
- HÆMORRHA- GIA. Vid. *Sanguinis fluxus.*
- HÆMORRHOI- DES. *Ætas*, iij, 30.
- Bona*, iv, 25; vj, 11.

- Curæ cautio*, vj,  
 21.  
*Solvunt deli-*  
*rium*, vj, 21.  
 HEPAR.  
*Dolorem 'febris*  
*solvit*, vij, 52.  
*Inflammati symp-*  
*tomata*, sive  
*sign.* v, 58.  
*Progn.* vij, 17.  
*Suppurati cura*  
*progn.* vij, 45.  
*Hydropis*, progn.  
 vij, 55.  
*Vulnus*, lethale,  
 vj, 18.  
 HERPES exedens.  
*Juvatur calore*,  
 v, 22.  
 HORROR.  
*Tempus*, iij, 5.  
*A sudore malus*,  
 vij, 4.  
*Vinum* solvit,  
 vij, 56.  
 HUMIDA NA-  
 TURA, sive  
 Corpus.  
*Ætas*, iij, 31.  
*Sign. sudor*, iv,  
 56; vij, 61.  
*Progn.* vj, 2.  
*Cura, fames*, vij,  
 59.  
*Evacuatio*, vij,  
 61.  
*Juvat siccitas*,  
 iij, 14.  
*Morbi*, iij, 11.  
 HUMORES ALII.  
*Progn.* vij, 69,  
 70.  
 HYDROA. Tem-  
 pus, iij, 21.  
 HYDROPS.  
*Tempus*, iij, 22.  
*Causa*, ab hæ-  
*morrhoidibus*  
*curatis*, vj,  
 12.  
*A liene*, vj, 43.  
*Ab hepatis hy-*  
*drope*, vij, 55.  
*A leucophlegma-*  
*tiâ*, vij, 74.

- Progn à causis*,  
vj : 43 ; vij,  
55.
- A tempore*, viij,  
8.
- Tussis desperata  
est*, vj, 35 ;  
vij, 47.
- Bona in delirio*,  
vij, 5.
- Curæ cautio*, vj,  
27.
- Solutio*, vj, 14.
- Ulcus difficile*,  
vj, 8.
- Sicca, unde*, iv,  
11.
- HYEMS.** Vide.  
Tempestas.
- HYPERCATHARSIS.**  
Vid. Purgatio.
- HYPPOCHONDRIA.**  
*Murmuris, progn.*  
iv, 73.  
*Diata*, v, 64.
- Doloris progn.* vj,  
40.
- Duritie in Ictero  
progn.* iv, 64.
- HYPPOGASTRIUM.**  
*Dolor, quid notet.*  
iv, 80 ; vij, 39.
- HYSTERICA.**  
*Sternutatio ju-  
vat*, v, 35.
- I.
- ICTERUS.**  
*Non est flatu-  
lentus*, v, 72.  
*Prog. ab hepate*,  
vj, 42 ; iv, 64.  
*Progn. quando  
noxius*, iv, 62.  
*Utilis*, iv, 64.
- JEJUNIUM.** Vid.  
Fames.
- IGNIS.** *Curæ prog.*  
vij, 6.
- ILEUS.**  
*Tempus*, iij, 22.

- Progn. à strangu-  
guriâ , vj , 44.*  
*A variis , vij ,*  
 10.  
**IMBECILLITAS.**  
*Sign. ij , 28.*  
**IMPETIGINES.**  
*Tempus , iij , 20.*  
**INFLAMMATIO.**  
*Recens , frigore  
curatur , v , 23.*  
**INSANABILIA.**  
*vij , 6.*  
**INSTABILIA, quæ**  
*ij , 27 , 52.*  
**INTESTINUM.**  
*Tenuis vulnus le-  
thale , vj , 18.*  
*Non coalescit ,*  
*vj , 24.*  
*Recti inflammat.*  
*symptoma , v ,*  
 59.  
**ISCHIADICUS**  
**DOLOR.**  
*Tempus , iij , 22.*  
*Progn. vj , 59 ,*  
 60.
- JUDICIUM.** *Dif-  
ficile , j , 1.*  
**JUVANTIA, NO-  
CENTIA , ij ,**  
 27.
- L.**
- LABIA.**  
*Prog. viij , 13.*  
*In febre conti-  
nua , vj , 49 ;*  
*vij , 73.*  
**LAC.**  
*In menstruis de-  
ficientibus , v ,*  
 39.  
*In gravida , prog.*  
*v , 52.*  
*Quibus conve-  
niat , v , 64.*  
**LACRYMÆ.**  
*Ætas , iij , 31.*  
*Progn. in morbis.*  
*iv , 52 ; viij , 2.*  
**LASSITUDO.**  
*Sign. ex urinâ ,*  
 v , 74.



*Progn. in febre,*  
iv, 31.

*Cura quies,* ij,  
48.

*Spontaneæ. progn.*  
ij, 5.

LATUS. *Dolor.*  
Vid. *Dolor.*

LEPRA. *Tempus,*  
iij, 20.

LETHALE VUL-  
NUS. vid.  
Vulnus.

LETHARGUS.  
*Tempus,* iij, 23.

*Ætas,* iij, 30.

LEUCOPHLEG-  
MATIA.

*Progn.* vij, 74.

*Solvitur diar-*  
*rhæâ,* vij, 29.

LICHENES. *Tem-*  
*pus,* iij, 20.

LIENOSUS.  
*Tempus,* iij, 22.

*Progn.* vj, 43;  
vij, 8.

*Dysenteriâ uti-*

*lis,* vj, 48.

LIENTERIA.

*Tempus,* iij, 22.

*Ætas,* iij, 30.

*Causa in Lie-*  
*nosis,* vj, 43.

*A dysenteriâ,* vij,  
76.

*Progn. à ructu,*  
vj, 1.

*Cautio in pur-*  
*gatione,* iv,  
12.

LINGUA.

*Progn.* vij, 40;  
vij, 9.

LOCUS. vid. *Re-*  
*gio,*

LUMBUS. *Dolor.*  
vid. *Dolor.*

M.

MAMMÆ.

*Progn. à lacte,*  
v, 39.

*A sanguine,* v,  
40.

Ii ij

- In gravidâ , ab  
extenuatione ,  
v , 37 , 53 .  
Alacte , v . 52 .*
- MANIA.** Vid. in  
Delirio.
- MELANCHOLIA.**  
*Tempus , iij , 14 ,  
20 , 22 .  
Sign. vij , 40 .  
Causa. Timor &  
mæstitia , vj ,  
23 .  
Progn. vj , 11 ,  
56 .  
Purgatio , iv , 9 .*
- MENS.**  
*Progn. ij , 23 ;  
viiij , 16 .  
Laborantis sign.  
ij , 6 .*
- MENSTRUUA.**  
*Erumpentia , mor-  
bos pueritiæ  
solvunt , iij ,  
28 .  
Vomitum san-*
- guinis curant ,  
v , 32 .*
- Sistuntur in gra-  
vidâ , v , 61 .*
- Fluentium progn.  
v , 60 .*
- Deficientia.  
Sign. v , 39 .  
Progn. v , 57 ;  
vj , 29 .  
Sanguis è nari-  
bus juvat , v ,  
23 .  
Cura suffitus , v ,  
38 .*
- Nimia.  
Progn. v , 57 .  
Cura , v , 50 .*
- Coloris vitiati Cu-  
ra , v , 36 .*
- MORBUS.**  
*Coctio in morbo ,  
1 , 2 .  
Progn. 1 , 12 ;  
ij , 33 , 34 , 35 ;  
iij , 3 ; viij , 1 .*
- MORBI SEDES ,  
sive Focus ,**

- iv, 33, 38,  
39.
- MORBUS FUTU-  
RUS.**  
*Tempus*, iij, 1,  
19.  
*Sign.* ij, 5.  
*Causa. Cibi co-  
pia*, ij, 17.
- MORBI PRINCI-  
PIUM.**  
*Remissius est*,  
ij, 30.  
*Ab atrabile, le-  
thale*, iv, 22.  
*Rarò purgan-  
dum.* j, 22, 24.  
*Si quid moven-  
dum, statim  
move*, ij, 29;  
iv, 10.
- Morbi Vigor.**  
*Vehementior est*,  
ij, 30.  
*Diata tenuis*,  
j, 8, 20.  
*Nil movendum*,  
ij, 29.
- Morbi Finis.**  
*Remissior est*,  
ij, 30.
- MORBUS ACU-  
TUS.**  
*Tempus*, iij, 9.  
*Sign.* j, 7.  
*Ab urinâ*, vij,  
32, 35.  
*Prædictio incer-  
ta*, ij, 28.  
*Progn.* viij, 10.  
*Mala, à suspi-  
riis*, vj, 54.  
*Frigore extrema-  
rum*, vij, 1.  
*Lethalis ab ex-  
crementis*, iv,  
23.  
*In gravidâ*, v,  
30.  
*Diata*, j, 4, 7.  
*Purgatio*, j, 24;  
iv, 10.  
*Crisis in XIV  
diebus*, ij, 23.
- MORBUS LON-  
GUS.**

- Futuri *sign.* j, 12;  
 ij, 18; iv, 40;  
 vij, 60.  
*A sudore*, iv, 36,  
 37, 56.  
*Ab urinâ*, vij,  
 31, 34.  
*Ab abscessu*, iv,  
 51.  
 Existentis *progn.*  
*ab appetitu*  
*prostrato*, vij,  
 6.  
*Ab excrementis*,  
 iv, 23; viij, 6.  
*Ab alvi fluxu*,  
 viij, 5.  
*Diæta tenuis pe-*  
*riculosa*, 1, 4.  
 MORBUS PERI-  
 CULOSUS.  
*In genere*, ij, 34;  
 viij, 1, 8.  
*Remedium quale*,  
 j, 6.  
 MORBUS.  
*Judicatu facilis*,  
 j, 12; iij, 8.  
*Difficilis*, j, 12;  
 iij, 8; iv, 29,  
 30.  
 MORBUS RECI-  
 DIVUS.  
*Causa*, ij, 12.  
*Futuri sign.* iv,  
 36, 61.  
 MORBUS INSA-  
 NABILIS.  
 viij, 6.  
 MORS.  
*Propinqua.*  
*Sign. à variis*,  
 vj, 38; viij,  
 11 ad 18.  
*Ab excrementis*,  
 iv, 23.  
*In feb. contin.*  
 iv, 49; vij,  
 73.  
*Certa*, vj, 27.  
*Subita. Sign.* ij,  
 41, 44.  
 MORTIFERUM,  
*lethale.*  
 Θάσιμον, Θανατῶ-  
 δες. ij, 1, iij,

- 9; iv, 22, 24,  
 26, 34, 39,  
 37; 46, 48,  
 50; v, 1, 2,  
 11, 14, 22,  
 30, 43; vj,  
 18, 27, 52;  
 vij, 25, 72,  
 73, 79; viij,  
 11, 13, 14,  
 15, 16, 17,  
 18.
- MOTUS, QUIES.  
*Se invicem cu-  
 rant, ij; 22,  
 48.*  
*Effectus in purg.*  
 ij, 14, 15.  
*Progn.*
- MULIER,  
*Non est ambi-  
 dextra, vij,  
 43.*  
*Fœcundæ tem-  
 peramentum,*  
 v, 62.  
*Sign. v, 59.*  
*Infœcunda, crassa*
- p. n. v, 46.*
- MUTATIONES.  
*Subitarum progn.*  
 ij, 51.  
 Caloris, Coloris,  
 Tempestatis.  
 Vid. Calor,  
 Color, Tem-  
 pestas, &c.
- MUTUS.  
*Causa, vij, 58,*  
*Progn. vj, 51.*  
*Ab ebrietate, v,  
 5.*
- N.
- NARES.  
*Progn. in feb.*  
*contin. iv, 49;*  
 vij, 73.  
 Humidarum ætas,  
 iij, 31.  
 Et Siccarum  
*progn. vj, 2.*  
 Hæmorrhagiæ in  
*quartaná prog.*  
 viij, 3.

- Pus, solvit dolorem Capitis,*  
 vj, 10.  
*Compressarum vis,* v, 49.  
**NATURA.**  
*Inimicum. Vid. Nimium.*  
*Differentia,* ij, 1.  
*Progn. ij,* 34;  
 vj, 2; viij, 1, 8.  
**NEPHRITIS.**  
*Ætas,* ij, 31.  
*Sign. ab urinâ,*  
 vij, 34, 35.  
*Progn. vj,* 36.  
*In senibus,* vj, 6.  
*Hæmorrhoides utiles,* vj, 11.  
**NERVUS.**  
*Calor juvat,* v, 18.  
*Frequentior debilitat,* v, 16.  
*Resectus non coalescit,* vj, 19;  
 vij, 28.  
**NIGROR.**  
*Causa frigus,* v, 17, 20.  
**NIMIUM, Naturæ est inimicum.**  
*In omnibus,* ij, 51.  
*In cibo,* j, 4, ij, 4, 17.  
*In somno, vig. ij,* 3, vij, 71.  
**O.**  
**OCCASIO. Celestis,** j, 1.  
**OCULI.**  
*Progn. iv,* 52;  
 viij, 2.  
*In febre continuâ,* iv, 49;  
 vij, 73.  
*In vomitu,* vij, 3.  
*In somno,* vj, 52.

- Ophthalmia.  
*Tempus*, iij, 11,  
 14, 16, 21.  
*Solutio*, vj, 17.  
 Doloris, *cura*,  
 vj, 31; vij,  
 46.  
 Tarditatis et  
 Morsus *tempus*,  
 iij, 17.  
 Hebetudinis.  
 Glaucomatis et  
 Humiditatis *atas*,  
 iij, 31.  
 Cæcitas, *in me-*  
*lancholicis*,  
 vj, 56.  
 OFFICIUM Me-  
 dici, ægri, &c.  
 j, 1.  
 OMENTUM.  
 Crassius, *infæ-*  
*cundam facit*,  
 v, 46.  
 Excidens *putres-*  
*cit*, vj, 58.  
 ORGASMUS.  
 Vid. Turgens  
 materia.  
 OS.  
 Ulcerationum,  
*tempus*, iij,  
 21.  
*Ætas*, iij, 24.  
 Amari, *cura*, iv,  
 17.  
 OSCITATIO.  
*Solvitur vino*,  
 vij, 56.  
 OSSA.  
*Frigus ledit*, v,  
 18, 22.  
 Laborantis *progn.*  
 vij, 2.  
 Nudati *progn.* vij,  
 19.  
*Cura*, calor *ju-*  
*vat*, v, 22.  
 Dissectum, *non*  
*coalescit*, vj,  
 19, vij, 28.  
 Fracta calor *ju-*  
*vat*, v, 22.  
 Abscessus, *in ul-*  
*cere diuturno*,  
 vj, 45.  
 Kk

- Asphacelo*, vij, 77.
- P.
- Παραγαστή.
- PAROXYSMUS.**  
*Sign.* j, 12; ij, 13.  
*Progn.* iv, 30.  
*Cibus nocet*, j, 11, 19.
- PARTUS DIFFICILIS.**  
*In tenuitate p. n.* à feb. v, 55.  
*Sternutatio iuvat*, v, 35.
- PECTEN.** *Dolor quid notet*, vij, 39.
- PECTUS.** *Frigus lædit*, v, 24.  
*Dolor.* Vid. *Dolor.*
- PERINÆUM.**  
*Dolor quid notet*, iv, 80; vij, 39.
- PERIPNEUMONIA**, vid. in *Pleuritide.*
- PERVERSA**, sive *Distorta pars.*  
*Progn. in feb.* iv, 35, 49; vij, 58, 73.
- PHLEBOTOMIA.** Vid. *V. S.*
- PHRENITIS.** Vid. *Delirium.*
- PHTHISIS.**  
*Tempus*, iij, 13, 16, 22.  
*Ætas*, iij, 29; v, 9; viij, 7.  
*Causa*, à *pleuritide*, v, 15.  
*A sputo sanguinis*, vij, 15, 56, 78.  
*Puris*, vij, 16, 78.  
*Ab hæmorrhoidibus*, vj, 12.  
*Progn. lethalis.*



- A tempore*, iij,  
 10.  
*A naturá*, viij,  
 8.  
*A diarrhæâ*, v,  
 12, 14, vij,  
 78.  
*A sputo*, v, 11;  
 vij, 16; 78.  
*Puris purgatio*  
*sursùm*, vij,  
 78.  
*Diæta*, v, 64.  
*Purgatio*, iv. 8.  
 PINGUES, Crassi.  
*Progn.* 11, 35.  
*Mortis*, 11, 44.  
*Purgatio*, ij, 35;  
 iv, 7.  
 Gracilis.  
*Purgatio*, ij, 35;  
 iv, 6.  
*Gravidæ*; p. n.  
*progn.* v. 44.  
 PITUITA.  
*Conclusæ solutio*,  
 vij, 74.  
*Fluxus à capite*,  
 vij, 30.  
 PLEURITIS:  
*Tempus*, iij, 23.  
*Ætas*, iij, 30.  
*Qui minus ob-*  
*noxii*, vj, 33.  
*Progn.* vij, 11.  
*A sputo*, quoad  
*tempus*, j, 12;  
 v, 8, 15.  
*Diarrhæa leth-*  
*alis*, vj, 16.  
 Dolor. Vid. Do-  
 lor. Lateris.  
 Peripneumonia.  
*Tempus*, iij, 23.  
*Ætas*, iij, 30.  
*Progn.* vij, 12.  
*Mala à pleuriti-*  
*de*, vij, 11.  
*Diarrhæa leth-*  
*alis*, vj, 16.  
 PLUVIA, vid. in  
 Tempestate.  
 PODAGRA.  
*Tempus*, iij, 56,  
 20; vj, 55.  
*Ætas*, iij, 31.

- Causa*, vj, 29, 30.
- Qui non obnoxii*, vj, 28, 29, 40.
- Progn.* vj, 49.
- Dolorem frigida solvit*, v, 25.
- POTUS.
- Consuetus præfertur*, ij, 38.
- Effectus*, ij, 11.
- Multi progn.* vij, 7.
- PRÆDICTIO.
- Acutorum incerta*, ij, 19.
- PRÆGNANS.
- Vid. Gravida.*
- PRÆPUTIUM.
- Resectum non coalescit*, vj, 19.
- PRURITUS.
- Gingivarum ætas*, ij, 25.
- Corporis totius ætas*, ij, 31.
- PURGATIO PER ALVUM.
- Purgandum.*
- Vere*, vj, 47.
- Hyeme*, iv, 4.
- Non purgandum.*
- Æstate*, 1, 7, 9.
- Sub Cane, &c.* iv, 5.
- In vigore morbi*, ij, 29.
- In extenuatis*, ij, 35; iv, 6.
- Qui purgandi*, ij, 8; iv, 18, 20; vij, 67.
- Quæ purgandæ*, v, 36.
- Purgandi.*
- Difficulter vomentes*, iv, 7.
- Melancholici*, iv, 9.
- Tabidi*, iv, 8.
- Oculis dolentes*, vj, 31.
- Debilis sudans*, vij, 61.

- Gravida*, quando. iv, 1; v, 29.
- Purganda*.  
*Concocta*. j, 22.  
*Turgentia*, iv, 1, 10; v, 29.
- Quâ viâ purgandum, j, 21; vij, 61.
- Præparatio ad purgationem, ij, 9; iv, 13; vij, 70.
- Quantâ purgatione opus, j, 23.
- Juvanda, aut Sistenda, quomodo, iv, 14, 19.
- Finis sign. iv, 12.  
*Progn. ab excrementis*, iv, 21.  
*A spasmo*, v, 1; vij, 25.
- Bonæ purgationis sign. j, 2, 23, 25; iv, 2, 3.
- Noxia.  
*In genere*, j, 2, 25; iv, 2, 3.  
*Sub Cane*, &c. iv, 5.  
*In sanis*, ij, 36, 37; iv, 16.  
*In Crisi*, j, 20.
- Spontaneæ progn. j, 1, 2.
- Hypercatharsis.  
*Progn.* v, 4; vij, 41.
- PUS.  
*Generationis sign.* ij, 47.  
*Calor juvat*, v, 22.  
*Frigus impedit*, v, 20.  
*Progn.* vj, 41; vij, 8.  
*Boni nota*, vij, 44, 45.  
*Curæ cautio*, vj, 27.
- Puris sputum.

- Causa à sanguinis sputo*, vij, 15, 18.
- A vomitu sanguinis*, vij, 78.
- E** capite effluens, *ejus dolorem solvit*, vi, 10.
- In ventre, *Causa*.  
vj, 20; vij, 22.
- In urina, *quid notet*, iv, 75, 81.
- In utero, *Cura*, v, 47.
- PUSTULÆ.**  
Ulcerosæ. *Vere fiunt*, iij, 20.  
Datae, *quales sint*, vj, 9.
- PUTREDINES.**  
*Tempus*, iij, 16, 21.
- Q.**
- QUIES.** Vid. in Motu.
- R.**
- RABIES.** Vid. in Delirio.
- RAUCEDO.**  
*Tempus*, iij, 13, 20, 23.  
*Progn. in sene*, ij, 40.
- RATIO.** Vid. Mens.  
*Rationi fidendum.*  
ij, 27, 52.
- RECIDIVUS MORBUS.**  
Vid. Morbus recidivus.
- REFECTIO.** Vid. Cibus.
- REGIO.**  
*Cautio in Diæta*, j, 17.

- In Medicamentis*, j, 2.  
*Mutatio, quos juvet*, ij, 45.  
**REMEDIIUM.**  
*Quali opus*, j, 6.  
*Gradus*, vij, 6.  
**RENES.**  
*Sanguinis profluentis sign.* iv, 57, 78.  
*Suppuratorum symptomata*, v, 58.  
*Ulceris, sign.* iv, 75.  
*Pili, et Carunculæ*, iv, 76.  
**REPLETIO.**  
*Differentia*, ij, 11.  
*Extrema periculosa*, j, 3, 4; ij, 4, 17, 51; vj, 39.  
*Cura*, ij, 22.  
**RESPIRATIO,** difficilis. *Dyspnoea.*  
*Ætas*, iij, 31.  
*Progn. in febre*, iv, 68.  
*In feb. contin.* iv, 50.  
**RIGOR.**  
*Causa, frigus*, v, 17, 20.  
*Focus*, v, 62.  
*Signum est quotidianæ feb.* iv, 63.  
*Solvit feb. ardentem*, iv, 58.  
*Progn. in febre*, iv, 29, 46.  
*Malus à multo potu*, vij, 7.  
*Cura, calor mitigat*, v, 22.  
**RUCTUS ACIDUS.**  
*Progn.* vj, 33.  
*Bonus in lienteria quando*, vj, 1.  
 Ll ij

S.

## SANGUIS.

Collecti in mammas progn. v, 40.

Fluxus tempus, iij 20.

Causa, calor, v, 16.

Frigus, v, 23.

Progn. in feb. iv, 27.

A convulsione, &c. v, 3; vij, 9.

Malus in ulcere, viij, 21.

Dieta, v, 64.

Cura, frigus, v, 19, 23.

E capite progn. vj, 10.

Per nares.

Ætas, iij, 27.

Progn. in quartana, viij, 3.

Bonus in mens- truis deficien- tibus, v, 33.

Solvit surdita- tem, vj, 60.

Capitis dolorem, vj, 10.

Abscessum, iv, 74.

In ventrem progn. vj, 20.

Sputum.

Ætas, iij, 29.

Progn. vij, 15, 78.

In feb. contin. iv, 27.

Spumans, è pul- mone, v, 13.

Vomitus.

Progn. Bonus si- ne febre, vij, 37.

Malus, ij, 25.

Cum febre, vij, 37.

Tabes sequitur, vij, 78.

- Cum urina, *quid nocet*, iv, 78, 80, 81; vij, 39.
- Per alvum.  
*Niger bonus*, iv, 25.  
*Malus*, iv, 21, 22.
- SANITAS. *Sign.* vj, 2.
- SATIETAS. *Quæ mala*, ij, 4.  
 Vid. Repletio.
- SATYRIASIS.  
*Ætas*, iij, 26.
- SECUNDÆ.  
*Sternutatio expellat*, v, 49.
- SEMEN. *Progn.* iv, 2.
- SENEC. Vid. in *Ætate*.
- SEPTUM TRANSVERSUM.  
*Vulnus lethale*, vj, 18.
- SICCITAS. Vid. in *Tempestate*.
- SIGNA. Vid. *Affectus*, *cujus sunt*.
- SINGULTUS.  
*Causa*, vj, 39.  
*Ab hepate inflammato*, v, 58.  
*Progn. malus in hæmorrhagia*, v, 3.  
*In hypercatharsi*, v, 4; vij, 41.  
*A vomitu*, vij, 3.  
*Ab Ileo*, vij, 10.  
*Ab hepate inflammato*, vij, 17.  
*Cura*, *sternutatio*, vj, 13.
- SITIS.  
*Non magna ubi.*  
*Progn. noctur-*

- na*, v, 27.  
*In purgante*, iv, 19.  
*In feb. Leipyria*, iv, 48; vij, 72.  
*Diæta. Lac nocet*, v, 64.  
*Expletur citiùs, quàm fames*, ij, 11.
- SOMNUS VIGILIAE.**  
*Mali*, ij, 3; vij, 71.  
 Somnus.  
*Progn. ij*, 1.  
*In febre*, iv, 62.  
*In vertigine*, viij, 15.  
*Bonus, in delirio*, ij, 1.  
*Post sitim*, v, 27.  
*Effectus*, iv, 14, 15.  
*Longi tempus*, j, 15.
- Vigiliæ.**  
*Ætas*, iij, 24, 31.  
*Prognosis mala*, vij.
- SPASMUS, Convulsio.**  
*Ætas*, iij, 25.  
*Causa, Frigus*, v, 17, 20.  
*Repletio, aut Inanitio*, vj, 39.  
*In melancholicis*, vj, 56.  
*In ulcere, quando*, v, 65.  
*Futuri in febre sign.* iv, 68.  
*Progn. in febr.* ij, 26.  
*Malus in febre*, iv, 66, 67.  
*In vigiliis*, vij, 18.  
*In ardore*, vij, 13.  
*In hæmorrhagia,*



- v, 3, vij, 9.  
*In lleo*, vij, 10.  
*Ab Elleboro*, iv, 16.  
*Ab hypercatharsi*, v, 4.  
*In fluore muliebri*, v, 56.  
*Lethalis. In febre cont.* iv, 49.  
*A purgante*, vij, 25.  
*Ab Elleboro*, v, 1.  
*In ebrio*, v, 5.  
*In teste dextro*, viij, 11.  
*In vulnere*, v, 2.  
*Cura. Calor mitigat*, v, 22.  
*Frigus levat*, v, 25.  
*Solvitur à febr.* iv, 57.  
*A quartana*, v, 70.
- Tetanus.*  
*Causa, frigus*, v, 17, 20.  
*In ulcere quando*, v, 65.  
*Progn.* v, 6.  
*Malus in ardore*, vij, 13.  
*Cura, frigida*, v, 21.  
*Calor mitigat*, v, 22.  
*Solvitur à febr.* iv, 57.
- SPIRITUS. Vid. *Respiratio.*
- SPUMA.  
*Oris, progn.* ij, 43.  
*In sputo sanguinis, unde*, v, 13.  
*In alvi excrementis, unde*, vij, 30.  
*Bullæ in urina, quid notent*, vij, 34.

## SPUTUM.

*Progn. in feb.**contin. iv, 47;**vij, 69.**In pleuritide, j,**12.**In phthisi, v,**11; vij, 78.*

Sanguinis. Vid.

Sanguinis sputum.

Puris. Vid. Puris

sputum.

## STATURA COR-

PORIS. ij,

54.

## STERILIS.

Mas, v, 61.

Mulier. Vid. Mu-

lier.

## S T E R N U T A -

T I O.

*Causa, vij, 1.**Solvit singul-**tum, vij, 1.**Juvat partum dif-**ficilem, v, 35.**Expellit secun-**das, v, 49.*

## STRANGULA-

T I O.

*Progn. ij, 43.*

## STRANGURIA.

*Tempus, iij, 16,**20, 22.**Ætas, iij, 31.*

Symptomata, iv,

80; v, 58;

vij, 39.

*Progn. ab Ileo,**vj, 44.**Cura. V. S. et**vinum, vij,**48.*

## STRUMA. Ætas,

iij, 26.

## STUPOR.

*Malus in vulne-**re Capitis, vij,**14.*

## SUDOR.

*In febre, tempus,**iij, 6.**In morte, cui, v,**71.**Particularis, mor-*

- bi sedem notat*, iv, 38.  
*Progn.* j, 12 ; vij, 79.  
*In febre*, iv, 36.  
*Malus in feb. contin.* iv, 56.  
*In crisi, qualis*, vij, 4.  
*Horror malus*, vij, 4.  
*Calidus, quid notet*, iv, 42.  
*Frigidus, malus*, iv, 42 ; viij, 4.  
*Progn. in feb.* iv, 37.  
*Multus et Continuus, quid notet*, iv, 42 ; vij, 61.  
*A somno, unde*, iv, 41.  
*Ubi malus*, viij, 4.  
*Cura*, iv, 41 ; vij, 61.
- Hydroa, Tempus*, iij, 2.  
**SUFFITUS.** Vid. *Fotus.*  
**SUFFOCATIO.**  
*Progn. in febre*, iv, 34.  
**SUPERCILIUM.**  
*Distorti, in feb. contin. progn.* iv, 49 ; vij, 73.  
**SURDITAS.**  
*In febre contin. lethalis*, iv, 49 ; vij, 73.  
*Solutio per alvum*, iv, 28.  
*In febre*, iv, 60.  
**SUSPIRIA.**  
*In acutis, cum feb. mala*, vj, 54.  
 Vid. *Respiratio.*
- T.
- TABES.** Vid. *M m*

- Phthisis. iiij, 18.
- TEMPESTAS  
ANNI.
- Concedendum*  
*ei*, j, 2, 17.
- Morbos indicat*,  
j, 12.
- In alia alii mor-  
bi fiunt*, iiij,  
19.
- Progn.* ij, 34;  
viij, 8.
- Mutatio.
- Morbi causa*, iiij,  
1, 4, 8.
- Quos juvet*, ij,  
45.
- Siccitas.
- Salubris*, iiij, 11.
- Morbi*, iiij, 7,  
16.
- Pluvia.
- Minus salubris*,  
iiij, 15.
- Morbi*, iiij, 16.
- Ver.
- Salubris*, iiij, 9.
- Pueris conducit*,  
iiij, 18.
- Diæta*, j, 15,  
18.
- Medicina facien-  
da*, vj, 47;  
viij, 53.
- Morbi*, iiij, 20;  
vj, 55.
- Progn.* iiij, 11,  
12.
- Æstas.
- Senibus utilis*,  
iiij, 18.
- Diæta*, j, 18.
- Purgatio*, iv, 4,  
6.
- Morbi*, ij, 25;  
iiij, 6, 21.
- Progn.* iiij, 2, 6,  
13, 14; viij, 8.
- Autumnus.
- Ætas media va-  
let*, iiij, 18.
- Diæta*, j, 18.
- Periculosus est*,  
iiij, 9.
- Malus tabi*, iiij,  
10.

- Morbi* , ij , 25 ;  
 iij , 4 , 22 ; vj ,  
 55.  
*Progn.* iij , 4 , 13 ,  
 14.
- Hyems.  
*Mediæ ætati*  
*commoda* , iij ,  
 18.  
*Diæta* , j , 15 , 18.  
*Purgatio* , iv , 4 ,  
 7 , 9 , 12.  
*Morb.* ij , 25 ; iij ,  
 23.  
*Progn.* iij , 2 , ij ,  
 12 , viij , 8.
- TENESMUS.  
*Progn. in gra-*  
*vida* , vij , 27.
- TERROR.  
*Ætas* , iij , 24.  
*Malus in febre* ,  
 iv , 67.
- TESTES.  
*Progn. à convul-*  
*sione* , vij , 11.
- TETANUS. Vid.  
 in Spasmo.
- TIMOR. Longi  
*Effectus* , vj ,  
 23.
- TONSILLÆ.  
*Inflammationis*  
*ætas* , iij , 26.
- TORPOR.  
*Effectus* , v , 25.
- TRANSPIRATIO  
*Progn.* vij , 79 ;  
 viij , 18.  
*In Viro* , v , 63.
- TREMOR.  
*Solutio in feb.*  
*ardente* , vj ,  
 26.
- TRISTITIA. Lon-  
 gæ  
*Effectus* , vj , 23.
- TUBERCULA ,  
 τῦματα.  
*Tempus* , iij , 20.  
*Ætas* , iij , 26.  
*Progn. à ruptio-*  
*ne* , vij , 8.  
*Curæ Cautio* , ij ,  
 15.  
*In articulis in feb.*

- longis*, iv, 44;  
 vij, 63.  
*Causa*, *Cibi copia*. iv, 45;  
 vij, 64.  
*Cura*, *frigida levat*, v, 25.  
 In urethra.  
*Solutio*, iv, 82;  
 vij, 57.  
 Εξανθήματα, vj,  
 9.  
**TUMOR.**  
*Progn. mollis bonus*, v, 67.  
*Evanescens progn.* v, 65.  
 In ulcere *progn.*  
 v, 66.  
**TURGENS** *materia ubique et semper educenda*, j, 22;  
 iv, 1, 10; v,  
 29.  
**TUSSIS.**  
*Tempus*, iiij, 5,  
 13, 20, 23.
- Ætas*, iiij, 24,  
 31.  
*Causa*, *frigus*,  
 v, 24.  
*Progn. in hydrope desperata*,  
 vi, 35; vij,  
 47.  
*Siccæ in feb. ardente progn.*  
 iv, 54.  
*Gibbi à tusse*,  
*progn.* vj, 46.
- V.
- VARICES.**  
*Calvis non fiunt*,  
 vj, 34.  
*Solvunt delirium*, vj, 21.  
**VENÆ SECTIO.**  
*Vere instituenta*, vj, 47;  
 vij, 53.  
*Quanta opus*, j,  
 23.  
*Juvat in Capi-*

- tis dolore*, v, 68.  
*Solvit oculorum dolorem*, vj, 31; vij, 46.  
*Dysuriam*, v, 36.  
*Stranguriam*, vij, 48.  
*Fluxiones*, vj, 22.  
*Nocet gravidæ*, v, 31.  
**VENTRICULUS.**  
*Æstus et Dolor*, in feb. malus, iv, 65.  
*Cura*, purgatio, iv, 17.  
*Vulnus*, lethale, vj, 18.  
**VENTUS.**  
*Auster. Morbi*, iij, 5, 17.  
*Progn.* iij, 12, 13.  
*Boreas. Morbi*, iij, 5, 17.  
*Progn.* ij, 11, 12, 13, 14.  
**VENTRIS.** Mutatio. Vid. Alvi Mutatio.  
*Partes*, vid. Pinguis.  
*Dolor.* Vid. Dolor.  
*Calor.* Vid. Calor.  
*Ventris turbatio.*  
*Solvit surditatem*, iv, 60.  
*Spontanæ progn.* j, 2.  
**VER.** Vid. in Tempestate.  
**VERATRUM.**  
 Vid. Elleborus.  
**VERMES** et  
**VERRUCÆ.** *Ætas*, ii, 26.  
**VERTICULUM.**  
*Luxationis ætas*, iij, 26.  
**VERTIGO.**

- Tempus*, iiij, 17, 23.  
*Ætas*, iiij, 31.  
*Tenebricosa, mala*, viij, 15.  
*Cura, purgatio*, iv, 17.  
**VESICA.**  
*Laborantis, sign.* iv, 80; viij, 39.  
*Progn. in sene*, vj, 6.  
*Calor iuvat*, v, 22.  
*Calculi, ætas*, iiij, 26.  
*Sign.* iv, 79.  
*Vulnus, lethale*, vj, 18.  
*Ulceris, sign.* iv, 75, 81.  
*Scabiei, sign.* iv, 77.  
**VIGILIÆ.** Vid. in Somno.  
**VIGOR.** Vid. Morbi Vigor.  
**VINUM** Curat.
- Θάρσις, *fames*, ij, 21.  
 Ἀκρίτων, *oculorum dolores*, vj, 31; viij, 46.  
 Ἰσχυρατες, *affectus varios*, viij, 56.  
**VISCERA** Dolor. Vid. Dolor.  
**VISUS.**  
*Progn. in febre contin.* iv, 49; viij, 73.  
*Hebetis, tempus*, iiij, 5.  
*Ætas*, iiij, 31.  
**VITA.**  
*A calore est*, viij, 18.  
*Brevis est*, j, 1.  
**ULCUS.**  
*Tempus*, iiij, 10, 21.  
*Progn.* vj, 4.  
*A pulsu*, viij, 21.  
*A tumore*, v, 65.



I N D E X. 351

- In hydrope*, vj, 8.  
*Juvat calor*, v, 22.  
*Nocet frigus*, v, 20, 22.  
 Diurni, progn. vj, 45.  
 Opis. Vid. oris ulceratio.
- UMBILICUS.**  
*Inflammationis ætas*, iij, 24.  
*Doloris progn.* iv, 11.
- UNGUES.**  
*Nigrorum progn.* viij, 12.
- VOMITUS.**  
*Tempus*, iij, 21.  
*Ætas*, iij, 24.  
*A tuberculo rupto*, vij, 8.  
*Ubi opus*, iv, 17, 18; vij, 61.  
*Ætate convenit*, iv, 4, 6.  
*Præparatio*, vij, 70.
- Progn.* j, 23; vij, 3.  
*Malus in Ileo*, vij, 10.  
*In Lienteria hyeme*, iv, 12.  
 Spontaneus, prog. j, 2.  
*Solvit diarrhæam*, vj, 15.  
 Sanguinis. *Progn.* vij, 78.  
*A febr.* vij, 37.  
*Malus*, iv, 25.  
*Cura*, vij, 37.  
*Solutio*, per menstrua, v, 32.  
*Bilis in Cerebro diviso*, vj, 50.  
*Ab atrabile, lethalis*, iv, 22.
- URETHRA.**  
 Tuberculi, *solutio*, iv, 82; vij, 57.
- URINA.**  
 Alba, pellucida, mala, iv, 72.

- Alba, multa crassa, *abscessu liberat*, iv, 74.
- Crassæ, grumossæ, paucæ, *progn.* iv, 69.
- Multa, *noctu quid notet*, iv, 83.
- Solvit morbum*, vj, 54; vij, 73.
- Nubeculæ, *progn.* iv, 71.
- Sedimentum. *Progn.* iv, 69.
- Biliosum*, *quid notet*, vij, 32.
- Divulsa, *quid notet*, vij, 33.
- Turbata, *quid notet*, iv, 70.
- Fœtida, *quid notet*, iv, 81.
- Bullarum, *progn.* vij, 34.
- Pinguedo, *quid notet*, vij, 35.
- Sanguis, *e renibus aut vesicâ*, iv, 75.
- Erenibus*, iv, 78.
- E vesicâ*, iv, 80, 81; vij, 39.
- Sanguis et grumi, *quid notent*, iv, 80; vij, 39.
- Grumosæ, *progn.* iv, 69.
- Pus, *unde*, iv, 75, 81.
- Carunculæ, *et Pili*, *unde*, iv, 7.
- Farinam crassiorem *referentis progn. in feb.* vij, 31.
- Furfures, *quid notent*, iv, 77.
- Squammæ, *quid notent*, iv, 81.
- Arena, *calculi sign.* iv, 79.
- Progn. in genere*, j, 12; vij, 66, 79.
- In feb. contin.* iv

<p>47; vij, 69.</p> <p><b>UTERUS.</b></p> <p>Temperies, <i>moderata</i>, <i>fœcunditatis causa</i>, v, 62.</p> <p><i>Calor juvat</i>, v, 22.</p> <p><i>Os durum</i>, <i>clausum</i>, v, 54.</p> <p><i>Ingravida</i>, <i>clausum est</i>, v. 51.</p> <p><i>Inflammati</i>, <i>sign.</i> v, 58.</p> <p><i>Suppuratus</i>, <i>Cura</i>, v, 47.</p> <p><i>Erysipelas in gra-</i></p>	<p><i>vida lethale</i>, v, 43.</p> <p><b>VULNUS.</b></p> <p><i>Progn. à tumore</i>, v, 65.</p> <p><i>Spasmus lethalis</i>, v, 2.</p> <p><i>Atra bilis per alvum lethalis</i>, iv, 23.</p> <p><i>Non coalescens</i>, vj, 19, 24, vij, 28.</p> <p><i>Lethale</i>, vj, 18.</p> <p><i>Cerebri. Vid. Cerebrum.</i></p>
--	---

*Finis Indicis.*

---

È Typographiâ MONSIEUR.

O o

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1863

1864

1865

1866

1867

1868

1869

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

